



Обзор: Жгутиконосцы и инфузории — строение, роль, разнообразие

Одноклеточные протисты с разнообразием форм и важных функций в экосистеме.

Первые открытия простейших — начало микробиологии

В 1674 году Антони ван Левенгук впервые увидел микроскопических организмов. Его открытия раскрыли удивительный мир простейших и заложили основы для науки микробиологии.



Что такое жгутиконосцы? Их основные признаки

Жгутик — главный орган движения

Жгутиконосцы передвигаются с помощью одного или нескольких длинных жгутиков, которые вращаются, создавая движение. Эти жгутики также помогают создавать ток воды вокруг клетки.

Строение клетки жгутиконосцев

Клетка обычно вытянутая и покрыта эластичной оболочкой — пелликулой. Внутри располагаются ядро и пищеварительная вакуоль для переработки веществ.

Разнообразие внешнего вида

Форма тела жгутиконосцев варьируется от простых шарообразных до удлинённых, с разной толщиной пелликулы, что влияет на гибкость и способы движения.



Распространённые представители жгутиконосцев

Эвглена зелёная — фотосинтезирующий протист

Эвглена встречается в пресных водоёмах и умеет использовать свет для питания, а при его недостатке — поглощать органические вещества.



Трипаносома — опасный паразит

Этот вид вызывает сонную болезнь у человека, передаётся мухой цеце и поражает нервную систему, что делает её важным объектом медицинских исследований.



Лямблия — возбудитель кишечных заболеваний

Лямблии заражают кишечник человека через загрязнённую воду или пищу, вызывая неприятные симптомы и требуя внимательного лечения.



Уникальное строение эвглени зелёной

Жгутик и светочувствительный глазок


Эвглена оснащена одним жгутиком для движения и стигмой — органом, чувствительным к свету, позволяющим ориентироваться и находить свет для фотосинтеза.

Хлоропласты и фотосинтез

С помощью хлоропластов эвглена преобразует солнечный свет в энергию, тем самым синтезируя органические вещества, что необычно для одноклеточных.

Контрактивная вакуоль и обмен веществ

Специальная вакуоль удаляет излишки воды из клетки, поддерживая её внутренний баланс, что необходимо для жизни в пресной воде.



Типы питания жгутиконосцев

Некоторые виды, например эвглена, осуществляют автотрофное питание через фотосинтез, используя солнечный свет для выработки органики.

Другие жгутиконосцы питаются гетеротрофно, поглощая готовые органические вещества из окружающей среды для получения энергии.

Миксотрофные формы совмещают оба способа, переключаясь в зависимости от условий окружающей среды и доступности пищи.

Экологическая роль жгутиконосцев

- Жгутиконосцы образуют важную часть планктона, производя органику и влияя на численность бактерий и мелких организмов в водоёмах.

- Они служат питанием для микроскопических животных — ракообразных и мальков рыб, помогая поддерживать экологический баланс.



Опасные жгутиконосцы и болезни

1. Трипаносома вызывает сонную болезнь у человека, передаваемую мухой цеце. Болезнь поражает нервную систему и требует медицинского вмешательства.
2. Лямблия вызывает лямблиоз — кишечное заболевание, возникающее из-за заражения водой или пищей, вызывает расстройства пищеварения у взрослых и детей.



Инфузории: особенности и строение клеток

Обширное покрытие ресничками

Инфузории движутся с помощью множества небольших ресничек, которые синхронно колеблются, обеспечивая быстрое и точное движение в воде.



Два типа ядер — макро- и микронуклеус

Макронуклеус управляет жизнедеятельностью клетки, а микронуклеус отвечает за передачу наследственной информации при размножении.



Органы питания и выделения


Внутри клетки расположены пищеварительные вакуоли для переваривания пищи и сократительные вакуоли, регулирующие водный баланс и удаляющие лишнюю жидкость.



Известные виды инфузорий

Инфузория-туфелька — классика микроскопии

Имеет форму подошвы, хорошо заметна под микроскопом. Быстро передвигается, используя реснички, и питается бактериями и мельчайшими частицами.



Баллантидий — редкий паразит

Может вызывать балантидиаз у человека, поражая кишечник. Заражение происходит через загрязнённую воду, что делает важным соблюдение гигиены.



Инфузория-трубач — крупный обитатель прудов

Отличается характерной воронкообразной формой тела. Обитает в пресных водоёмах, где питается бактериями и мелкими организмами.



Строение инфузории-туфельки

Роль ресничек в движении и питании

Инфузория-туфелька покрыта плотным слоем ресничек, которые обеспечивают её плавное и мягкое движение в воде. Реснички создают ток воды, направляя пищу к клеточному рту, что позволяет эффективно питаться микроскопическими частицами.



Двойное ядро: макро- и микронуклеус

В теле инфузории расположены два типа ядер: макронуклеус регулирует все жизненные процессы, а микронуклеус отвечает за наследственность и участвует в половом размножении, что делает организм очень сложным на клеточном уровне.



Вакуоли и их функции

Пищеварительные вакуоли внутри инфузории перерабатывают захваченную пищу, а сократительные вакуоли выводят излишки воды, поддерживая баланс жидкости. Размер клетки может достигать 300 микрон, что позволяет наблюдать её детали под микроскопом.



Питание инфузорий: фильтрация и пищеварение

Реснички создают направленный ток воды, который уносит пищевые частицы к клеточному рту, обеспечивая постоянное поступление питания для инфузории.


Поступившая пища захватывается и упаковывается в пищеварительные вакуоли, где происходит её разложение с помощью ферментов до усваиваемых веществ.

Непереваренные остатки выводятся наружу через порошицу — специальное отверстие в клеточной оболочке, обеспечивая очищение внутренней среды клетки.

Дыхание, выделение и осморегуляция у инфузорий

- Газообмен у инфузорий происходит через поверхность клетки, при этом кислород попадает внутрь, а углекислый газ выводится наружу, обеспечивая жизнедеятельность организма.

- Сократительные вакуоли удаляют излишек воды и продукты обмена, поддерживая осмотическое равновесие, что особенно важно для инфузорий, живущих в пресных водах с низкой концентрацией солей.



Размножение простейших: особенности процесса

Бесполое деление

Клетка простейшего делится на две дочерние клетки, каждая из которых становится самостоятельным организмом. Этот способ позволяет быстро увеличивать численность популяции.

Возобновление колоний

После полового и бесполого размножения простейшие быстро колонизируют новые водоёмы, обеспечивая экологическую стабильность и поддержание биологических цепей.

Конъюгация

Две инфузории сближаются и обмениваются микронуклеусами, что способствует генетическому разнообразию и повышает устойчивость к изменениям среды.

Сравнение строения жгутиконосцев и инфузорий



Учебник биологии, 7 класс

Инфузории имеют более сложное клеточное строение и крупные размеры, что отражает их высокую специализацию и разнообразие функций.

Различия между группами поддерживают их разные роли в экосистемах и адаптацию к средам обитания.

Инфузории в цепях питания и водной экосистеме

Регуляция численности бактерий

Инфузории активно поедают бактерии и другие микробные организмы, контролируя их количество и не позволяя разрастаться микробным колониям, что поддерживает экологический баланс в водоёмах.

Очистка воды от органики

Разлагая органические частицы, инфузории способствуют очистке воды, предотвращая накопление вредных веществ и обеспечивая чистоту и прозрачность водной среды.

Пища для мелких животных

Мальки рыб, гидры и мелкие ракообразные питаются инфузориями, что делает их важным звеном пищевых цепей и способствует поддержанию биоразнообразия водных сообществ.



Практическое значение инфузорий

- Массовое появление инфузорий в пресных водоёмах служит индикатором загрязнения и высокого содержания органики, что помогает оценить качество воды.

- Инфузории широко используются в аквариумистике как корм для мальков и в экологических исследованиях для определения токсичности воды благодаря чувствительности к изменениям среды.



Ключевые отличия жгутиконосцев и инфузорий

Признак	Жгутиконосцы	Инфузории
Органы движения	Жгутик	Реснички
Количество ядер	1	2 (макро- и микронуклеус)
Тип питания	Автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы	Гетеротрофы
Примеры видов	Эвглена, трипаносома	Туфелька, балантидий
Роль в природе	Есть паразиты, участники цепей питания	Важные фильтраторы и пищевые звенья

Таблица сравнения особенностей строения, питания и роли двух групп простейших наглядно демонстрирует их значимые различия и функции.

Инфузории обладают более сложным строением и функциональностью, но обе группы критически важны для экологического баланса.

Интересные факты о простейших

1. Эвглена обладает стигмой, которая позволяет ей двигаться к свету для оптимального фотосинтеза, демонстрируя адаптивное поведение.
2. Некоторые инфузории способны образовывать цисты и даже запоминать раздражители, что удивительно для одноклеточных организмов и свидетельствует о сложных формах поведения.



Заключение: значение жгутиконосцев и инфузорий в природе

Жгутиконосцы и инфузории обеспечивают ключевые процессы в водных экосистемах, поддерживая биологический баланс и качество воды, а также служат источником питания для многих водных животных.