




Обзор и ключевые темы: Эволюция биосферы

Путь жизни на Земле от её зарождения до современности и наша роль в этом процессе.






Что такое биосфера?

Биосфера — это вся совокупность живых организмов и среда их обитания на Земле, включающая атмосферу, гидросферу и литосферу. Она обеспечивает поддержание жизни и циркуляцию веществ.

Ключевые этапы формирования Земли и жизни



Первые живые организмы на Земле



Одноклеточные прокариоты - первые жители Земли

Простейшие бактерии и археи существовали без ядра, поддерживая основы экосистемы в древних океанах.



Строматолиты — живые истории древности

Ископаемые образования, создаваемые колониями микробов, дают прямые доказательства жизни 3,5–3,8 млрд лет назад.



Простота и выносливость первых форм жизни

Эти организмы выдерживали экстремальные условия без сложных структур, что позволило им выжить в ранней Земле.

Фотосинтез и кислородная революция

Цианобактерии научились использовать свет для синтеза органики, выделяя кислород как побочный продукт жизнедеятельности.


Накопление кислорода привело к радикальным изменениям атмосферы, сделав её более пригодной для сложных форм жизни.

Этот процесс стал фундаментом для появления аэробных организмов, которые используют кислород для энергии.

Динамика кислорода в атмосфере

Резкое повышение кислорода около 2,4 млрд лет назад называют кислородной катастрофой для анаэробных организмов.

Рост кислородного уровня сформировал ключевые условия для развития сложной жизни и изменения биосферы.



Палеоатмосферные исследования, 2020

Появление эукариот и многоклеточности

01

Эукариоты приобрели ядро и органеллы, что обеспечило более сложный обмен веществ и генетическую регуляцию.

02

Появление многоклеточных организмов расширило биологическое разнообразие и создало условие для специализации клеток.

03

Эти изменения позволили организовать сложные структуры и появление новых экологических ниш.

Кембрийский взрыв и биологическое разнообразие



Взрыв жизни: от простейших к сложным организмам

В кембрийском периоде резко увеличилось разнообразие форм жизни — появились первые хищники и сложные структуры тела.



Появление трилобитов — первых успешных членистоногих

Эти существа стали одними из наиболее распространённых и разнообразных морских организмов того времени.



Развитие новых экосистем и пищевых цепей

Быстрые изменения биологии позволили сформировать устойчивые морские сообщества с взаимозависимыми видами.

Освоение суши растениями и животными

~470 млн лет назад — первые растения на суше

Мхи и примитивные растения начали колонизировать влажные участки суши, изменяя ландшафт.

~450 млн лет назад — выход членистоногих на сушу

Паукообразные и насекомые освоили наземную среду, обеспечивая развитие почвенных экосистем.

~360 млн лет назад — первые амфибии

Переход позвоночных к жизни на суше стал поворотным событием в развитии биосферы.

Ключевые этапы эволюции биосферы

Возрастные вехи с описанием важных событий и примерами живых организмов за миллионы лет.

Эволюция жизни шла через последовательные этапы усложнения и адаптации, приводя к современному разнообразию.

Возраст (млн лет)	Событие	Примеры организмов
2700	Появление цианобактерий	Цианобактерии
2000	Возникновение эукариот	Эукариоты
1000	Многоклеточность	Простейшие многоклеточные
230	Динозавры	Тираннозавр, Трицератопс
220	Млекопитающие	Первые млекопитающие
2.5	Появление рода Homo	Homo sapiens

Современные палеонтологические данные



Динозавры и господство рептилий

Динозавры появились около 230 миллионов лет назад и стали доминирующей группой наземных животных более 160 миллионов лет. Их разнообразие насчитывало множество видов с разными размерами и повадками.

Травоядные, такие как диплодок и трицератопс, соседствовали с хищниками, включая тираннозавра и велоциратора. Были также летающие птерозавры и морские рептилии, расширяя экосистемы древних миров.

Массовые вымирания и их роль



За историю биосферы произошло пять крупных массовых вымираний, радикально изменивших жизнь на Земле и открывших путь для новых форм и экосистем.



Меловое вымирание 66 миллионов лет назад привело к исчезновению большинства динозавров, создавая условия для расцвета млекопитающих и птиц.



Пермское вымирание около 252 миллионов лет назад уничтожило до 96% морских видов, оставив лишь немногих выживших, что повлияло на последующее развитие биосферы.




Каждое массовое вымирание вызывает перестройку экосистем и запускает процесс эволюции новых видов, формируя биологическое разнообразие современности.

Частота массовых вымираний: график

Пиковые значения показывают резкие потери видов в ключевые периоды, особенно в Пермском вымирании с экстремальными изменениями в морских экосистемах.

Данные подтверждают, что массовые вымирания имели глубокое воздействие на среду обитания и направление эволюции, стимулируя смену доминирующих видов.



220 МИЛЛИОНОВ лет

назад примерно появились
первые млекопитающие, с
малым размером и ночным
образом жизни, что позволило
им выживать среди

доминирующих рептилий.

Палеонтологические данные, 2023

Именно после исчезновения
динозавров млекопитающие начали
активный расцвет, развивая сложные
черты как молочное вскармливание
и сложную нервную систему.

Эволюция человека и антропогенез

Появление рода Homo

Род Homo возник около 2,5 миллионов лет назад с такими формами, как *Australopithecus* и *Homo habilis*, которые использовали простые орудия труда. Далее появились *Homo erectus* и *Homo sapiens*.

Ключевые особенности эволюции человека

Для человека характерно развитие прямохождения, речи и сложного мышления. Последовательно формировались социальные связи и культура, что стало основой для современного общества.



Влияние человека на биосферу

+ С развитием сельского хозяйства около 10 тысяч лет назад люди начали преобразовывать природные ландшафты под посевы и пастбища, изменяя экосистемы.

+ Урбанизация приводит к сокращению естественных местообитаний, способствуя вымиранию животных и растений на локальном и глобальном уровнях.

+ Индустриализация ускорила эксплуатацию природных ресурсов, вызвав резкое загрязнение воздуха, воды и почв, что негативно сказалось на многих видах живых организмов.

+ Масштабы изменений за последние столетия не имеют аналогов за всю историю биосферы, угрожая устойчивости естественных процессов.

Сравнение биоразнообразия: до и после человеческой деятельности

Группа	Около 1750 года	XXI век
Птицы	8500	7900
Позвоночные	56000	52000
Растения	300000	290000

Таблица демонстрирует сокращение количества видов позвоночных, растений и насекомых после начала индустриализации в сравнении с XXI веком.

Данные показывают минимальное, но значимое снижение численности видов, свидетельствующее о влиянии человеческой деятельности на биоразнообразие.

Биосфера сегодня: вызовы и угрозы



Глобальное изменение климата

Темпы потепления климата ускоряются, вызывая экстремальные погодные явления и таяние ледников. Это влияет на миграцию и выживание многих видов животных и растений.



Утрата лесных массивов

Каждый год вырубается свыше 7 миллионов гектаров лесов, что приводит к уменьшению углеродных поглотителей и потере среды обитания для множества видов.



Загрязнение океанов

Пластик и нефтепродукты накапливаются в морях, нарушая экосистемы и здоровье морских обитателей. Угроза вымирания касается примерно четверти млекопитающих.

Будущее биосферы: роль человека

01 Экологическое образование повышает осознанность общества о важности сохранения природы и формирует ответственное поведение в отношении окружающей среды. ▶

02 Развитие и внедрение возобновляемых источников энергии существенно снизят нагрузку на биосферу, сокращая выбросы парниковых газов и загрязнение. ▶

03 Коллективные усилия людей в сохранении биоразнообразия и устойчивом потреблении определяют долгосрочное здоровье планеты и благополучие будущих поколений. ▶

Значение изучения эволюции биосферы

Изучение истории биосферы раскрывает сложные взаимосвязи между живыми организмами и окружающей средой, подчёркивая ответственность человека за сохранение природного баланса и устойчивое будущее.

