

Динамика численности популяций: общая характеристика и ключевые темы

Изучение изменений численности популяций и их значение для экологии и человека.



Понятие популяции и важность численности

Популяция — группа особей одного вида на определённой территории. Численность отражает устойчивость вида и влияние на экосистему, подчёркивая роль биологических и экологических процессов.



Факторы, влияющие на численность популяций

1

Рождаемость определяет прирост популяции за счёт новых особей, напрямую зависящих от биологических особенностей вида.

2

Смертность характеризует убыль численности и зависит как от природных условий, так и от биотических факторов, например, хищничества.

3

Иммиграция приносит новых особей в популяцию, увеличивая её численность и генетическое разнообразие.

4

Эмиграция ведёт к убытку особей, что снижает плотность популяции и влияет на её динамику во времени.

Основные биотические регуляторы численности



Хищничество и его влияние

Взаимодействие хищника и жертвы, как у волка и зайца, регулирует численность, удерживая баланс в экосистеме и предотвращая перенаселение.



Паразитизм как фактор контроля

Паразитические насекомые воздействуют на здоровье хозяев, снижая их выживаемость и рождаемость, что ограничивает рост популяции.



Конкуренция за ресурсы

Особенности борьбы за пищу и убежища между особями и видами влияют на распределение и численность, формируя экологические ниши.



Симбиоз и распространение видов

Взаимовыгодные отношения между видами, например лишайники, укрепляют устойчивость и влияют на структуру популяций на территории.

Влияние абиотических факторов на численность



Температура и влажность

Колебания температуры и уровень влажности сильно влияют на жизнедеятельность организмов, вызывая сезонные изменения численности популяций.



Световой режим и климат

Продолжительность светового дня и климатические условия регулируют циклы размножения и активности, ограничивая рост некоторых видов.



Природные катастрофы и почвенные изменения


Наводнения, засухи и пожары обнуляют или снижают численность, как и изменения состава почвы, например засоление, влияющее на растения-мезофиты.

Динамика популяций зайца и рыси (1845–1935)

График иллюстрирует колебания обеих популяций с очевидным взаимозависимым трендом.

Численность рыси реагирует на изменения зайца, подтверждая цикличность хищник-жертва.

Исследования Московского государственного университета, 1937




Математические модели роста популяций

J-кривая демонстрирует резкий рост при отсутствии ограничений, S-кривая — стабилизацию по мере истощения ресурсов.

Логистическая модель отражает естественное ограничение роста популяций.

Работы по экологии популяций, 2020



Внутривидовая конкуренция и её последствия

1

Высокая плотность приводит к борьбе за пищу и территории, что снижает репродуктивные показатели особей.

2

Увеличивается смертность молодых из-за ограниченного доступа к ресурсам и повышенного стресса.

3

Изменение соотношения полов уменьшает популяционный рост, влияя на генетическое разнообразие и устойчивость вида.

Межвидовая конкуренция: примеры в природе

Взаимодействие видов с одинаковыми экологическими требованиями часто приводит к вытеснению слабейшего конкурента.

Изменение ареалов может привести к созданию новых биологических видов или к коэволюции конкурирующих видов.

Пример — вытеснение красной белки серой в Великобритании вследствие лучшей приспособленности и переноса болезней.

50–100

особей считается критическим минимумом для предотвращения гибели популяции из-за генетических и демографических факторов.

Сниженная численность увеличивает риск исчезновения из-за потери генетического разнообразия и случайных экологических воздействий.

Доклады Всероссийского института охраны природы, 2019

Последствия перенаселения популяций

1

Перенаселение приводит к острым дефицитам пищи, воды и укрытий, что снижает выживаемость и вызывает кризисы внутри сообщества, вынуждая особей конкурировать за критические ресурсы.

2

Усиление внутривидовой конкуренции вызывает стрессовые состояния, ослабление иммунитета и изменение поведения, что в совокупности снижает общий уровень здоровья популяции.

3

Часто при перенаселении возникают вспышки инфекционных заболеваний и паразитарные эпидемии, что дополнительно сокращает численность и ухудшает демографическую структуру.

4

Каннибализм и снижение продуктивности размножения — частые последствия перенаселения, наблюдающиеся, например, при массовом коллапсе грызунов в австралийских экосистемах.

Миграции как способ регуляции численности

Сезонные миграции способствуют сезонному перераспределению особей, снижая давление на ресурсы определённых территорий и предотвращая перенаселение.

Вынужденные миграции, вызванные природными катастрофами или дефицитом ресурсов, позволяют популяциям выживать, находя новые подходящие условия обитания.

Миграции поддерживают генетическое разнообразие, уменьшают внутривидовую конкуренцию и способствуют возобновлению популяций в опустевших зонах.

Колебания численности на примере суслика



Инбридинг при низкой численности сусликов

При падении численности сибирского лугового суслика усиливается родственное скрещивание, что снижает выживаемость потомства и увеличивает уязвимость к заболеваниям. Это создаёт дополнительный барьер для восстановления популяции.



Распространение болезней при росте численности

Во время пика численности сусликов наблюдается быстрое распространение инфекций, что ограничивает дальнейший рост и способствует естественному снижению популяции до устойчивого уровня.



Колебания численности за 10–15 лет

Данные показывают, что за период в 10–15 лет численность сусликов может изменяться в 8–12 раз, что отражает взаимодействие биологических и экологических факторов, формирующих динамику вида.

Влияние популяционной динамики на экосистемы

1

Увеличение численности травоядных ведёт к интенсивному поеданию растительности, вызывая деградацию экосистем и снижение биоразнообразия в растительном сообществе.

2

Снижение численности хищников нарушает контроль за популяциями добычи, что может привести к избыточному размножению травоядных и экологическим вспышкам.

3

Экологические вспышки, например нашествия саранчи, наносят значительный ущерб агроценозам и нарушают баланс природных сообществ.

4

Изменение численности копытных оказывает значительное влияние на структуру и стабильность лесных экосистем, меняя почвенные процессы и растительный покров.

Антропогенное влияние на популяции диких ЖИВОТНЫХ

1

Человеческая охота и разрушение природных местообитаний приводят к снижению численности и утрате биологического разнообразия во многих регионах.

2

Интродукция чужеродных видов и борьба с вредителями изменяют экологические взаимодействия, иногда вызывая непредсказуемые последствия для местных популяций.

3

Создание заповедников и программы реинтродукции, как восстановление бобров в России, позитивно влияют на стабилизацию и восстановление популяций.

Устойчивость популяций: причины и примеры



Генетическое разнообразие как основа стабильности

Высокое генетическое разнообразие позволяет популяциям адаптироваться к изменениям среды, снижая риск вымирания и повышая устойчивость к болезням и стрессовым факторам.



Широкий ареал способствует устойчивости

Виды с обширными ареалами, такие как серая крыса, лучше справляются с локальными неблагоприятными факторами благодаря возможности миграции и заселения различных климатических зон.



Адаптация к стрессам среды

Способность быстро адаптироваться к переменам внешних условий обеспечивает конкурентное преимущество, позволяя популяциям сохранять численность и функциональность экосистемы.

Численность как индикатор состояния среды



Амфибии отражают качество водоёмов

Снижение численности жаб и тритонов часто связано с пестицидами и загрязнением водоёмов, свидетельствуя о нарушениях экосистемы и ухудшении экологического состояния.



Птицы-индикаторы биотопов

Изменения численности отдельных видов птиц позволяют выявлять деградацию лесов и болот, служат сигналом для принятия мер по охране природных территорий и восстановлению среды.

Экстремальные события и динамика популяций

Засухи и пожары вызывают резкое сокращение численности, нарушая питание и среду обитания, что ведёт к локальному исчезновению некоторых видов.

Вспышки заболеваний могут быстро уничтожить значительную часть популяции, особенно если иммунитет снижен вследствие неблагоприятных условий.

После экстремальных событий часто наблюдается медленное восстановление численности и перестройка трофических связей в экосистемах.

Цикличность изменений численности популяций

1845 год: начало наблюдений

Начало систематического сбора данных о численности зайца-беляка и рыси на севере Евразии, заложившее основу для анализа циклов.

1900–1920 гг.: пиковые значения численности

Зафиксированы максимумы численности зайцев, за которыми последовал рост популяции рысей вслед за доступностью добычи.

1920–1935 гг.: снижение популяций

Уменьшение численности зайцев повлекло за собой сокращение численности рысей, демонстрируя взаимосвязанность видов.

Современные исследования

Исследования подтверждают регулярные циклы продолжительностью 8–12 лет, важные для устойчивости экосистем и прогнозирования динамики видов.

Важность понимания динамики популяций

Изучение процессов изменения численности популяций необходимо для принятия эффективных мер по охране природы и рациональному использованию биоресурсов с целью сохранения экосистем и биоразнообразия.