

Травмы головы, позвоночника и спины: почему тема важна для ОБЗР

Опасные травмы могут начаться с одного
неудачного удара.



1 1/2 2 109 8

От падения до серьёзной травмы: как это происходит



Причиной может стать обычное падение, столкновение на перемене или неудачное приземление в спорте. Риск растёт там, где есть скорость, скользкая поверхность, резкое движение и отсутствие защиты.

Что относится к травмам головы

К травмам головы относят ушиб мягких тканей, сотрясение и ушиб мозга, а также переломы костей черепа. Они могут затронуть как кожу и кости, так и ткани мозга.

Опасность возрастает, если после удара появилась потеря сознания, рвота, сильная головная боль, судороги или спутанность речи. Даже короткое ухудшение требует внимательного наблюдения.

Тревожными признаками считаются неравные зрачки, кровотечение из носа или ушей, нарастающая сонливость и ухудшение состояния через несколько минут или часов после травмы.



Сотрясение мозга: типичные симптомы и внешние признаки

-1

!2

Как человек себя чувствует


Часто появляются головная боль, тошнота, головокружение и шум в ушах. Пострадавший может жаловаться на слабость, светобоязнь и неприятные ощущения при движении.

Что можно заметить со стороны

Со стороны заметны замедленная реакция, забывчивость, трудности с концентрацией и сонливость. Иногда человек плохо помнит сам момент удара и ведёт себя неуверенно.



Основные причины травм головы у школьников




Схематическая визуализация по материалам темы ОБЗР; без точных статистических данных.

Диаграмма показывает наиболее типичные ситуации в школе, во дворе и на дороге.

Наибольший вклад дают падения и спортивные столкновения; защита головы особенно важна при езде и играх.

Первая помощь при травме головы

Последовательность действий при подозрении на опасную травму головы



Когда требуется срочная медицинская помощь при травме головы

Срочно вызывают помощь при потере сознания, повторной рвоте, судорогах, нарушении речи или сильной головной боли, которая быстро усиливается.

Особого внимания требуют слабость в руках или ногах, неустойчивая походка, необычная сонливость и кровотечение из ушей или носа.

Опасным считается удар в висок, затылок или падение с высоты, даже если сначала человек отвечает на вопросы и выглядит относительно нормально.

Если состояние ухудшается спустя несколько минут или часов, ждать нельзя: такие изменения могут указывать на скрытую тяжёлую травму.

Что такое травма позвоночника

1



Как возникает

Травма может случиться при падении, резком сгибании или разгибании туловища, ударе в спину, ДТП, спортивном столкновении или нырянии в мелкую воду.



Что повреждается

Пострадать могут позвонки, межпозвоночные диски, связки и мышцы. Чем сильнее воздействие, тем выше риск смещения или перелома костей позвоночника.



Почему это опасно

Наибольшую угрозу представляет повреждение спинного мозга. Оно может нарушить движения, чувствительность и работу внутренних органов, поэтому нужна немедленная помощь.

2

log

x

Почему позвоночник и спина уязвимы

- Позвоночник удерживает тело, помогает сохранять осанку и защищает спинной мозг. Шейный отдел особенно уязвим: он подвижен, а мышцы здесь сравнительно тонкие.
- Грудной отдел частично защищён рёбрами, а поясничный принимает большую нагрузку при ходьбе, наклонах и подъёме тяжестей. Поэтому именно эти зоны часто страдают при падениях и резких движениях.



Признаки опасной травмы позвоночника


Симптом	Возможное значение
Боль в шее, спине	повреждение тканей
Онемение, слабость	нервы или спинной мозг
Искривление тела	перелом или вывих
Затруднённое дыхание	поражение шеи
Потеря контроля мочеиспускания	тяжёлое нарушение

Таблица помогает быстро связать симптом с возможным нарушением и понять, когда двигать пострадавшего нельзя.

При таких признаках любое лишнее движение опасно; пострадавшего нужно оставить в покое и вызвать 103/112.

Алгоритм помощи при подозрении на травму позвоночника

Последовательность действий при падении, ДТП, ударе или прыжке в воду



Ушиб, растяжение и перелом спины: чем они отличаются

1

Ушиб мягких тканей чаще всего даёт боль, припухлость и ограничение движений, но человек обычно может стоять и ходить, если травма не сопровождается сильным ухудшением.



2

Растяжение мышц и связок проявляется болью при наклонах, поворотах и ощущением скованности. Движения становятся осторожными, но признаки тяжёлого повреждения могут отсутствовать.



3

Перелом позвонка опасен резкой болью, деформацией и онемением. Если после падения или удара боль сильная, нужен срочный осмотр врача, даже когда внешне всё выглядит нормально.



Чем опасны неправильные действия при травме позвоночника



Учебные правила первой помощи при травмах позвоночника

Любое лишнее движение может усилить боль и осложнить состояние даже тогда, когда пострадавший сначала говорит, что может терпеть.


Чем резче и чаще перемещают человека, тем выше риск смещения позвонков и повреждения спинного мозга.

Безопасность в спорте, на улице и на площадке



Велосипед и самокат — только в защите

Подросток выезжает на дорожку в шлеме, и это сразу меняет картину: падение уже не выглядит таким опасным. Наколенники и налокотники помогают пережить неудачный поворот, а спокойная езда без лишней скорости снижает риск удара о твёрдую поверхность.



Игра без толчков и опасных рывков

На площадке ребята бегут к мячу, но не сталкиваются друг с другом и не делают резких прыжков без разминки. Когда правила игры соблюдаются, спина и шея получают меньше нагрузки, а движение остаётся безопасным и контролируемым.



Дорога рядом требует внимания

Школьник идёт по тротуару, держит дистанцию и не спешит на скользком участке. Такой простой выбор помогает избежать падения, а заметные элементы защиты и аккуратное поведение делают путь до дома спокойнее и надёжнее.

Профилактика травм дома и в школе

1

Дома и в школе важно убирать с проходов вещи, следить за сухими полами и хорошим освещением. Это снижает риск падений на лестнице, в коридоре и в классе.

2

Рюкзак лучше носить на двух лямках и не перегружать. Слишком тяжёлая сумка тянет плечи назад, утомляет спину и мешает сохранять ровную осанку при ходьбе.

3

При подъёме предметов спину держат ровно, а нагрузку принимают ноги. Резкий наклон вперёд, поворот корпуса и попытка поднять тяжесть одной спиной повышают риск травмы.

4


За партой и на переменах полезны правильная посадка, короткие перерывы и спокойное поведение. В спортзале важно соблюдать правила, не толкаться и выполнять упражнения без спешки.

8

5

9

Факторы риска и меры защиты



Обобщение правил безопасности для школьников

Риск возрастает там, где человек спешит, не смотрит под ноги или игнорирует защитную экипировку. Особенно это заметно в школе и на спортивных площадках.

Снижение скорости, защита головы и внимательность дают самый заметный эффект против травм головы, шеи и спины.

Что можно и чего нельзя делать до приезда врача

1

3

Можно	Нельзя
Вызвать 103/112	Поворачивать шею
Успокоить и наблюдать	Поднимать без нужды
Приложить холод через ткань	Давать еду и лекарства

Правила первой помощи при травмах головы и позвоночника

Короткая памятка помогает не навредить пострадавшему до прибытия помощи.

Главная задача – сохранить покой и не усугубить повреждение до осмотра специалистами.

2

Восстановление после травмы и возвращение к нагрузкам

Сразу после травмы

Пострадавшему нужен покой, уменьшение нагрузки и наблюдение. При подозрении на сотрясение мозга особенно важно не перегружать голову и не спешить с активностью.

Первые дни

Полезны сон, тишина, ограничение экранного времени и контроль самочувствия. Если появляются новые симптомы, нужен повторный осмотр врача.

После обследования

При травме позвоночника могут назначаться фиксация, обезболивание, обследования и реабилитация. Лечение зависит от вида повреждения и его тяжести.

Возврат к занятиям

К урокам физкультуры и тренировкам возвращаются только после исчезновения симптомов и разрешения врача. Ранние нагрузки повышают риск осложнений и повторной травмы.

Ситуации, которые помогают запомнить правила безопасности

Падение с самоката без шлема

Подросток быстро едет по площадке, теряет равновесие и падает вперёд. Шлема нет, поэтому даже обычный удар о землю может обернуться тяжёлой травмой головы. История напоминает: защита нужна не «на всякий случай», а каждый раз.



Удар головой о лёд

На катке человек поскальзывается и падает назад, сильно ударяясь затылком. После такого падения опасны не только боль и шишка, но и скрытая травма мозга. Поэтому на льду особенно важны осторожность и внимание к поверхности.



Неудачный прыжок в воду

Ребёнок прыгает в незнакомое место и не замечает мелкую глубину. Удар о дно может повредить шею и позвоночник, а последствия становятся заметны не сразу. Такой сюжет хорошо показывает, почему нельзя нырять там, где дно не проверено.



Тяжёлый предмет и боль в спине

Школьник пытается поднять слишком тяжёлую коробку и резко наклоняется корпусом вперёд. В спине появляется острая боль, а движения становятся скованными. Сцена помогает запомнить: тяжести нужно поднимать правильно и только по силам.



Главное, что нужно запомнить

Травмы головы, позвоночника и спины требуют внимательности с первых секунд. Покой, вызов 103 или 112, осторожность при движении и профилактика в спорте и быту помогают избежать тяжёлых последствий.



cos

sin

1

tg

ctg