



Мезозой: эпоха динозавров и птиц

Путешествие через триаса, юру и мел.



Почему мезозой — ключ к истории жизни

За 186 миллионов лет жизнь после пермского кризиса восстановилась, заняла новые среды и дала начало многим современным группам животных. Именно тогда сформировались линии динозавров, птиц, млекопитающих и морских рептилий.



Три периода мезозоя

Триас: 252–201 млн лет назад

Началось восстановление экосистем, а свободные ниши быстро заняли первые динозавры, птерозавры и ранние млекопитающие.

Мел: 145–66 млн лет назад


Появились цветковые растения, усилилось разнообразие динозавров и птиц, а завершилась эра массовым вымиранием.

Юра: 201–145 млн лет назад

Тёплый влажный климат и обширные леса создали условия для расцвета гигантских динозавров и появления первых птиц.

Как среда направляла эволюцию мезозойских животных

Схема показывает связь тектоники плит, климата и биологического разнообразия в мезозое.



Пангея и распад единого материка



Один материк — разные пути

В начале мезозоя почти вся суша была собрана в Пангею, поэтому многие организмы существовали на огромном непрерывном пространстве. Когда материк начал раскалываться, популяции оказались изолированы и стали эволюционировать по-разному.



Лавразия и Гондвана

После распада Пангеи возникли два крупных блока суши — Лавразия и Гондвана. Их дальнейшее дробление создало новые барьеры и способствовало появлению локальных, эндемичных фаун на разных континентах.



Изоляция как двигатель разнообразия


Разделённые материки действовали как природные лаборатории эволюции. На одних территориях закреплялись свои линии динозавров и ранних птиц, на других — появлялись иные формы, приспособленные к местным условиям.

Сравнение длительности трёх периодов мезозоя

Самым продолжительным был мел, и именно поэтому он оставил особенно богатую ископаемую летопись.

Разница в длительности периодов помогает понять, почему меловые отложения изучены особенно подробно.

Международная стратиграфическая шкала (ICS), актуальные границы мезозоя



Триас: восстановление жизни после пермского вымирания

.1

Свободные экологические ниши

После пермского вымирания многие сообщества были разрежены, а пищевые цепи — упрощены. Это создало условия для быстрого заселения суши новыми группами позвоночных и перестройки экосистем.

.2


Первые мезозойские линии

Именно в триасе появились ранние динозавры, крокодиломорфы, птерозавры и первые млекопитающие. Каждая из этих групп заняла собственную экологическую нишу и по-разному переживала конкуренцию.

.3

Преимущества ранних динозавров

Многие первые динозавры были небольшими, двуногими и подвижными. Такая организация тела помогала им быстро менять поведение, добывать пищу и выживать в нестабильной среде.



Основные группы животных триасового периода

Таблица показывает, как в триасе сложились главные линии мезозойских наземных позвоночных.

Именно в триасе возникли базовые ветви, которые затем определили облик мезозойских экосистем.

Обобщение по палеонтологическим данным триасового периода


Группа	Появление	Признаки	Примеры
Динозавры	поздний триас	двуновость, разнообразие	эораптор, целофизис
Крокодиломорфы	триас	полуводный образ жизни	проторозух
Птерозавры	поздний триас	крылья, полёт	эудиморфодон
Ранние млекопитающие	триас	мелкие размеры, ночь	морганукодон

Юрский период: расцвет гигантских динозавров



Леса тёплой Юры

В юрском периоде тёплый и влажный климат поддерживал густую растительность и высокую продуктивность экосистем. Такие условия обеспечивали крупным растительноядным животным стабильную кормовую базу и позволяли им достигать гигантских размеров.



Гиганты на суше

Завроподы стали одними из самых заметных обитателей юрских ландшафтов, а рядом с ними существовали стегозавры и крупные тероподы. Их сосуществование показывает, насколько сложно была устроена пищевая сеть наземных экосистем.



Хищники и специализация


Крупные тероподы занимали вершину пищевой цепи и развивали эффективные способы охоты. Их успех зависел не только от размеров, но и от скорости, силы челюстей и приспособленности к добыче разной величины.

Размеры типичных юрских динозавров

Даже в пределах одного периода динозавры резко различались по размерам и образу жизни.

Сопоставление длины отражает разделение на мелких хищников и гигантских травоядных в юрских экосистемах.

Палеонтологические оценки длины динозавров по опубликованным описаниям




Археоптерикс и происхождение птиц



Сочетание признаков

Археоптерикс соединял черты динозавров и птиц: зубы, длинный костный хвост и когтистые пальцы сочетались у него с перьями и крыльями, указывая на переходный этап эволюции.



Доказательство родства

Находка археоптерикса стала важным аргументом в пользу происхождения птиц от пернатых теропод. Его строение показало, что ключевые изменения возникали постепенно, а не скачкообразно.



Первые попытки полёта

Перья и крылья археоптерикса могли помогать не только в активном полёте, но и в планировании. Это позволяло лучше маневрировать среди деревьев и расширяло способы передвижения.



Переход к новым нишам

Появление птицеподобных форм открыло путь к освоению воздушной среды. Со временем потомки ранних пернатых динозавров заняли широкий спектр экологических ниш, недоступных наземным хищникам.

Этапы перехода от теропода к птице

Последовательность реконструирована по данным сравнительной анатомии и находкам пернатых динозавров поздней юры и раннего мела.



Меловой период: максимальное разнообразие динозавров



- **Новые растительноядные группы**

В мелу особенно широко распространились цератопсы, гадрозавры и анкилозавры. Их успех связан с разнообразием растительной пищи, включая новые формы покрытосеменных растений и более сложные пищевые цепи.

- **Хищники разных размеров**

Тероподы мелового времени занимали разные уровни хищничества — от сравнительно небольших форм до крупных верховных хищников. Такое распределение усиливало конкуренцию и специализацию в наземных экосистемах.

- **Континентальные различия**

На разных материках меловые динозавры развивались по-своему из-за географической изоляции. Особенно заметны региональные фауны Северной Америки, Азии и Южной Америки, где возникали собственные сочетания видов.

- **Новая растительная среда**

Распространение цветковых растений изменило структуру ландшафтов и кормовую базу. Это повлияло не только на травоядных динозавров, но и на насекомых, мелких позвоночных и общий облик наземных сообществ.

Сравнение меловых динозавров и их приспособлений

Таблица сопоставляет способы питания, защиту и роль четырёх характерных динозавров мелового периода.

Разные стратегии защиты и питания показывают, что меловые экосистемы были сложными и хорошо разделёнными по ролям.

Обобщение по данным палеонтологии мелового периода

Вид	Питание	Приспособления	Роль
Трицератопс	растит.	рога, воротник	защита
Тираннозавр	хищник	мощные челюсти	верхний хищник
Эдмонтозавр	растит.	стадность, жевание	добыча
Анкилозавр	растит.	пластины, булава	оборона

Распространение цветковых растений в меловом периоде

Рост цветковых растений происходил неравномерно: сначала они занимали ограниченные участки, а затем быстро расширили ареал и стали заметным компонентом многих наземных сообществ.

Смещение растительного доминирования создало новые экологические связи и усилило разнообразие насекомых и растительноядных животных.

Обобщение по палеоботаническим данным о флоре мела



Птицы мелового периода: разнообразие ранних линий

Ранний мел

Появляются и активно разнообразятся разные линии ранних птиц. Они уже демонстрируют клюв, развитые крылья и более короткий хвост, но ещё сохраняют ряд древних черт строения.

Граница 66 млн лет назад


После катастрофы на границе мела и палеогена выживает лишь часть линий. Именно они становятся основой для современных птиц, тогда как многие древние ветви исчезают.

Поздний мел

Ранние птицы занимают разные экологические ниши: от прибрежных и лесных форм до более специализированных видов. В это время сосуществуют энантиорнисы, орнитурини и другие группы.

Массовое вымирание на границе мела и палеогена

Схема отражает общепринятую последовательность последствий удара астероида Чиксулуб и её влияние на биосферу.




Какие группы пережили границу мела и палеогена

Наиболее устойчивыми оказались небольшие и гибкие в питании животные, способные использовать разные источники пищи и укрытия в резко изменившейся среде.

Выживание определялось не происхождением само по себе, а экологической пластичностью, размерами и независимостью от стабильной растительной базы.

Обобщение по данным о вымирании на границе мела и палеогена



Значение мезозоя для современной биосферы



Происхождение современных птиц

Именно в мезозое сформировалась линия, давшая начало современным птицам. Их успех связан с освоением воздуха, разнообразием способов питания и высокой подвижностью в разных средах.



Расцвет млекопитающих

Хотя в мезозое млекопитающие долго оставались небольшими, они прошли важный этап ранней эволюции. После исчезновения крупных динозавров их дальнейшее разнообразие стало намного быстрее.



Цветковые растения

Покрытосеменные радикально изменили наземные экосистемы, создав новые связи с насекомыми и травоядными животными. Их доминирование стало одной из ключевых черт современной флоры.



Современное распределение видов

Распад материков в мезозое закрепил изоляцию регионов и способствовал появлению эндемичных форм. Поэтому современное распределение животных и растений во многом отражает древнюю геологическую историю.

Мезозой оставил живое наследие

Мезозой показал, как движение материков, климатические перемены и эволюционные новации меняют биосферу. Его наследие видимо сегодня в птицах, млекопитающих, цветковых растениях и разнообразии экосистем.