



Общее введение: Среда обитания и строение земноводных

Амфибии — первые
позвоночные, освоившие сушу с
обязательной связью с водой.



Земноводные: древние обитатели и важные участники экосистем

Земноводные появились около 360 миллионов лет назад, связав жизнь в воде и на суше. Они контролируют численность насекомых и служат индикаторами здоровья природы, но сейчас их популяции сокращаются.



Основные группы земноводных



Безногие — червяги

Это амфибии с вытянутым телом, лишённые конечностей. Обитают в влажных почвах и мохах, ведут скрытный образ жизни, напоминающий червей.



Хвостатые — тритоны и саламандры


Имеют развитый хвост и четыре конечности. Часто встречаются в прудах и ручьях, обладают способностью к регенерации утраченных частей тела.



Бесхвостые — лягушки и жабы

Обладают широким телом и длинными задними лапами для прыжков. Распространены в разнообразных влажных местах, известны своим громким криком.

Типичные места обитания земноводных



Лесные озёра и пруды

Лягушки часто выбирают тихие лесные водоёмы для размножения. Эти места обеспечивают защиту от хищников и подходящую влажность для жизнедеятельности.



Влажные луга и заболоченные участки

Краснобрюхая жерлянка предпочитает болота с богатой растительностью. Здесь поддерживается необходимая влажность и есть много пищи.



Ручьи и мелкие речки

Тритоны обитают в чистой проточной воде, где находят личинок и насекомых. Такая среда способствует активному образу жизни и эффективному размножению.

Адаптации земноводных к водной среде

1

Перепончатые лапы помогают земноводным легко перемещаться в воде, увеличивая площадь опоры и облегчая плавание.

2

Слизистая кожа удерживает влагу и защищает от болезнетворных микроорганизмов, улучшая барьерные свойства эпидермиса.

3

Дыхание через кожу и наличие жабр у личинок обеспечивают газообмен в водной среде без полного погружения.

Приспособления земноводных к жизни на суше

1

Подвижные конечности поддерживают эффективное передвижение по земле, обеспечивая устойчивость и маневренность.

2

Веки предотвращают пересыхание глаз и сохраняют зрение в условиях наземной среды.

3

Трёхкамерное сердце поддерживает кровообращение с разделением потоков, обеспечивая снабжение кислородом тканей при дыхании лёгкими.

4

Развитый слух позволяет выявлять опасность и общаться на суше, что важно для выживания.

Общие черты внешнего строения

1

Основные части тела

Тело земноводных состоит из головы и туловища, у некоторых категорий сохраняется хвост. Наличие четырёх конечностей с пальцами — типично для представителей этого класса.



2

Виды по особенностям строения

У лягушек хвоста нет, что способствует прыжкам, тогда как у тритонов хвост развит и используется для плавания и маневров в воде.

Сравнение лягушки и тритона

Признак	Лягушка	Тритон
Хвост	Отсутствует	Развит
Форма тела	Округлая	Вытянутая
Конечности	Длинные задние лапы	Развиты хвост и лапы
Окраска	Зелёная или коричневая	Часто пятнистая

Основные морфологические различия отражают адаптации к их образу жизни и среде обитания.

Адаптация к прыжкам и водной жизни проявляется в разной форме тела и строении хвоста.

Функции и особенности кожи земноводных


- Кожа тонкая и влажная, обеспечивает дыхание и поддерживает водный баланс благодаря слизистым железам, выделяющим защитную слизь.
- Некоторые виды выделяют ядовитые вещества для защиты от врагов, а кожа чувствительна к колебаниям среды и помогает ориентироваться.




Способы передвижения земноводных

- Лягушки используют сильные задние лапы для мощных прыжков на суше и в воде, обеспечивая быстрый побег от хищников.
- Тритоны и саламандры перемещаются плавно благодаря сильному хвосту и мускулистому телу, что помогает им маневрировать под водой.
- Под водой перепонки между пальцами создают дополнительную площадь для эффективного волнообразного плавания.

Дыхательная система земноводных





На ранних стадиях развития у земноводных дыхание осуществляется с помощью жабр, которые обеспечивают газообмен в воде. Эти жабры эффективно снабжают личинок кислородом во влажной среде.



По мере взросления земноводные переходят к дыханию легкими и кожей. Кожа остаётся влажной и служит дополнительным органом дыхания, что важно для их жизни как на суше, так и в воде.

Строение и роль кровеносной системы у амфибий



Особенности трёхкамерного сердца земноводных

Сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка, что позволяет частично разделять кислородсодержащую и венозную кровь. Такая структура помогает адаптироваться к жизни в разных средах и эффективно снабжать органы кислородом.

Распределение крови и его значение для дыхания

Кровеносные сосуды распределяют кровь между легкими и телом, регулируя ее приток в зависимости от потребности. Это облегчает адаптацию к кислородному обмену как в воде, так и на суше.

Пищеварительная система и питание



- Пищеварительный тракт начинается с ротовой полости, где подвижный язык помогает захватывать пищу. Земноводные в основном питаются насекомыми, дождевыми червями и личинками, что обеспечивает разнообразное питание.
- Пищеварительные железы выделяют ферменты для переваривания пищи, а у личинок рацион включает растительные частицы. Такая адаптация позволяет им эффективно усваивать различные источники питания.

Органы чувств земноводных

Зрение и слух


Глаза имеют подвижные веки, позволяющие видеть и в воде, и на суше. Развит слух помогает воспринимать звуки окружающей среды, что необходимо для ориентации и избегания опасности.

Осязание и химическое восприятие

Кожа содержит чувствительные клетки, реагирующие на вибрации и химические изменения в воде и воздухе. Это помогает земноводным своевременно реагировать на окружающие воздействия.




Размножение и метаморфоз земноводных




Начальный этап: откладка икры

Самки откладывают икру в водоемы, обеспечивая новый цикл жизни. Икра развивается в прозрачных желеобразных оболочках, которые защищают зародыши от внешних воздействий.



Период головастика

Из икры вылупляется головастик, обладающий жабрами и хвостом для плавания. Он питается микроорганизмами и растительной детритной пищей, приспосабливаясь к водной среде.




Метаморфоз и выход на сушу

В ходе метаморфоза появляются конечности, хвост постепенно исчезает, развиваются легкие. Этот процесс подготавливает земноводных к жизни вне воды с изменением образа жизни и питания.


Жизненный цикл земноводного

Последовательные стадии развития и факторы влияния



Географическое распределение ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ

Южная Америка Африка Азия Европа
Северная Америка



Большинство видов предпочитают влажные тропические регионы, где климат способствует развитию популяций. В России виды встречаются главным образом в пригородных лесах и водоёмах.

Данные показывают концентрацию биоразнообразия в теплых влажных зонах, что подчеркивает важность сохранения подобных экосистем для земноводных.



Защитные приспособления и поведение

Земноводные используют маскировочную окраску и выделение ядовитых веществ для отпугивания хищников. Например, обыкновенная жерлянка привлекает внимание ярким жёлтым брюхом, предупреждая о своей токсичности.

Некоторые виды спасаются быстрыми прыжками или необычным поведением, что затрудняет их поимку. Звуковые сигналы также служат средством отпугивания и коммуникации в опасной ситуации.



Угрозы и меры охраны земноводных




Угрозы из-за изменений среды

Сокращение и загрязнение водоёмов становятся причиной массового уменьшения численности амфибий. Разрушение привычной среды лишает их возможности нормального размножения и выживания.

Охрана и сохранение популяций

Создание заповедников, мониторинг качества воды и просветительская работа помогают сохранять редкие виды. Важно вовлекать общественность в защиту природы для долгосрочного существования амфибий.



Значимость земноводных для природы и человека

Земноводные играют ключевую роль в экосистемах, контролируя популяции вредителей и поддерживая баланс. Их сохранение требует комплексных мер и внимания общества к состоянию природных вод.