

Онтогенез и эмбриональное развитие животных

От зиготы до взрослого организма: как формируется
жизнь

Зачем изучать эмбриональное развитие

Эмбриогенез задаёт общий план тела, расположение органов и жизнеспособность организма. Сравнивая ранние стадии у разных животных, биологи находят общие закономерности и объясняют различия в строении и развитии.



Понятие онтогенеза и его периоды

1.

Эмбриональный этап

Он начинается с образования зиготы и продолжается до рождения, вылупления или выхода личинки из яйцевых оболочек. Именно в это время закладываются основные признаки будущего организма.

2.

Постэмбриональный этап

После завершения эмбриогенеза организм растёт, достигает половой зрелости, размножается, стареет и завершает жизненный цикл. У разных животных этот период может занимать значительно больше или меньше времени.

Зигота как исходная клетка развития

Результат оплодотворения

Зигота образуется при слиянии мужской и женской гамет и получает диплоидный набор хромосом. С этого момента начинается развитие нового организма с уникальной наследственной программой.

Наследственная информация


В зиготе уже содержится полный набор генетических инструкций, необходимых для дальнейшего формирования тела, органов и тканей. Именно они направляют все последующие этапы эмбриогенеза.

Первые деления

Сначала зигота делится без заметного увеличения общей массы зародыша. При этом число клеток быстро возрастает, а каждая новая клетка становится меньше по размеру.


Основа будущего организма

Хотя зародыш ещё очень прост, именно на этой стадии задаются исходные условия для дробления, образования зародышевых слоёв и последующего формирования органов.



Основные стадии эмбриогенеза

Последовательность стадий эмбрионального развития животных



Типы дробления у животных

Тип дробления определяется запасами желтка и его распределением в яйце. У разных групп животных это отражается на характере ранних делений зародыша.

При малом или равномерном желтке чаще развивается полное дробление, а при большом запасе — неполное.

Дробление и образование бластулы

Быстрые деления

После оплодотворения зигота начинает быстро делиться митозом. Общая масса зародыша почти не увеличивается, зато число клеток стремительно растёт.

Морула

Клетки становятся всё мельче и плотнее располагаются друг к другу. В этот момент зародыш напоминает компактный шар из бластомеров.

Бластула

Затем появляется полость — бластоцель, а зародыш приобретает форму бластулы. Это важная стадия, с которой начинается дальнейшая клеточная перестройка.

Сравнение бластулы и гастрюлы

Стадия	Строение	Листки	Значение
Бластула	1 слой, бластоцель	нет	Ранняя организация
Гастрюла	2–3 слоя клеток	есть	Закладка органов

Сопоставление двух ключевых стадий раннего эмбриогенеза помогает увидеть, как от простого строения зародыш переходит к закладке будущих тканей и органов.

Переход от бластулы к гастрюле означает появление зародышевых листков и переход к формированию тканей, органов и систем органов.

Гастрюляция и зародышевые листки

Перемещение клеток


Гастрюляция сопровождается активным перемещением клеток зародыша. В результате формируются зародышевые листки, из которых затем развиваются все основные ткани и органы животного.

Эктодерма и энтодерма

Эктодерма даёт начало нервной системе и эпидермису кожи, а энтодерма формирует кишечник и пищеварительные железы. Эти листки задают основу для внутренних и внешних покровов.


Мезодерма

Мезодерма образует мышцы, кости, кровеносную, выделительную и половую системы. Благодаря ей организм получает структуры, обеспечивающие движение, транспорт веществ и размножение.



Способы гаструляции у животных

Способы зависят от количества желтка, строения яйца и особенностей развития группы



Органогенез как формирование органов и систем

1. Начало этапа

Органогенез начинается сразу после гаструляции, когда зародыш уже имеет зародышевые листки. С этого момента клетки получают разные направления развития и начинают образовывать специализированные ткани.

2. Дифференцировка клеток

В ходе органогенеза клетки утрачивают одинаковость и приобретают строго определённые функции. Это позволяет будущему организму создать нервную, мышечную, выделительную и другие системы.

3. Закладка у хордовых

У хордовых первыми формируются нервная трубка, хорда и сомиты. Эти структуры задают общий план тела и служат основой для дальнейшего построения органов.

4. Завершение эмбриогенеза

Затем развиваются сердце, почки, кишечник и органы чувств. Когда основные органы и системы заложены, эмбриональный период достигает своей главной цели — подготовки к самостоятельной жизни.

Сроки эмбрионального развития у разных животных

Сроки приведены в днях для удобного сравнения: у человека эмбриональный период значительно длиннее, чем у других животных на диаграмме.

Продолжительность развития резко различается, но зависит не только от вида, а также от типа развития и условий, в которых созревает зародыш.

Развитие зародыша млекопитающих

Бластоциста находит место для начала жизни


После дробления у млекопитающих образуется бластоциста — стадия, готовая к имплантации. Она прикрепляется к стенке матки, где получает условия для дальнейшего развития и тесного взаимодействия с организмом матери.

Плацента как временный орган связи

Плацента возникает только на период беременности и выполняет сразу несколько функций. Через неё зародыш получает кислород и питательные вещества, а также отдаёт продукты обмена, не выходя из защитной среды матки.

Долгое внутриутробное развитие человека

У человека эмбрион и плод развиваются особенно долго, что связано со сложной организацией обмена веществ и высокой степенью защиты. Такой путь позволяет органам созревать постепенно и согласованно, без резких внешних воздействий.



Развитие зародыша птиц и рыб

Много желтка в яйце

У птиц и многих рыб в яйце много желтка, поэтому деления затрагивают лишь небольшой зародышевый диск. Остальная масса яйца служит запасом питания и ограничивает характер дробления.

Развитие вне организма матери

Зародыш развивается снаружи, а значит, его успех напрямую зависит от температуры, влажности, доступа кислорода и других условий среды. Для птиц это особенно заметно во время насиживания и инкубации.

Разные требования у птиц и рыб

У курицы оптимальная температура инкубации составляет около $37,5^{\circ}\text{C}$. У рыб решающее значение имеют температура воды, содержание кислорода и состояние водоёма, поскольку именно среда определяет темп и успешность развития.

Прямое развитие и развитие с метаморфозом

На схеме показаны три распространённые стратегии постэмбрионального развития, которые помогают видам по-разному приспосабливаться к среде обитания и способу питания.

Развитие без личинки характерно для одних групп, а метаморфоз позволяет другим резко менять образ жизни и использовать разные ресурсы на разных стадиях.

Влияние условий среды на эмбриогенез

Таблица показывает, что развитие зародыша зависит как от физических условий, так и от химических и биологических факторов.

Даже краткое неблагоприятное воздействие может изменить ход развития, поэтому эмбрион особенно уязвим к колебаниям среды.

Фактор	Влияние	Пример
Температура	Ускоряет или замедляет	Инкубация яиц
Кислород	Нужен для обмена	Развитие зародыша
Токсины	Вызывают нарушения	Загрязнённая среда

Причины нарушений эмбрионального развития

Наследственные изменения

Мутации могут нарушать работу генов, управляющих закладкой органов. В результате развитие идёт по отклонённому пути, что иногда приводит к врождённым аномалиям уже на ранних стадиях.

Влияние среды

Недостаток кислорода, радиация, никотин, алкоголь и некоторые лекарства способны вмешиваться в нормальные процессы деления и дифференцировки клеток. Чем раньше действует фактор, тем тяжелее последствия.

Инфекции и питание


Вирусные инфекции и дефицит питательных веществ нарушают обмен веществ зародыша и ослабляют его рост. Это повышает риск задержки развития и снижает жизнеспособность эмбриона.

Возможные последствия

Итогом нарушений могут стать пороки развития, снижение функций органов, задержка роста и даже гибель зародыша. Особенно опасны воздействия в период закладки основных органов и систем.

Как формируются признаки организма в ходе эмбриогенеза

Схема отражает последовательность клеточных и тканевых преобразований, на которых формируется фенотип животного.



Эволюционное значение эмбрионального сходства

Единый план на ранних стадиях

Если сравнить ранние зародыши рыб, амфибий, птиц и млекопитающих, заметен общий план строения тела. Это сходство особенно важно, потому что оно появляется до того, как различия становятся ярко выраженными и легко узнаваемыми.

Эмбриология как аргумент эволюции

Сходство зародышей используют в сравнительной анатомии и филогенетике как одно из доказательств общего происхождения позвоночных. Такие наблюдения помогают связывать внешние различия взрослых животных с их общими ранними этапами развития.



Онтогенез: ключ к пониманию развития животных

Онтогенез показывает, как из одной клетки формируется сложный организм. Изучение эмбрионального развития помогает понять наследственность, врождённые нарушения и родство животных, а также важно для медицины, ветеринарии и селекции.