


Класс Земноводные, или Амфибии

Познакомьтесь с животными, живущими и в воде, и на суше.




Возникновение и эволюция амфибий

Около 370 миллионов лет назад появились первые амфибии — переходные формы от рыб к наземным позвоночным. Сегодня насчитывается более 8 тысяч видов земноводных по всему миру, кроме Антарктиды.



Характерные особенности земноводных



Влажная и проницаемая кожа

Кожа амфибий не имеет чешуи и покрыта слизью, что позволяет им дышать через кожу и впитывать воду, поддерживая гидратацию.



Четырёхсуставные конечности


Большинство земноводных обладают четырьмя конечностями, что помогает им передвигаться как в воде, так и на суше.



Двойная стадия жизни

Жизненный цикл включает водный личиночный этап и наземную взрослую стадию с метаморфозом, меняющим строение и образ жизни.

Три основные группы земноводных



Хвостатые амфибии — тритоны и саламандры

Обладают длинным телом с хвостом, который сохраняется всю жизнь. Многие ведут скрытный образ жизни в лесах и водоёмах.



Бесхвостые — лягушки и жабы

Отличаются коротким туловищем и мощными задними лапами для прыжков, широко распространены и разнообразны по средам обитания.



Безногие амфибии — червяги

Похожие на червей и ведущие подземный образ жизни, эти редкие амфибии встречаются в тропиках и почти не видны человеку.

Особенности хвостатых земноводных



1

Тело вытянутое с хорошо развитым хвостом, который используется для плавания и равновесия на суше.

2

Ареал охватывает умеренные зоны Северной Америки, Европы и Азии, где они обитают в пресных водах и влажных лесах.


3

Включают такие виды, как тритон обыкновенный и пятнистая саламандра, известные способностью к регенерации.

4

Некоторые способны восстанавливать утраченные конечности и части тела в течение короткого времени.

Ключевые черты бесхвостых амфибий



1


Имеют укороченное тело без хвоста с мощными задними ногами, приспособленными для прыжков и быстрого передвижения.

2

Самый многочисленный отряд: включают лягушек и жаб, обитающих в разных климатических поясах по всему миру.

3

Некоторые виды способны выживать в экстремальной засухе, впадая в состояние оцепенения.




200

примерное число
видов червяг,
известных науке
сегодня,
сосредоточенных в
тропических лесах и
почве влажных
регионов.

Эта редкая группа
амфибий играет
важную роль в
экосистемах тропиков,
занимая нишу
подземных хищников.

✦ Источник: Биологические справочники по Амфибиям

Российские земноводные: основные представители



Лягушка остромордая

Распространена в европейской части России, характерна острым носом и способностью к быстрому размножению весной.



Жаба обыкновенная

Частый обитатель лесных и сельских ландшафтов, отличается грубой кожей и яркой окраской в брачный сезон.



Тритон обыкновенный

Водный и наземный образ жизни сочетается с характерной полосатой окраской и способностью к регенерации.

Анатомия амфибий: тело и внутренние органы

1


Внешнее строение и кожа

Тело состоит из головы, туловища и четырёх конечностей. Кожа голая, покрыта слизистыми железами и часто окрашена для защиты от хищников.

2

Внутренние органы и система кровообращения

Сердце трёхкамерное: два предсердия и один желудочек. Простые легкие обеспечивают газообмен, почки выводят продукты обмена веществ.



Дыхание и кровообращение амфибий

- Взрослые земноводные используют лёгкие и кожу для дыхания, что обеспечивает жизнедеятельность в разных средах обитания.
- Сердце смешивает артериальную и венозную кровь, поэтому органы получают кровь с умеренной концентрацией кислорода.



Пищеварительная система амфибий

1

Ротовая полость амфибий оснащена короткими зубами, которые помогают удерживать добычу, а также длинным липким языком для ловли насекомых на значительном расстоянии.

2

Основу рациона составляют насекомые, моллюски, мелкие черви и другие беспозвоночные, служащие важным звеном в пищевой цепи.

3

Пища сначала попадает в желудок, где начинается её переваривание с помощью ферментов, затем перемещается в кишечник для окончательного усвоения питательных веществ.

4

Процесс пищеварения адаптирован к особенностям сред обитания, что обеспечивает эффективное получение энергии и поддержание жизнедеятельности организма.

Значение влажной кожи

1

Влажная кожа амфибий играет ключевую роль в дыхании, позволяя газам проникать напрямую в кровеносные сосуды через поверхность тела.

2

Слизистые железы выделяют увлажняющий секрет, предотвращая высыхание кожи даже в относительно сухих условиях.


3

Некоторые виды способны выделять через кожу ядовитые вещества, которые обеспечивают защиту от хищников и патогенов.

Жизненный цикл лягушки: этапы развития

Каждая стадия жизненного цикла сопровождается значительными морфологическими изменениями, подготавливающими к переходу из воды на сушу.

Продолжительность стадий указывает на быстрое развитие личинок, что повышает шансы на выживание в условиях изменчивой среды.



Метаморфоз у амфибий

1

Метаморфоз представляет собой комплексное анатомическое и физиологическое преобразование личинки в взрослое животное с формированием легочного дыхания.

2

Появление конечностей и исчезновение хвоста обеспечивают амфибиям возможность эффективного передвижения по суше и воде.

3

Изменения в строении ротового аппарата позволяют взрослым амфибиям переключиться на иные способы питания, характерные для наземного образа жизни.


Поведение и приспособления к среде

1


Амфибии преимущественно активны в сумеречное и ночное время, что помогает им избегать перегрева тела и снижения влаги, обеспечивая оптимальные условия для жизнедеятельности.

2

Многие виды обладают защитной окраской и ядовитыми железами; их присутствие рядом с водоёмами или влажными местами критично для размножения и питания.



Способы размножения и забота о потомстве



1

Период размножения

Большинство амфибий скопляются в водоёмах для нереста, где самки откладывают яйца, а самцы оплодотворяют их внешне.

2


Защита кладки

Некоторые виды проявляют заботу, охраняя икру от хищников и неблагоприятных условий, поддерживая благоприятный микроклимат.

3

Выкармливание и перенос потомства

У уникальных видов самцы могут переносить икру на спине или в ротовой полости, обеспечивая безопасность молодняка до самостоятельной жизни.



Сравнение лягушек, жаб и тритонов





Таблица обобщает ключевые отличия и адаптации трёх групп амфибий по внешнему виду, среде обитания, способам движения и питанию.

Параметр	Лягушки	Жабы	Тритоны
Окраска	Яркая, гладкая	Камфляжная, бородавчатая	Спокойные цвета, гладкая
Среда обитания	Леса, болота, вода	Суша, леса, вода	Вода, влажные места
Движение	Прыжки	Прыжки, ползание	Ползание, плавание
Питание	Насекомые	Насекомые	Беспозвоночные

Различия отражают экологические стратегии, повышающие приспособленность к разным условиям среды обитания.

Враги и угрозы для амфибий

- Основные хищники амфибий — перелетные птицы, змеи и мелкие млекопитающие, регулирующие численность популяций в дикой природе.
- Главными угрозами для амфибий стали уничтожение мест обитания, загрязнение водоемов, изменение климата и распространение болезней, что вызывает сокращение популяций.



Экологическая роль и охрана амфибий



1

Амфибии контролируют популяции вредных насекомых, снижая ущерб сельскому хозяйству и способствуя экологическому равновесию.

2

Они служат пищей для многих хищников, занимая важное место в пищевых цепях.

3

Многие виды включены в Красные книги, требуя усиленной охраны и мониторинга состояния их популяций.

4

Создаются заповедники и природоохранные программы, направленные на сохранение местообитаний и предотвращение дальнейшего исчезновения видов.

Значение земноводных: итоги и перспективы

Земноводные — ключевые индикаторы здоровья экосистем, их сохранение важно для устойчивого развития природы и предотвращения экологического дисбаланса в будущем.

