

Обзор эволюции жизни на Земле

История жизни на Земле – более 4 миллиардов лет
изменения и развития.



Уникальные условия зарождения жизни

Земля сформировалась около 4,6 млрд лет назад. Появление воды, атмосферы и энергии создало первые предпосылки для возникновения жизни.



Появление и значение прокариотов



Возникновение прокариотов

Около 3,8 млрд лет назад появились первые прокариоты — бактерии и археи, простейшие одноклеточные организмы без ядра.



Роль цианобактерий

Цианобактерии начали фотосинтезировать, выделяя кислород и изменяя атмосферу Земли, что позволило появиться новым формам жизни.



Формирование озонового слоя

Повышение кислорода создало озоновый слой, который защитил организмы от вредного ультрафиолетового излучения и способствовал эволюции.

Крупнейшие эры эволюции

Хронология основных геологических эр и ключевые живые организмы, характеризующие каждый период.

Эволюция сопровождалась сменой доминантных форм жизни и усложнением организмов.


Геологические данные и палеонтология

Эра	Период (млн лет)	Основные события
Архей	4000–2500	Доминирование прокариот
Протерозой	2500–541	Формирование эукариот и многоклеточных
Палеозой	541–252	Выход жизни на сушу, развитие позвоночных
Мезозой	252–66	Эпоха динозавров
Кайнозой	66 – настоящее время	Разнообразие млекопитающих и появление человека

Появление эукариот и многоклеточных

1 Около 2 млрд лет назад появились эукариоты — клетки с ядром и органеллами, что позволило увеличить сложность строения организмов.

2 Примерно 800 млн лет назад сформировались многоклеточные, которые дали начало разнообразию сложных форм жизни и специализации клеток.



Кембрийский взрыв: быстрый рост разнообразия

Около 540 млн лет назад

Начались первые сложные морские организмы с твёрдыми скелетами, что улучшило выживаемость.

Появление трилобитов

Эти морские беспозвоночные стали одними из первых доминирующих животных с прочным панцирем.

Возникновение археоциатов

Ранние кораллообразные способствовали формированию экосистем на морском дне.

Ускорение эволюции


Разнообразие форм жизни выросло быстро, открывая новые пути адаптации и развития.

Изменение биоразнообразия во времени


Рост количества видов не был равномерным, отмечены пики в кембрийский и мезозойский периоды.

Массовые вымирания резко снижали разнообразие, но за ними следовали новые всплески: жизнь адаптировалась и усложнялась.

Палеонтологические исследования и анализ ископаемых данных




Выход жизни на сушу




Первое растение

Около 450 млн лет назад появились сосудистые растения, начавшие формировать первые леса на суше.




Древнейшие насекомые

Насекомые первыми освоили наземную среду, помогая распространяться растениям и создавая экосистемы.



Защита от высыхания

Организмы развили защитные оболочки и механизмы сохранения влаги для жизни вне воды.



Появление условий

Новые условия суши стимулировали адаптацию и появление новых форм жизни.

Первые позвоночные животные



Происхождение и особенности


Рыбообразные с позвоночником появились около 500 млн лет назад, обеспечив устойчивость и гибкость движения в воде.

Развитие и освоение суши

Позже возникли амфибии и рептилии, которые начали покорять сушу, адаптируясь к наземным условиям и расширяя среду обитания.

Эволюция позвоночных: основные этапы

Данные палеонтологии и сравнительной анатомии



Массовые вымирания и их причины

За историю Земли произошло пять масштабных массовых вымираний, в которых бесследно исчезали сотни миллионов видов растений и животных, значительно меняя жизнь на планете.

Пермское вымирание было самым катастрофическим — около 96% морских и 70% наземных видов исчезли из-за вулканической активности, изменения климата и падения метеоритов.

После каждого массового вымирания происходил быстрый эволюционный рост новых групп организмов, что способствовало появлению многочисленных разнообразных форм жизни.

Период господства динозавров

Разнообразие динозавров

В мезозойскую эру появились разнообразные динозавры: массивные травоядные, как диплодоки и трицератопсы, и грозные хищники, например тираннозавры. Они занимали разные экологические ниши.



Другие представители рептилий

В те же времена появились древние крокодилы и летающие птерозавры, обитавшие в воздухе и воде, что усиливало разнообразие рептилий на суше и в водоемах.



Распространение и обнаружение

Останки динозавров находят на всех континентах, что свидетельствует о широкой адаптации и освоении различных экосистем на планете в то время.



Появление птиц и млекопитающих

Около 150 млн лет назад

Появился археоптерикс — первая птица, возникшая из мелких хищных динозавров, совмещающая черты рептилий и птиц.

Поздний триас (около 220 млн лет назад)

Возникли первые млекопитающие с дифференцированными зубами и шерстью, что обеспечивало новые возможности для выживания.

После исчезновения динозавров (66 млн лет назад)



Птицы и млекопитающие активно развивались и осваивали освободившиеся экосистемы, заняв доминирующие позиции на суше.

Вымирание динозавров: причины и последствия

Основная причина — падение астероида, вызвавшее глобальные катастрофы и резкое охлаждение климата, дополненное вулканической активностью.

Исчезновение динозавров привело к освобождению экосистем, что ускорило эволюцию млекопитающих и птиц и изменило структуру биосферы.

Данные по палеонтологии, опубликованы в 2020 году



Рассвет млекопитающих в кайнозое

После исчезновения динозавров млекопитающие быстро заняли разные экологические ниши, обретая новые размеры и приспособления.

Появились крупные виды-предки современных китов, лошадей и мастодонтов, что свидетельствует о масштабных эволюционных изменениях.

Формировались разнообразные группы: хищники, грызуны, приматы — каждая с уникальными способностями и адаптациями к среде обитания.


Расширение ареалов и освоение различных сред обеспечили высокий уровень биологического разнообразия млекопитающих к настоящему времени.

Первые приматы и их значение



Появление приматов

Около 60 млн лет назад появились первые приматы с хорошим зрением и хватательными руками, что улучшило их ориентирование в лесной среде и поиск пищи.



Эволюция гоминид

Африканские антропоиды, отличаясь увеличенным мозгом и способностью к прямохождению, стали предками человека, развивая социальное поведение и обучение.

Возникновение рода Homo

Род Homo возник около 2,5 млн лет назад, отметившись использованием примитивных орудий, что повысило эффективность добычи пищи и выживания.

Homo erectus научился использовать огонь и распространился по Евразии, освоив коллективную охоту и улучшив социальные навыки.

Развитие речи и зарождение культуры заложили основу для сложного общественного взаимодействия и дальнейшего прогресса человека.


Современный человек: Homo sapiens



Homo sapiens появился около 300 тысяч лет назад в Африке, развив сложную речь и творческие способности, выраженные в пещерном искусстве.


Распространившись по всему миру, человек влиял на природу, создавал инструменты и начал оседлый образ жизни, меняя окружающую среду.

Глобальное влияние человека на биосферу



Изменение экосистем

Человек преобразил природу через сельское хозяйство и урбанизацию, что приводит к изменению естественных экосистем и снижению биоразнообразия.



Промышленное загрязнение

Распространение фабрик и транспорта вызвало загрязнение воздуха и воды, что негативно сказывается на здоровье организмов и экологии.



Климатические изменения

Выбросы парниковых газов усилили глобальное потепление, приводя к экстремальным погодным условиям и угрозам для многочисленных видов живых существ.

Почему важно изучать ЭВОЛЮЦИЮ ЖИЗНИ

Знания об эволюции помогают понять развитие жизни и актуальные природные вызовы, поддерживая сохранение биосферы и устойчивость природы на Земле.

