

Первоначальная обработка раны и повязки: зачем это нужно

Как быстро очистить рану и защитить её повязкой



Зачем школьнику знать правила обработки ран

Небольшая травма может случиться на перемене, на спортплощадке или дома. Если знать простые шаги первой помощи, можно вовремя остановить кровь, уменьшить риск инфекции и понять, когда нужна помощь взрослого.



Какие бывают раны

.01

Ссадина повреждает только верхний слой кожи. Она часто появляется после падения на асфальт, бетон или при трении о твёрдую поверхность, поэтому обычно выглядит как широкое поверхностное повреждение.

.02

Порез имеет ровные края и возникает от ножа, стекла или острого металла. Такая рана нередко кровоточит сильнее, чем кажется по её размеру, особенно если задеты сосуды.

.03


Колотая рана снаружи может выглядеть маленькой, но внутри быть глубокой. Это опасно тем, что грязь и микробы попадают в узкий канал, а обработать его сложнее.

.04

Рваная рана имеет неровные края и часто сильнее загрязняется. Она может болеть дольше и требует особенно аккуратной очистки и надёжной защиты повязкой.

Порядок действий при первой помощи

Последовательность основана на общих правилах первой помощи при небольших ранах.



Что пригодится для обработки раны



Базовый набор для быстрой помощи

В домашней аптечке должны быть чистая вода или физраствор, стерильные салфетки и бинт. Эти предметы помогают сначала очистить рану, а затем сразу закрыть её от грязи и случайного трения. Без них обработка занимает больше времени и становится менее аккуратной.



Защита рук и кожи

Одноразовые перчатки и антисептик помогают сделать помощь более безопасной. Перчатки защищают человека, который оказывает помощь, а антисептик используют для кожи вокруг повреждения. Так уменьшается вероятность занести микробы в рану во время обработки.



Что ещё должно быть под рукой

Пластырь, марля и ножницы помогают удобно закрепить повязку и подогнать её по размеру. На иллюстрации уместны именно такие привычные предметы аптечки: они выглядят просто, но позволяют быстро собрать надёжную защиту для небольшой раны.

Что можно и чего нельзя использовать при обработке

Сравнение показывает, какие средства подходят для безопасной первой помощи, а какие могут навредить ране.

Для раны важны мягкое очищение и защита кожи вокруг неё. Агрессивные средства и волокнистые материалы внутри раны повышают боль и риск осложнений.

Можно	Нельзя
вода, физраствор	спирт внутрь раны
антисептик вокруг	вата внутрь раны
йод/зелёнка по краям	сыпать порошки

Правила первой помощи

Как остановить небольшое кровотечение



На рану накладывают стерильную салфетку и прижимают её рукой 5–10 минут. Важно не подглядывать слишком рано, чтобы сгусток крови успел образоваться и кровотечение уменьшилось.




Если рана на руке или ноге и нет подозрения на перелом, конечность лучше приподнять. Это помогает уменьшить приток крови к повреждённому месту и сделать давление на салфетку эффективнее.



Если кровь быстро проходит через повязку, сверху кладут ещё один слой, не снимая первый. Сильное кровотечение, которое не останавливается, требует срочной помощи взрослых и врачей.

Типичные ошибки при обработке раны

■ Грязные руки ■ Спирт внутрь раны ■ Тугой бинт ■ Не вынимают повязку
■ Удаление предметов



Обобщение правил первой помощи для учебных материалов

Чаще всего ошибки связаны не со сложными действиями, а с нарушением простых правил чистоты и осторожности.

Самые вредные ошибки — загрязнение раны и использование неподходящих средств. Они чаще всего приводят к воспалению и повторному кровотечению.

Как правильно промывать рану

Сначала подготовить воду ▶▶▶ Аккуратно удалить загрязнение ▶▶▶ Сразу закрыть повязкой ▶

Возьмите чистую проточную воду или физраствор. Это нужно, чтобы смыть песок, пыль и мелкие частицы без лишнего раздражения ткани.

Промывайте рану мягкой струёй, не трите её и не пытайтесь соскоблить грязь. Так меньше риск расширить повреждение и усилить боль.

Если в ране есть стекло, металл или крупный осколок, его не вынимают самостоятельно. После промывания рану быстро защищают стерильной повязкой.

Обработка кожи вокруг раны



Антисептик наносят только на кожу вокруг повреждения и двигаются от края раны наружу. Так уменьшается количество микробов на коже, но сама раневая поверхность не раздражается лишний раз.



Для этого удобно использовать ватную палочку или стерильную салфетку. Важно не лить средство внутрь раны без необходимости и сразу перейти к наложению чистой повязки.

Правила наложения стерильной повязки

.01

Сначала убедитесь, что салфетка полностью закрывает рану и остаётся стерильной. Не трогайте её руками и не позволяйте краям касаться грязных поверхностей, чтобы не занести микробы.

● **.02**


Бинт накладывайте ровными витками, без складок и сильного натяжения. Повязка должна плотно держаться, но не сдавливать ткани и не усиливать боль при движении.

● **.03**

После фиксации проверьте пальцы ниже раны: они должны быть тёплыми, обычного цвета и без онемения. Если повязка мешает кровообращению, её нужно ослабить.

Как выбрать повязку по виду раны

Выбор зависит от размера, глубины, места повреждения и силы кровотечения.



Повязки на разных частях тела



Кисть

Повязка на кисти должна надёжно закрывать рану, но оставлять пальцы подвижными. После фиксации важно проверить, не мешает ли бинт сгибать и разгибать пальцы.




Голова

На голове повязку закрепляют особенно аккуратно, чтобы она не сползала при движении. Материал должен держаться плотно, но не давить на кожу и не вызывать дискомфорт.



Сустав

На локте, колене или другом суставе бинт делают с учётом движения. Он не должен быть слишком жёстким, иначе при сгибании повязка быстро ослабнет или начнёт мешать.



Нога

На ноге после наложения повязки проверяют отёк, цвет кожи и ощущения ниже раны. Если появляются холод, бледность или онемение, повязку нужно ослабить и сообщить взрослому.

Признаки неправильно наложенной повязки

Признак	Что это значит
Пальцы холодные	Слабое кровообращение
Боль усилилась	Повязка давит
Онемение	Нарушена фиксация

Если повязка мешает кровообращению или плохо закреплена, появляются заметные тревожные признаки.

Холод, боль и онемение чаще всего указывают на слишком тугую повязку. Если бинт сползает или кровь просачивается, его нужно заменить или наложить заново.

Правила первой помощи

Когда нужна помощь врача

.01

Обратиться к врачу нужно, если рана глубокая, рваная или колотая. Такие повреждения могут затронуть ткани сильнее, чем кажется снаружи, и требуют профессиональной оценки.

.03

Если рана находится на лице, шее, суставе или сопровождается потерей чувствительности, домашней помощи недостаточно. Важно не затягивать с осмотром, чтобы избежать осложнений.


.02

Срочная помощь необходима при сильном кровотечении, укусе животного, попадании стекла или грязи. В этих случаях риск инфекции и осложнений намного выше, чем при обычной ссадине.

.04

Врач нужен и тогда, когда края раны сильно расходятся или повреждение долго оставалось без обработки. Чем раньше начато лечение, тем лучше идёт заживление.

Наблюдение за раной в первые дни



Обобщение правил наблюдения за раной в первые 7 дней

Даже небольшая рана требует ежедневного контроля: повязка должна оставаться чистой и сухой, а самочувствие — постепенно улучшаться.

Если боль и отёк уменьшаются, заживление идёт нормально. Усиление покраснения, жара и выделение гноя указывают на возможное воспаление.

Признаки возможной инфекции



Утро после игры

Сначала была только царапина на колене, но к вечеру вокруг неё появилось яркое красное кольцо. Ребёнку стало больно сгибать ногу, а кожа рядом с раной стала заметно горячее. На иллюстрации хорошо виден контраст между спокойной кожей и воспалённым участком.



Повязка, которую пора проверить

После прогулки повязка выглядела нормально, но через некоторое время под ней появился неприятный запах и жёлтые выделения. Рана стала больше болеть, а отёк увеличился. Для изображения подойдёт сравнение чистой заживающей поверхности и участка с признаками инфекции.

Что нельзя делать при обработке раны

.01

Нельзя трогать рану грязными руками, потому что на коже и под ногтями остаются микробы. Даже короткое касание может занести инфекцию и замедлить заживление.

.02

Не следует лить спирт внутрь раны, сыпать порошки или закрывать её грязной тканью. Такие действия раздражают ткани, усиливают боль и мешают правильной обработке.

.03

Нельзя глубоко вынимать стекло, щепки или другие предметы, если они застряли в ране. Это может вызвать повторное кровотечение и сделать повреждение ещё опаснее.

.04

Не стоит срывать прилипшую повязку и туго перетягивать конечность. Сильное давление нарушает кровообращение, а резкое снятие снова травмирует кожу.

Домашняя аптечка для обработки ран



Стерильные материалы

В аптечке должны быть стерильные салфетки, бинт и лейкопластырь. Они помогают быстро закрыть рану и защитить её от пыли и случайного касания.



Чистые руки

Одноразовые перчатки нужны, чтобы не занести микробы во время помощи. Если перчаток нет, особенно важно тщательно вымыть руки перед обработкой.



Антисептик и раствор

Антисептик для кожи вокруг раны и физраствор для промывания помогают снизить количество микробов и аккуратно очистить повреждённое место без лишнего раздражения.



Дополнительные мелочи

Ножницы пригодятся для аккуратного отрезания бинта и пластыря. Полезно также проверять срок годности и целостность упаковок, чтобы всё было готово к использованию.

Главное о первой обработке раны

Безопасная помощь при ране всегда начинается с чистых рук, затем идут промывание, обработка вокруг повреждения и стерильная повязка. При сомнениях нужен взрослый и врач.

