


Клеточное строение растения: ключевые темы и значимость

Основные части растительной клетки и
их функции в жизни растения.



Истоки представления о клетке


Впервые термин «клетка» ввёл Роберт Гук в XVII веке при изучении пробки. В XIX веке Шлейден и Шванн сформулировали клеточную теорию — фундамент биологии, утверждающий, что все живые организмы состоят из клеток.



Строение растительной клетки: главные компоненты

Форма и структура клеток растений

Растительные клетки имеют форму, похожую на прямоугольник или овал, благодаря клеточной стенке, придающей прочность и стабильность. Внутри них размещаются специализированные органоиды, направленные на выполнение разнообразных функций.



Функция вакуоли и хлоропластов

Вакуоль занимает большую часть клетки и хранит воду и питательные вещества, поддерживая тургор. Хлоропласты обеспечивают фотосинтез, захватывая световую энергию для производства пищи.



Клетки объединяются в ткани

Несколько клеток с одинаковой функцией формируют ткань. Например, покровные клетки защищают растение, а проводящие клетки транспортируют воду и питательные вещества по всему организму.



Клеточная стенка: опора и защита



Клеточная стенка состоит преимущественно из целлюлозы, создавая прочный каркас, который сохраняет форму клетки и всей ткани.

Она предотвращает механические повреждения и разрывы, особенно при воздействии внешних факторов, таких как ветер и давление.

Структура стенки обеспечивает барьер от проникновения патогенов, защищая клетки от инфекций и загрязнений.


Поры в клеточной стенке регулируют движение воды и минеральных веществ, поддерживая жизненный баланс внутри клетки.

Цитоплазма и плазматическая мембрана

- 1 Цитоплазма — это гелеобразное вещество внутри клетки, в котором расположены все органоиды. Здесь проходят важные химические реакции, поддерживающие жизнь клетки.
- 2 Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя липидов и белков, она контролирует обмен веществ, пропуская полезные вещества внутрь и выводя продукты обмена наружу.



Ядро: хранение и передача наследственной информации



- 1 Ядро содержит хромосомы с ДНК, где хранится генетический код, определяющий свойства и развитие растения. Это центр управления клеткой.
- 2 В ядре находится ядрышко, отвечающее за синтез рибосом — структур, производящих белки для клетки. Размер и форма ядра зависят от функции клетки.

Хлоропласты — фотосинтетические фабрики



Строение и работа хлоропластов

Хлоропласты имеют внутренние мембраны — тилакоиды, упакованные в граны, где проходит фотосинтез. Они содержат хлорофилл, поглощающий свет для превращения энергии в химическую форму.

Особенности и возможности хлоропластов

Обладая собственной ДНК, хлоропласты способны к делению и адаптации. Они играют ключевую роль в производстве углеводов, поддерживая жизнедеятельность растения и всей экосистемы.

Вакуоль: резервуар воды и веществ




Вакуоль — большой пузырь, занимающий до 90% объёма клетки, хранит воду, что поддерживает тургор и помогает растению сохранять форму.

Она накапливает питательные вещества, минеральные соли и отходы обмена, регулируя внутреннюю среду клетки в ответ на изменения окружающей среды.

Функция вакуоли важна для устойчивости и здоровья клетки, она предотвращает увядание даже при дефиците воды.

Митохондрии: энергетический центр клетки

- 1 Митохондрии отвечают за производство энергии в форме АТФ через процесс клеточного дыхания, используя кислород и органические вещества.
- 2 Они имеют две мембраны, внутренняя создает складки — кристы, увеличивающие площадь для эффективного преобразования энергии.



Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи

Шероховатая эндоплазматическая сеть имеет рибосомы на поверхности и обеспечивает синтез белков, важных для клеточных функций.

Гладкая эндоплазматическая сеть не содержит рибосом и участвует в образовании липидов и детоксикации веществ.

Аппарат Гольджи состоит из мембранных мешочков, он сортирует, модифицирует и упаковывает молекулы для их транспортировки внутри клетки или за её пределы.

Эти органоиды вместе обеспечивают синтез и распределение веществ, необходимых для роста и поддержания клетки.




Таблица: сопоставление клеток растений и животных



Сравнение ключевых компонентов растительных и животных клеток показывает существенные различия и сходства. Растительные клетки обладают клеточной стенкой, крупной вакуолью и хлоропластами, отсутствующими у животных. Центриоли характерны для животных клеток. Формы органоидов варьируются в зависимости от типа клетки.

Клеточная стенка, крупная вакуоль и хлоропласты уникальны для растительных клеток, тогда как центроли характерны только для животных. Эти отличия обуславливают особенности функций и строения у двух типов клеток.

Компонент	Растительная клетка	Животная клетка
Клеточная стенка	Присутствует, из целлюлозы	Отсутствует
Вакуоль	Крупная центральная	Много мелких вакуолей или отсутствует
Хлоропласты	Есть, фотосинтезирующие	Отсутствуют
Центриоли	Отсутствуют или редки	Присутствуют
Форма клеток	Прямоугольная или округлая	Разнообразная, часто округлая


Фотосинтез, дыхание и транспорт веществ

Фотосинтез происходит в хлоропластах, где солнечный свет преобразуется в химическую энергию, синтезируя глюкозу и выделяя кислород как побочный продукт.

Митохондрии обеспечивают клетку энергией через окисление органических веществ, высвобождая АТФ, необходимый для жизнедеятельности.

Осмоз и диффузия — пассивные процессы транспорта воды и растворённых веществ через мембрану, поддерживающие клеточный обмен и гомеостаз.

Диаграмма: распределение органоидов в растительной клетке



Доминирующий объём вакуоли подчёркивает её роль в поддержании тургора и запаса веществ в клетке.

Большая вакуоль играет ключевую роль в клеточной гидратации, тогда как остальные органоиды занимают значительно меньшую площадь.

Современные данные по клеточной биологии растений, 2023

Клеточные включения: запасы и запасные вещества

Крахмальные зёрна как источник энергии

Крахмаловые зёрна накапливаются в клетках клубней и семян, служа энергетическим резервом при прорастании. Под микроскопом они заметны как крупные, плотные структуры, обеспечивая поддержку роста растения.



Жировые капли и белковые гранулы в клетках

Маслянистые капли хранятся в некоторых растительных клетках, обеспечивая источник энергии и защиту. Белковые гранулы аккумулируют строительные материалы, необходимые для метаболических процессов.



Разнообразие и специализация клеток у растений



The diagram illustrates the layers of a plant tissue cross-section. It features a grid of cells. The top layer consists of a single row of rectangular cells. Below this is a layer of larger, more irregularly shaped cells. The bottom layer is composed of several rows of rectangular cells. A central column of cells is highlighted with a white background and a black border. A white arrow points from the top layer down to the central column. A white square is located at the top of the central column. A white line with a black border runs diagonally from the top layer down to the central column.

Покровные клетки (эпидерма) защищают растение от внешних воздействий и регулируют обмен веществ с окружающей средой.


Механические клетки обеспечивают прочность тканей, защищая растение от повреждений и деформаций.

Проводящие клетки (ксилема и флоэма) отвечают за транспорт воды, минеральных веществ и органических соединений.

Основные клетки (паренхима) выполняют фотосинтез, запас питательных веществ и регенерацию тканей.

Жизненный цикл клетки растения

Последовательность этапов развития и старения клетки




Связи между клетками и обмен веществами

Плазмодесмы обеспечивают прямое сообщение между клетками, позволяя транспортировать воду, питательные вещества и сигнальные молекулы.

Эти соединения поддерживают согласованную работу клеток, необходимую для целостной функции тканей и органов растения.

Повреждение плазмодесм нарушает обмен веществ, ведет к клеточной дисфункции и может вызвать гибель тканей.




Формы растительных клеток: примеры и изображения



Вытянутые клетки волокнистой ткани

Волокнистые клетки имеют удлиненную форму, обеспечивающую механическую прочность растения. Их толстые стенки помогают выдерживать растяжение и нагрузки при ветре.



Округлые клетки паренхимы

Паренхимные клетки обычно округлые или полигональные, с тонкими стенками. Они заполняют пространство между другими тканями и участвуют в фотосинтезе и запасании веществ.



Звёздчатые клетки корня

Некоторые клетки корневой ткани имеют звёздчатую форму, что увеличивает площадь контакта и улучшает поглощение воды и минералов из почвы.


Значение клеточного строения для жизни и адаптации растений

Клеточная организация обеспечивает устойчивость к стрессам, таким как засуха и избыток воды, поддерживая гомеостаз.

Клеточное строение способствует адаптивным реакциям растений на изменения в освещении и температуре.

Эффективное фотосинтетическое функционирование достигается за счёт специализированных органоидов и структур клетки.

Знания строения клеток важны для совершенствования методов селекции и охраны растительного мира.



Клетка — фундамент жизни растений

Растительная клетка объединяет структуры и процессы, необходимые для роста, обмена веществ и защиты. Изучение её строения раскрывает основы биологии и помогает применять знания в науке и практике.

