

Органоиды клетки: ключевые структуры и их значение

Органоиды — важные структуры клетки, обеспечивающие её
жизненные процессы.



История изучения клеточных органоидов

- Первое описание клетки сделал Роберт Гук в XVII веке. В XIX веке микроскопия позволила учёным выявить органоиды, раскрывающие секреты жизни и здоровья организма.




Особенности цитоплазмы



Среда жизни клеточных органоидов

Цитоплазма — это густая жидкость, заполняющая клетку. В ней располагаются органоиды, а также растворённые вещества и ионы, необходимые для обмена веществ.




Роль цитозоля и воды

Цитозоль, составляющий большую часть цитоплазмы, содержит около 70–80% воды, что создаёт благоприятные условия для биохимических реакций и поддерживает внутреннее равновесие клетки.

Функции и строение ядра


Наследственная информация и генетический контроль

Ядро содержит ДНК и хромосомы, управляющие синтезом белков и делением клетки. Оно обеспечивает передачу наследственной информации от поколения к поколению.



Ядрышко и его роль

Внутри ядра находится ядрышко — место производства рибосомальных РНК, важных для создания белковых молекул, необходимых для жизнедеятельности клетки.




Митохондрии — генераторы энергии



Процесс клеточного дыхания

Митохондрии преобразуют питательные вещества в молекулы АТФ, обеспечивающие энергией все процессы внутри клетки. Для этого используется кислород и питательные вещества.



Строение и функции митохондрий

Эти органоиды имеют двойную мембрану с внутренними складками — кристами, где происходит синтез энергии. У них есть собственная ДНК, позволяющая им делиться независимо от клетки.

Сравнение количества органоидов в клетках

Количество органоидов отражает энергетические потребности клеток и их функции.

Нервные клетки имеют наибольшее число митохондрий, что объясняет их высокий метаболизм.



Данные учебной биологии, 2024

Эндоплазматическая сеть: функции и типы

● Гладкая ЭПС отвечает за синтез липидов, детоксикацию и хранение ионов кальция.


● Шероховатая ЭПС с рибосомами обеспечивает синтез белков и их транспорт к другим органоидам.

● Общие каналы ЭПС создают систему внутриклеточного обмена веществ и поддерживают структуру мембран.

Комплекс Гольджи: важный органоид транспорта


Основные функции комплекса

Комплекс Гольджи модифицирует белки и липиды, полученные из ЭПС, обеспечивает их упаковку в пузырьки для перевозки внутри клетки или наружу.



Роль в специализированных клетках

В железистых клетках комплекс особенно развит, благодаря чему эффективна выработка и выделение различных биологически активных веществ.



Сравнительная характеристика основных органоидов


Таблица показывает функции, строение и присутствие органоидов в растительных и животных клетках.

Органоиды обладают специфическими функциями, многие присутствуют во всех клетках, но некоторые — только в определённых.

Органоид	Функция	Строение	Растит. клетка	Животн. клетка
Ядро	Хранение ДНК	Крупное, с ядрышком	Да	Да
Митохондрии	Синтез АТФ	Двойная мембрана	Да	Да
ЭПС	Синтез белков/липидов	Сеть мембран	Да	Да
Комплекс Гольджи	Модификация, транспорт	Стопка цистерн	Да	Да
Лизосомы	Переваривание	Везикулы с ферментами	Редко	Да


Биология клетки, 2023

Лизосомы: функции и значение



Переваривание и обновление

Лизосомы расщепляют повреждённые органоиды и сложные молекулы, обеспечивая обновление клетки и утилизацию отходов.



Защита и контроль

Эти органоиды участвуют в защите клетки от инфекций и регулируют процессы клеточного цикла, способствуя нормальному развитию и выживанию клетки.

Пероксисомы: обезвреживание ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Пероксисомы содержат специальные ферменты, которые расщепляют перекись водорода — опасное для клетки вещество — превращая её в воду и кислород. Это защищает клетку от повреждений.


Кроме разложения перекиси водорода, пероксисомы участвуют в окислении жирных кислот, помогая эффективно использовать их как источник энергии для клетки.

Эти органоиды обнаружены во всех эукариотических клетках, особенно высока их концентрация в печени и почках позвоночных, где проходит интенсивная детоксикация.

Рибосомы: фабрики по производству белка

Структура рибосом и их расположение в клетке

Рибосомы состоят из двух субъединиц, построенных из рибосомальной РНК и белков. Они могут находиться свободно в цитоплазме или крепиться к шероховатой эндоплазматической сети, выполняя разные функции синтеза.



Роль рибосом в синтезе белков

Рибосомы ответственны за сборку аминокислот в цепочки — белки, важнейшие для строения и работы клетки. Они обеспечивают синтез как белков для внутренних нужд, так и для дальнейшей транспортировки за пределы клетки.



Цитоскелет: поддержка структуры и движение клетки

Микротрубочки обеспечивают перемещение органелл внутри клетки и участвуют в процессе деления, формируя так называемые веретена деления.

Микрофиламенты отвечают за поддержание формы клетки и её способности к движению, влияя на рост и изменение контура мембраны.

Промежуточные филаменты придают клетке прочность и обеспечивают устойчивость к механическим нагрузкам в тканях.


Цитоскелет играет ключевую роль в транспортировке веществ внутри клетки и в поддержании стабильности её структуры на протяжении всего жизненного цикла.

Биосинтетический путь белка в клетке

От генетической информации к работающему белку



Хлоропласты: фотосинтез и энергия растений



Структура хлоропластов и их компоненты

Хлоропласты содержат зеленый пигмент хлорофилл, внутренние мембранные тилакоиды и стромы с собственной ДНК. Эти элементы обеспечивают эффективное преобразование солнечного света в химическую энергию.



Фотосинтез и роль хлоропластов

Хлоропласты осуществляют фотосинтез — процесс создания глюкозы из углекислого газа и воды с помощью света. Это основной источник органических веществ и кислорода на Земле.

Сравнение органоидов в растительных и животных клетках

Органоид	Растительные клетки	Животные клетки
Вакуоль	Одна крупная, до 90% объема	Несколько мелких, меньшего размера
Хлоропласты	Присутствуют, фотосинтез	Отсутствуют
Клеточная стенка	Толстая, поддерживает форму	Отсутствует
Запасные вещества	Крахмал	Гликоген

Учебные материалы по цитологии, 2023

Таблица отражает наличие и особенности ключевых органоидов в клетках растений и животных, выделяя их уникальные характеристики.

Растительные клетки содержат уникальные органоиды, позволяющие поддерживать тургор, осуществлять фотосинтез и обмен веществ, в отличие от животных.

Вакуоли: резервуары и регуляторы водного баланса


Функции крупных вакуолей в растительной клетке

Крупная центральная вакуоль занимает основное пространство в растительной клетке. Она аккумулирует воду, питательные вещества и продукты обмена, создавая внутреннее давление — тургор,



Вакуоли и поддержание гомеостаза

Вакуоли регулируют концентрацию растворенных ионов и участвуют в удалении отходов, таким образом поддерживая внутреннюю среду клетки в устойчивом состоянии, что важно для её нормальной работы.



Клеточная мембрана: барьер и регулировщик обмена веществ

Мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов с встроенными белками и углеводами, формируя селективный барьер между клеткой и окружающей средой.

Она контролирует транспорт ионов, воды и молекул через специальные каналы и переносчики, обеспечивая нужный состав внутренней среды клетки.

Помимо защиты, мембрана участвует в межклеточных взаимодействиях и передаче сигналов, влияя на координацию процессов тканей.

Органоиды в прокариотических клетках

Прокариоты не имеют мембранных органоидов; их клеточная структура проще по сравнению с эукариотами, что отражается на функциях и организации процессов.

Мезосомы представляют собой впячивания мембраны, связанные с энергетическим обменом и разделением клетки при делении.

Рибосомы прокариотов меньше и свободно плавают в цитоплазме, обеспечивая синтез белка без складчатых мембранных систем.

Генетический материал находится в нуклеоиде — области с кольцевой ДНК, не окружённой мембраной, что отличает прокариоты от животных и растительных клеток.

Ключевая роль органовидов в жизнедеятельности клеток

Органовиды совместно обеспечивают жизненные процессы клетки — обмен веществ, передачу информации, энергию и защиту. Их слаженная работа необходима для развития и адаптации всех живых организмов.