


Применение разных способов разложения многочлена на множители

Как выбрать подходящий способ разложения?





Зачем нужны способы разложения в 7 классе

Разложение на множители помогает укорачивать записи, быстрее считать и решать уравнения. Один и тот же многочлен можно преобразовать по-разному, если заметить его структуру.

Что значит разложить многочлен на множители

Запись в виде произведения

Разложение на множители означает, что многочлен переписывают как произведение двух или нескольких выражений, не изменяя его значение, а только форму записи.

Какие бывают множители

Множителями могут быть числа, буквы и более сложные выражения. Поэтому важно уметь узнавать общую структуру многочлена и выбирать подходящий способ разложения.

Простой пример

Например, выражение $x^2 - 9$ можно представить как $(x - 3)(x + 3)$. Такое преобразование делает выражение удобнее для вычислений, преобразований и дальнейших действий.

Основные способы разложения и когда их применяют

Для разных многочленов подходят разные приёмы. Таблица помогает быстро сопоставить вид выражения и удобный способ разложения.

Сначала стоит искать самый очевидный признак: общий множитель, затем переходить к более специальным видам многочленов.

Способ	Признак	Пример
Общий множитель	Есть в каждом члене	$6x^3+9x^2$
Группировка	4 или 6 членов	$ax+ay+bx+by$
Формулы	Вид a^2-b^2	x^2-16
Трёхчлен	Вид ax^2+bx+c	x^2+5x+6
Замена переменной	Повторяется степень	x^4-5x^2+4

Вынесение общего множителя за скобки

01

Найти общий элемент

Сначала нужно проверить, есть ли число, буква или выражение, на которое делится каждое слагаемое. Если такой общий элемент есть, его можно вынести за скобки.

02

Записать произведение

В примере $6x^3 + 9x^2$ общий множитель — $3x^2$. После вынесения получаем $3x^2(2x+3)$, и исходное выражение становится короче и удобнее для дальнейших преобразований.

03

Польза при разложении


Этот способ часто открывает путь к следующему преобразованию: иногда после вынесения общего множителя внутри скобок становится заметна знакомая формула или более простая структура.



Как часто встречаются разные способы в школьных примерах

Диаграмма показывает не точную статистику, а типичную учебную заметность при изучении темы.


В базовых заданиях чаще всего встречаются общий множитель и формулы сокращённого умножения; замена переменной обычно появляется реже.



Схематическая оценка по типичным заданиям 7 класса; данные условные

Алгоритм выбора способа разложения

Последовательность поиска построена от самого простого признака к более сложным случаям.



Разложение способом группировки

1

Разделить на части

Группировка удобна, когда многочлен можно разбить на две пары или две части так, чтобы в каждой из них появился свой общий множитель.

2

Выделить одинаковую скобку

В выражении $ax+ay+bx+by$ сначала получают $a(x+y)+b(x+y)$, а затем выносят общую скобку: $(a+b)(x+y)$. Именно повторяющаяся скобка делает способ успешным.

3

Где он полезен

Этот приём особенно помогает в многочленах с четырьмя членами, когда для всего выражения общий множитель не виден сразу, но он есть внутри частей.

Формула разности квадратов

+ Основная запись

Если выражение имеет вид $a^2 - b^2$, его можно разложить по формуле $(a - b)(a + b)$. Здесь важно, что оба слагаемых являются полными квадратами.

+ Два примера

Например, $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$, а $9y^2 - 25 = (3y - 5)(3y + 5)$. В обоих случаях сначала узнаются квадраты, а затем записываются две скобки.

+ Когда формула не подходит

Эта формула работает только при знаке минус между квадратами. Если хотя бы одно из выражений не является полным квадратом, нужно искать другой способ.

Формулы сокращённого умножения, нужные для разложения

Формула	Вид
$a^2 - b^2$	разность квадратов
$a^2 + 2ab + b^2$	квадрат суммы
$a^2 - 2ab + b^2$	квадрат разности
$a^3 - b^3$	разность кубов
$a^3 + b^3$	сумма кубов

Некоторые формулы позволяют сразу перейти от суммы или разности к произведению. Важно узнавать знакомый вид выражения по крайним членам.

Если первый и последний члены совпадают с известной формой, разложение можно выполнить быстрее, без длинных преобразований.

Квадратный трёхчлен и его разложение

Распознаём вид

Квадратный трёхчлен записывается как ax^2+bx+c . Сначала нужно увидеть три члена, затем проверить, можно ли подобрать два числа, которые одновременно дают нужную сумму и произведение.

Подбираем множители

Для выражения x^2+5x+6 подходят числа 2 и 3: их сумма равна 5, а произведение — 6. Поэтому многочлен раскладывается как $(x+2)(x+3)$.

Проверяем результат

После разложения полезно раскрыть скобки и сравнить ответ с исходным многочленом. Такая проверка помогает быстро заметить ошибку в знаке, числе или порядке множителей.

Неполные квадратные трёхчлены

01

Нет свободного члена

Если в выражении отсутствует свободный член, обычно можно вынести общий множитель. Например, $x^2 - 9x = x(x - 9)$, и запись сразу становится короче и удобнее для дальнейших действий.

02

Нет среднего члена

Когда пропадает второй член, часто появляется разность квадратов. В примере $4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$ легко узнать известную формулу и быстро получить ответ.

03


Почему это проще

Неполные трёхчлены легче распознавать, потому что в них меньше элементов для сравнения. Ученик быстрее замечает общий множитель или знакомую формулу и реже путается в вычислениях.

Частые ошибки при разложении на множители

Диаграмма показывает не реальные измерения, а типичную сложность ошибок на уроках: чем выше столбец, тем чаще ученики путаются в этом шаге.

Чаще всего проблемы возникают со знаками и распознаванием формулы, поэтому после каждого разложения особенно важна быстрая проверка раскрытием скобок.



Обобщение типичных ошибок по заданиям 7 класса; иллюстративная оценка

1


подстановка превращает
сложный многочлен в более
простой квадратный трёхчлен.

Одна удачная замена может сразу
упростить выражение со степенью
выше второй и сделать его похожим
на знакомый квадратный трёхчлен.

Материал школьной алгебры 7 класса

Проверка правильности разложения

Последовательность проверки: от раскрытия скобок до сравнения с исходным многочленом.



Связь разложения с решением уравнений

Произведение ноль


Если после разложения получено произведение, равное нулю, то хотя бы один множитель должен быть равен нулю. Это основа решения многих уравнений в 7 классе.

Удобство проверки

Такой способ помогает не только находить корни, но и проверять себя: если ни один найденный ответ не обращает множитель в ноль, значит, допущена ошибка.

Находим корни

В примере $(x-2)(x+5)=0$ можно рассмотреть каждый множитель отдельно. Получаются два ответа: $x=2$ и $x=-5$, потому что именно они обращают выражение в ноль.



Примеры разложения разными способами

Эти примеры помогают увидеть, что каждый тип многочлена требует своего подхода, а выбор способа зависит от структуры выражения.

Один и тот же многочлен нельзя разложить «любой» формулой: сначала нужно узнать его строение, а затем применить подходящий приём.

Выражение	Способ	Результат
$12x^3+18x^2$	общий множитель	$6x^2(2x+3)$
x^2-49	разность квадратов	$(x-7)(x+7)$
$x^2+7x+12$	квадратный трёхчлен	$(x+3)(x+4)$
$ab+ac+db+dc$	группировка	$(a+d)(b+c)$
x^4-16	замена переменной	$(x^2-4)(x^2+4)$

Какой способ разложения выбирать первым

1. Общий множитель

Сначала проверяют, есть ли в каждом слагаемом одинаковый множитель. Это самый быстрый путь, который часто сразу упрощает выражение.

3. Квадратный трёхчлен

Когда выражение состоит из трёх членов, проверяют, не является ли оно квадратным трёхчленом. Тогда удобно подбирать два числа для суммы и произведения.

2. Формулы сокращённого умножения

Если общего множителя нет, ищут знакомые формы: разность квадратов, квадрат суммы или квадрат разности. Эти случаи легко узнать по виду крайних членов.


4. Замена переменной

Если в многочлене повторяется одна и та же степень, делают замену переменной. Так сложное выражение превращается в более привычную форму.

Как меняется многочлен после разложения

После разложения выражение становится короче и его легче использовать при дальнейших вычислениях, особенно если нужно найти корни или упростить дробь.

Произведение обычно требует меньше шагов, чем исходная запись, поэтому разложение делает решение задач быстрее и понятнее.



Иллюстративное сравнение на основе примеров из школьной алгебры

Главное — узнать структуру и выбрать верный приём

Разложение на множители становится простым, когда ученик умеет узнавать форму многочлена. Тогда общий множитель, формулы, группировка и замена переменной работают как понятные и надёжные инструменты.