

The background features a minimalist design with a vertical red bar on the left, a thin black vertical line, and a horizontal black line. A red circle is positioned at the intersection of the vertical line and horizontal line. A large yellow circle is in the top right, with a thin black line curving from its edge down to two small red circles. At the bottom, there are solid black and blue rectangular blocks.

Обзор: регуляция кровообращения и первая помощь при кровотечениях

Кровообращение — ключ к жизни, а первая помощь — важный навык для каждого.

История и биологический контекст: открытие кровообращения

В 1628 году Уильям Гарвей описал круги кровообращения. Кровь доставляет кислород и питательные вещества, выводит отходы. Знания о кровообращении развивались благодаря трудами многих ученых.




Строение сердечно-сосудистой системы человека

Основные компоненты системы

Сердце, артерии, вены и капилляры составляют сердечно-сосудистую систему. Сердце работает как насос, обеспечивая движение крови по организму.

Функции сосудов

Артерии несут кровь от сердца под давлением; вены возвращают её с меньшим давлением; капилляры обеспечивают обмен веществ между кровью и тканями.



Физиологические функции кровообращения

Кровообращение переносит кислород из лёгких к клеткам и удаляет углекислый газ, поддерживая жизненные процессы.

Обеспечивает удаление продуктов обмена, поддерживает стабильность внутренней среды организма — гомеостаз.

Доставляет к тканям питательные вещества, гормоны и лекарственные вещества, обеспечивая их нормальное функционирование.

Регулирует температуру тела через перераспределение кровотока, помогая сохранять тепловой баланс.

Классификация кровеносных сосудов

- Артерии имеют толстые эластичные стенки, выдерживают высокое давление крови, обеспечивая её быстрое движение.

- Вены снабжены клапанами, предотвращающими обратный ток, обладают тонкими стенками и служат для возврата крови к сердцу.

- Капилляры — мельчайшие сосуды, через них происходит обмен кислорода и питательных веществ между кровью и клетками.

Большой и малый круги кровообращения

Большой круг начинается в левом желудочке, снабжая кислородом все органы и ткани организма.

Оба круга обеспечивают непрерывное обновление крови, доставляя кислород и удаляя углекислый газ.

Малый круг начинается в правом желудочке и обеспечивает газообмен в лёгких, обогащая кровь кислородом.

Совместная работа кругов поддерживает обмен веществ и нормальное функционирование всех систем организма.

Диаграмма: сравнение давления в разных сосудах

Давление постепенно снижается от артерий к венам, обеспечивая плавное движение крови по сосудам.

Постепенное снижение давления уменьшает риск повреждения мелких сосудов и обеспечивает обмен веществ.

Участие нервной системы в регуляции кровообращения


Гипоталамус и продолговатый мозг контролируют сужение и расширение сосудов, поддерживая кровяное давление.

Симпатическая система увеличивает сердечный ритм и давление при необходимости ускорения кровотока.

Парасимпатическая система снижает частоту сердечных сокращений, обеспечивая экономию ресурсов организма.

Гормоны и их влияние на сосуды и сердце

- Адреналин усиливает сердечный ритм и расширяет артерии скелетных мышц, подготавливая тело к нагрузкам.
- Антидиуретический гормон увеличивает объем крови за счёт задержки жидкости, повышая артериальное давление.



Физические нагрузки и изменение параметров кровообращения

При физических упражнениях частота сердечных сокращений и объём выброса крови значительно увеличиваются.

Ускоряется удаление продуктов обмена, что снижает утомляемость и восстанавливает работоспособность.

Кровоток направляется к работающим мышцам, обеспечивая их кислородом и питательными веществами.

Перераспределение крови помогает поддерживать оптимальную температуру тела во время активности.

Патологические состояния: гипотония и гипертония

Гипотония проявляется понижением артериального давления ниже 100/60 мм рт. ст. и сопровождается такими симптомами, как слабость, частая утомляемость и головокружение.

Гипертония характеризуется повышением давления свыше 140/90 мм рт. ст. и значительно увеличивает риск развития заболеваний сердца, инсульта и других серьёзных осложнений.

Причинами этих состояний могут быть наследственные факторы, неправильное питание, стресс, малоподвижный образ жизни и хронические заболевания внутренних органов.

Основные причины и виды кровотечений



Артериальные кровотечения: угроза жизни

Артериальные кровотечения проявляются ярко-красной кровью, которая пульсирует в такт сердцу. Такие кровотечения быстро приводят к значительной кровопотере и требуют немедленной остановки.



Венозные кровотечения: равномерное течение

Венозная кровь темно-красного цвета течёт равномерным потоком. Несмотря на менее интенсивное кровотечение, оно может привести к осложнениям при отсутствии своевременного лечения.



Капиллярные кровотечения: небольшие повреждения

Кровотечение из капилляров обычно слабое и имеет розоватый оттенок. Оно часто возникает при мелких порезах и обычно не представляет серьёзной угрозы здоровью.

Таблица различий между артериальным, венозным и капиллярным кровотоком

Сравнение характеристик трех типов кровотоков по цвету, характеру струи и степени опасности для жизни.

Быстрая потеря крови характерна для артериальных кровотоков, что требует срочных мер по их остановке.

Тип кровотока	Цвет крови	Характер струи	Опасность для жизни
Артериальное	Алая	Пульсирующая	Высокая
Венозное	Темно-красная	Ровная	Средняя
Капиллярное	Розовая	Сочащаяся	Низкая

Клинические признаки опасных кровотечений



Наличие пульсирующей струи крови и быстрое пропитывание одежды указывают на тяжелое кровотечение. При этом кожа становится бледной, а давление заметно падает.

У пострадавшего отмечается учащенный и слабый пульс, возможна кратковременная потеря сознания. Кроме того, проявляются холодный липкий пот и частое дыхание — признаки развивающегося шока.

Последовательность действий при оказании первой помощи

Наложите прямое давление на рану или жгут для немедленной остановки кровотечения. Быстрые и решительные действия спасают жизнь.


Оцените общее состояние пострадавшего, следите за сознанием и дыханием, чтобы своевременно определить ухудшения.

Зафиксируйте повреждённую конечность в неподвижном положении, чтобы снизить кровоток и предотвратить усугубление травмы.

Обязательно вызовите скорую помощь и продолжайте наблюдать за признаками кровопотери и шока до прибытия медиков.

Алгоритм экстренных действий при кровотечении

Порядок оказания первой помощи при различного типа кровотечениях



Правила и нюансы использования жгута

- Жгут следует накладывать только при сильном артериальном кровотечении, расположив его выше раны на одежду или ткань, чтобы избежать повреждения кожи.

- Максимальное время удержания жгута составляет 1–2 часа с обязательной фиксацией времени наложения для контроля и безопасности пострадавшего.

- При присутствии специалистов жгут периодически ослабляют на 10–15 минут каждый час, чтобы избежать осложнений от длительной компрессии.

Типичные ошибки при оказании первой помощи



Неправильное наложение жгута: последствия

Частой ошибкой является неправильное размещение жгута, которое не перекрывает артерию или повреждает кожу. Это снижает эффективность остановки кровотечения и может усугубить травму.



Отсутствие контроля и поздний вызов помощи

Поздний вызов скорой и недостаточный контроль состояния пострадавшего повышают риск осложнений. Отсутствие регистрации времени наложения жгута затрудняет правильное лечение в больнице.

Осложнения и вторичные последствия массивных кровотечений

Большая кровопотеря может привести к развитию анемии, вызывая дефицит кислорода в тканях и ухудшая общее состояние здоровья.

Инфицирование раны патогенными микроорганизмами резко повышает риск воспаления и сепсиса, что требует срочного медицинского вмешательства.

Нехватка кислорода вследствие кровопотери может вызвать нарушение работы жизненно важных органов и развитие геморрагического шока.

Итоги: важность знаний в регуляции кровообращения и первой помощи

Осознанное владение знаниями и практическими навыками первой помощи при кровотечениях существенно увеличивает шансы на спасение жизни и предотвращение осложнений в экстренных ситуациях.