

Строение и основные функции спинного мозга: общая картина

Спинной мозг — связующее звено между мозгом и телом, управляющее рефлексами и ощущениями.




Путь познания спинного мозга сквозь века

Изучение спинного мозга началось в XVIII веке с анатомических описаний. Важные открытия Белла и Мажанди раскрыли функции нервных корешков. Современные методы, такие как МРТ, позволяют безоперационно исследовать спинной мозг у человека.



Расположение и размеры спинного мозга



Географическое положение внутри позвоночника

Спинной мозг расположен в позвоночном канале, начинаясь у основания черепа и завершаясь на уровне L1-L2 позвонков. Такая защита обеспечивает надежное укрытие нервных структур.


1



Средние размеры у подростков

Длина спинного мозга достигает в среднем 40-45 см, а диаметр варьируется от 1 до 1,5 см. Эти параметры могут колебаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

2



Связь с костными структурами

Спинной мозг тесно примыкает к костям позвоночника, что обеспечивает не только защиту, но и точную локализацию нервных сегментов относительно позвонков.

3

Внешние особенности строения спинного мозга

Спинальный мозг состоит из 31 сегмента: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчикового. Каждый сегмент отвечает за определённые функции тела.

Серое вещество располагается в центре в форме бабочки и содержит тела нейронов, обеспечивая обработку сигналов.

Белое вещество образует периферийный слой, состоящий из нервных волокон, передающих информацию между центрами.


Из каждого сегмента выходит пара спинномозговых нервов, которые связывают центральную нервную систему с периферией.

Защитные слои спинного мозга




Твёрдая оболочка — прочная защита

Внешняя твёрдая оболочка образована плотной соединительной тканью, которая защищает спинной мозг от механических повреждений и препятствует проникновению инфекций.



Паутинная оболочка и спинномозговая жидкость

Средняя оболочка напоминает паутину, вокруг неё циркулирует спинномозговая жидкость, которая амортизирует удары и поддерживает химический баланс ткани.



Мягкая оболочка — ближе всего к нервной ткани

Внутренняя мягкая оболочка обеспечивает питание и дыхание клеток спинного мозга; регулирует обмен между спинальным кровотоком и нервной тканью.


Структура серого и белого вещества спинного мозга

Серое вещество включает нейронные тела и образует передние, задние и боковые рога, отвечающие за двигательные, сенсорные и автономные функции.

Белое вещество состоит из пучков миелинизированных волокон, которые связывают спинной мозг с головным мозгом и периферией.

Разделение на функциональные зоны позволяет эффективно обрабатывать и передавать разнообразные сигналы между организмом и ЦНС.


Спинномозговые сегменты и их нервы



Количество и парность нервов

Человек имеет 31 пару спинномозговых нервов, каждая из которых выходит из соответствующего сегмента, обеспечивая иннервацию отдельных участков тела.


1



Состав нервов

Каждый спинномозговой нерв включает афферентные волокна, проводящие сенсорную информацию, и эфферентные волокна, управляющие мышцами и органами.

2




Распределение дерматомов и миотомов

Спинномозговые нервы иннервируют определённые участки кожи (дерматомы) и группы мышц (миотомы), что обеспечивает точное управление и восприятие.

3

Распределение сегментов спинного мозга



Грудной отдел содержит наибольшее число сегментов, что отражает его важность в иннервации туловища.

Чёткое распределение сегментов помогает диагностировать и локализовать поражения спинного мозга.

■ Анатомические данные, 2023

Проводниковая функция спинного мозга

Восходящие пути передают сигналы о прикосновении, боли и температуре от периферии к головному мозгу, обеспечивая восприятие окружающего мира.

Нисходящие пути передают управляющие команды от головного мозга к мышцам и внутренним органам, контролируя движения и функции.

Чёткая организация нервных путей обеспечивает точную координацию движений и адекватную реакцию на внешние раздражители.

Нарушения проводимости могут приводить к потере чувствительности или моторных нарушений, что влияет на качество жизни.

1

2

3



4

Рефлекторная функция спинного мозга

Спинной мозг обеспечивает быстрые автоматические реакции — рефлексы, которые происходят без участия сознания для защиты организма.

Примером является коленный рефлекс, когда лёгкий удар по сухожилию вызывает сокращение мышцы и движение ноги.

Рефлексы поддерживают жизненно важные процессы, такие как отдёргивание руки при боли, что предотвращает повреждения тканей.



Основные функции спинного мозга

Спинной мозг выполняет две ключевые функции: проводниковую — передачу сигналов между мозгом и телом, и рефлекторную — управление автоматическими реакциями. Таблица иллюстрирует эти функции с примерами их проявления.


Эффективное выполнение этих функций обеспечивает связь организма с окружающей средой и поддерживает внутреннее равновесие.

Функция	Описание	Пример
Проводниковая	Передача нервных импульсов между мозгом и телом	Движение конечностей
Рефлекторная	Реализация быстрых реакций без участия сознания	Автоматическое отдёргивание руки при боли
Регуляция внутренних органов	Контроль работы внутренних систем	Регуляция сердцебиения и дыхания

Реализация движений: двигательные пути

Передние рога серого вещества спинного мозга содержат мотонейроны, которые непосредственно управляют сокращением мышц скелета. Они отвечают за выполнение произвольных и рефлекторных движений.

Через спинной мозг проходят пирамидные пути, обеспечивающие тонкую моторную координацию, и экстрапирамидные пути, отвечающие за автоматизм и регуляцию движений. Повреждение этих путей вызывает паралич или нарушение координации.



Обработка сенсорной информации

Задние рога серого вещества принимают сигналы от различных рецепторов кожи, мышц и внутренних органов, обеспечивая первичную обработку сенсорных данных на уровне спинного мозга.

Информация передаётся по восходящим нервным путям в головной мозг, где происходит её осознание и анализ, что позволяет воспринимать тактильные ощущения, боль и температуру.

Работа сенсорных нейронов обеспечивает адаптацию организма к изменениям окружающей среды и запускает соответствующие реакции на раздражители.

1

2

3

Рефлекторные дуги: структура и последовательность

Рецептор воспринимает раздражение и преобразует его в нервный импульс, являясь начальным звеном в рефлекторной дуге.


Чувствительный нейрон передаёт сигнал по спинному мозгу к вставочному нейрону, который служит связующим звеном между чувствительными и двигательными нейронами.

Двигательный нейрон получает сигнал от вставочного и инициирует ответную реакцию, направляя импульс к мышцам или органам-эффекторам.

Эффектор осуществляет реакцию организма, например, сокращение мышцы или изменение работы внутреннего органа, обеспечивая быстрое и целенаправленное действие.

Последовательность проведения рефлекса

Последовательные этапы рефлекторного ответа на раздражение



Значение спинного мозга для жизнедеятельности организма

Спинной мозг регулирует автоматические процессы, такие как поддержание осанки и выполнение простых двигательных действий без участия сознания.

Он участвует в контроле функций внутренних органов, обеспечивая координацию процессов мочеиспускания, дефекации и дыхания посредством рефлексов.


Быстрые защитные реакции, например, отдёргивание руки при боли, повышают шансы организма на выживание в опасных ситуациях.

Повреждение спинного мозга и его последствия




Потеря чувствительности и паралич

Повреждение спинного мозга приводит к утрате чувствительности и параличу ниже места травмы, ограничивая движение и восприятие. Часто это сопровождается ухудшением качества жизни и требует длительной реабилитации.



Нарушение работы внутренних органов

Травмы могут вызвать сбои в работе систем организма, включая дыхательную и мочеполовую. Это опасные для жизни осложнения, требующие комплексного медицинского наблюдения и поддерживающего лечения.



Вариативность восстановления функций

Степень восстановления зависит от локализации и тяжести повреждения. Иногда наблюдаются частичные улучшения функций, особенно при своевременной медицинской помощи и реабилитации.

Современные методы диагностики и лечения поражений спинного мозга

Для диагностики используют МРТ и КТ, позволяющие детально изучить структуру спинного мозга и выявить место повреждения.

1

Электромиография помогает оценить состояние мышц и нервных волокон, выявляя степень нервной дисфункции после травмы.

2

Лечение включает противовоспалительные препараты, хирургические операции для стабилизации позвоночника и физическую реабилитацию для восстановления функций.

3

Перспективные методы — применение стволовых клеток и нейропротезирование, которые в клинических испытаниях показывают потенциал в регенерации повреждённой нервной ткани.

4

Интересные и необычные факты о спинном мозге



У некоторых рыб, например акул, спинной мозг длиннее головного, что обеспечивает быстрые рефлексы и поведение в естественной среде. Это уникальное отличие в строении нервной системы этих животных.

Нервные волокна, отходящие от спинного мозга человека, могут достигать длины до 2 метров, как, например, седалищный нерв, самый длинный в организме. Подростки иногда восстанавливают функции спинного мозга после повреждений благодаря пластичности нервной системы.

Значение спинного мозга для жизнедеятельности и человека

Спинной мозг — ключевой канал связи между мозгом и телом, обеспечивающий движение, чувства и защитные реакции. Его защита и изучение помогают понимать и лечить серьёзные травмы.