


Введение в первую помощь при поражении органов дыхания

Поражения дыхательной системы требуют быстрой и грамотной помощи для спасения жизни.



Значение дыхательной системы и причины её повреждений

Дыхательная система снабжает организм кислородом, необходимым для работы органов. Верхние дыхательные пути и лёгкие уязвимы из-за чувствительных тканей и риска контакта с вредными веществами.



Структура дыхательной системы человека

Носовая полость, гортань и трахея обеспечивают прохождение воздуха, который затем направляется в бронхи и лёгкие для газообмена.

1

В лёгких воздух достигает альвеол, где кислород переходит в кровь, а углекислый газ удаляется из организма.

2

Любое повреждение этих органов снижает поступление кислорода, вызывая кислородное голодание — гипоксию, опасную для здоровья.


3

Основные причины поражения дыхательных органов




Проникновение чужеродных предметов

Мелкие предметы и кусочки пищи могут попасть в дыхательные пути, вызывая удушье. Дети особенно подвержены таким инцидентам из-за привычки брать всё в рот.



Химические и термические ожоги

Вдыхание паров кислот, щелочей или горячего воздуха вызывает повреждение тканей дыхательной системы, приводя к отёку и затруднению дыхания.



Аллергические реакции и бронхиальные спазмы

Сильная аллергия может вызвать отёк слизистой и бронхоспазм при астме, что существенно ухудшает проходимость дыхательных путей.

Статистика инцидентов с поражением дыхательных путей

Большинство случаев происходит в домашних условиях, что подчёркивает важность знаний первой помощи среди населения.

Чем раньше оказана помощь, тем выше шансы избежать серьёзных последствий и сохранить жизнь пострадавшему.

Роспотребнадзор, 2022 год



Проявления поражения дыхательных органов



Затруднённое или прерывистое дыхание сигнализирует о возможном кислородном голодании и требует внимания.

Цианоз — посинение кожи и губ — указывает на острый дефицит кислорода в крови.


Громкие свистящие звуки и кашель свидетельствуют о частичной обструкции или раздражении дыхательных путей.




Потеря сознания или невозможность говорить при дыхании — признаки опасного состояния, требующего немедленной помощи.



Пошаговый алгоритм помощи при удушье



Сначала убедитесь, что пострадавший может дышать; если дыхание прервано, вызовите экстренную службу 112 без промедления.



Примените приём Геймлиха или сильные удары между лопатками для удаления инородного тела; при потере сознания выполните искусственное дыхание.



Алгоритм действий при остановке дыхания

Пошаговая последовательность оказания неотложной помощи

Распознавание аллергических поражений дыхательных путей

1

Признаки аллергии

Быстрое появление отёка лица, шеи и затруднение дыхания требуют немедленного внимания. Стридор и падение давления свидетельствуют о тяжёлой реакции.

2

Первая помощь при аллергических реакциях

Срочно применяют антигистаминные препараты, обеспечивают покой и вызывают скорую помощь для предотвращения осложнений.




Сравнение причин удушья у детей и взрослых



Дети чаще страдают от механической обструкции, взрослые — от хронических заболеваний и токсических воздействий.

Понимание различий помогает адаптировать методы первой помощи для разных возрастных групп.

Минздрав РФ, 2023 год



Особенности первой помощи детям при поражении дыхательных путей



Осторожность при приёме Геймлиха

Для детей приём Геймлиха выполняют аккуратно, избегая чрезмерного давления, чтобы не травмировать грудную клетку и внутренние органы.



Положение головы

Голову ребёнка фиксируют ниже уровня туловища при удалении инородного тела, что способствует естественному выходу препятствия из дыхательных путей.



Мягкая вентиляция лёгких

Искусственное дыхание детям выполняют с меньшей силой, чтобы избежать повреждений и максимально помочь восстановить дыхание безопасно.

Первая помощь при отравлениях через дыхательные пути



Первым делом необходимо быстро вывести пострадавшего из опасной зоны с газами или дымом и обеспечить приток свежего воздуха. Одежду ослабляют для облегчения дыхания и предотвращения удушья.



Если человек потерял сознание, начинают искусственную вентиляцию и постоянно контролируют признаки жизни. Обязательно вызывают скорую помощь, чтобы избежать осложнений и сохранить жизнь.



Виды поражений дыхательных путей: сравнение симптомов и мер помощи

Таблица подчёркивает различия симптомов и методы первой помощи при разных повреждениях дыхательных путей.

Правильная диагностика симптомов позволяет выбрать корректный алгоритм первой помощи.

Минздрав РФ

Вид поражения		Основные симптомы				Меры помощи								
Инородное тело		Внезапная одышка, синюшность				Удары по спине, приём Геймлиха								
Химический ожог		Боль, кашель, отёчность				Удаление из зоны, покой, вызов врача								
Термический ожог		Затруднённый вдох, покраснение				Свежий воздух, контроль дыхания								
Аллергия		Быстрый отёк, хрипы				Антигистаминные препараты, вызов помощи								


Первая помощь при химических ожогах дыхательных путей



Немедленно прекратить контакт с химическим веществом — вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить полный покой для снижения вредного воздействия.

Не допускается давать воду или медикаменты до прибытия медицинских специалистов, чтобы не усугубить состояние и не вызвать осложнений.

В течение всего времени контролируют дыхание и уровень сознания пострадавшего, вызывая профессиональную помощь для проведения дальнейшего лечения.



Этапы выполнения искусственного дыхания



Освободить дыхательные пути от слизи и инородных тел, проветрить помещение для обеспечения поступления свежего воздуха.

Зажать нос пострадавшего, плотно обхватить его рот своими губами, чтобы обеспечить герметичность при вдувании воздуха.



Вдуть воздух медленно в течение 1–1,5 секунды, повторять каждые 5–6 секунд, наблюдая за подъёмом грудной клетки.

Постоянно контролировать пульс и состояние сознания, не прерывать процедуру до приезда врачей или восстановления самостоятельного дыхания.

Восстановление проходимости дыхательных путей

Техники освобождения дыхательных путей

Основные приёмы включают запрокидывание головы и осторожное выдвижение нижней челюсти для предотвращения западания языка. Это помогает восстановить проходимость и обеспечить доступ кислорода.

Особенности при травмах шеи и головы

При подозрении на травмы шеи или головы применяют метод «челюсть вверх», минимизируя риск усугубления повреждений и сохраняют стабильность позвоночника.



Реабилитация после поражения органов дыхания

Регулярные дыхательные упражнения помогают восстановить объём и эластичность лёгких, улучшая газообмен и общую физическую форму пациента.

Периодические консультации пульмонолога необходимы для контроля состояния и корректировки лечения, что способствует своевременному выявлению осложнений.

Соблюдение режима проветривания помещений и увлажнения воздуха уменьшает раздражение дыхательных путей и ускоряет процесс выздоровления после поражений.

Профилактика поражений органов дыхания

Хранение мелких предметов и опасных веществ вне досягаемости детей предотвращает случайное вдыхание или проглатывание, снижая риск механических и химических повреждений.

Использование средств защиты и регулярные обучающие мероприятия способствуют формированию безопасных привычек и своевременному оказанию первой помощи в случае необходимости.





4–6 минут

прекращение подачи
кислорода в мозг
вызывает необратимые
повреждения и серьёзные
осложнения.

При поражениях дыхательных путей каждая секунда на счету — быстрое реагирование значительно повышает шансы на выживание и полноценное восстановление.

Роспотребнадзор, 2022

Ключевые рекомендации по первой помощи при дыхательных поражениях

Знание симптомов и правильное применение алгоритмов первой помощи критически важны для спасения жизни. Необходимо регулярно тренировать навыки и повышать осведомлённость среди детей и взрослых.

