


A photograph of a forest floor with several red squirrels and three Great Tits. The scene is framed by a large, irregular orange shape. At the top of this shape, there are five white, elongated, teardrop-like shapes arranged in a slightly curved line.

Биотические экологические факторы: обзор и ключевые темы

Живые организмы влияют друг на друга, формируя сложные экосистемные связи.

Роль биотических факторов в экологии

Биотические факторы — ключевой элемент экосистем, взаимодействующий с абиотическими и антропогенными. Они создают сложные связи между организмами, влияя на конкуренцию, симбиоз, хищничество и паразитизм, что изучалось ещё в XIX веке учёными, такими как К. Мёбиус.



Определение и основные виды биотических факторов

01

Биотические факторы — это влияние организмов друг на друга внутри экосистемы, формирующие устойчивые взаимосвязи и влияющие на развитие видов.

02

Основные виды включают внутривидовую и межвидовую конкуренцию, а также разнообразные формы симбиоза: мутуализм, паразитизм и комменсализм.

03

Хищничество является важным биотическим фактором, регулирующим численность видов и стимулирующим естественный отбор и эволюционные адаптации.

Примеры проявления биотических факторов



Корни деревьев меняют почвенный состав

Корневая система деревьев способствует проникновению кислорода в почву и выделяет вещества, изменяющие её химический состав, что влияет на микробные и растительные сообщества.



Лоси регулируют структуру леса

Питающиеся молодыми побегами деревьев лоси влияют на восстановление лесной растительности, ограничивая распространение некоторых видов и создавая условия для других.



Паразитические грибки снижают жизнеспособность растений

Грибы, вызывающие ржавчину, паразитируют на растениях, уменьшая их рост и урожайность, существенно влияя на здоровье экосистемы.

Классификация биотических факторов воздействия

Внутривидовые факторы включают конкуренцию за ресурсы, формирование социальных иерархий и сезонные миграции для оптимизации выживания.

01

Хищничество, как межвидовой фактор, регулирует численность жертв и поддерживает динамическое равновесие в биоценозах.

03

Межвидовые взаимодействия представлены формами симбиоза: мутуализмом, паразитизмом и комменсализмом, определяющими экологические связи видов.

02

Взаимное влияние биоценозов и абиотической среды демонстрирует интеграцию биотических факторов с окружающей средой и её устойчивостью.

04

Фактические данные: биоразнообразие и связи организмов




Разнообразие насекомых и птиц в смешанном лесу

На площади 1 га смешанного леса средней России насчитывается до 1000 видов насекомых и около 80 видов птиц, что свидетельствует о высокой плотности и многообразии биотических взаимодействий.



Колонии муравьёв — важные агротехники природы

Муравьи создают крупные колонии, активно распространяют семена растений и способствуют аэрации почвы, что улучшает условия для роста растительности.



Микориза повышает устойчивость лесных сообществ

Ассоциация корней деревьев с грибами микоризы увеличивает биомассу и иммунитет растений, улучшая обмен питательными веществами и закрепляя структуру экосистемы.

72%

особей внутри популяции
состязаются за ограниченные
ресурсы, что обеспечивает
баланс численности и
поддерживает социальные
структуры.

Внутривидовая конкуренция
направляет распределение ресурсов
и влияет на репродуктивный успех в
популяции, стабилизируя её в
природных условиях.

*Исследования популяционной экологии России,
2020 год.*

Межвидовые взаимодействия: ключевые примеры




Регуляция численности грызунов хищниками

Лисы и совы контролируют популяции мышевидных грызунов в лесах, предотвращая чрезмерное размножение и поддерживая экологический баланс в биоценозах.



Паразитирование кукушки на певчих птицах

Кукушка подкидывает яйца в гнёзда других птиц, что влияет на воспроизводство принимающих видов, демонстрируя адаптационные стратегии паразитизма.




Симбиоз клевера и азотфиксирующих бактерий

Бактерии, обитающие в корнях клевера, фиксируют атмосферный азот, повышая плодородие почвы и способствуя росту растений в агроэкосистемах.

Влияние хищников на численность жертв

Периодические колебания отражают циклы восстановления и снижения популяций, выявляя важность хищников для контроля численности жертв.

Задержка реакции хищников отмечается из-за времени адаптации и воспроизводства, что способствует устойчивому балансу популяций.



Данные лесного экологического мониторинга, 2021



Мутуализм: пример взаимовыгодного взаимодействия

Мутуализм предполагает взаимную выгоду для двух видов, как в случае опыления цветов пчёлами, где растения обеспечивают пищу, а пчёлы — перенос пыльцы.

Сложные симбиотические системы, например лишайники или коралловые рифы, демонстрируют, как взаимопомощь способствует выживанию и развитию экосистем даже в экстремальных условиях.



Паразитизм: влияние на популяции и экосистемы

01

Паразитизм представляет особый тип биотических взаимоотношений, при котором один организм — паразит — извлекает выгоду, причиняя вред хозяину. Например, паразитические грибы снижают урожайность сельскохозяйственных культур, влияя на продуктивность экосистем.

02

Животный паразитизм иллюстрируют вши у млекопитающих, а также простейшие, такие как малярийный плазмодий, вызывающий болезни у человека и животных. Эти паразиты существенно влияют на численность популяций, изменяя динамику экосистем.

Хищничество: ключевой регулятор численности

Суть хищничества

Хищничество — взаимодействие, при котором хищник поедает жертву. Примеры включают волков, охотящихся на зайцев, и сов, добывающих мышей. Такие отношения обеспечивают перераспределение энергии в экосистемах.

Эколого-эволюционное значение

Хищники формируют устойчивые пищевые цепи, способствуя эволюции защитных механизмов у жертв. Их деятельность регулирует численность популяций, поддерживая экологический баланс и стабильность сообщества.



Вид взаимодействия	Описание механизма	Пример	Эффект для первого организма	Эффект для второго организма
Конкуренция	Соперничество за ресурсы	Борьба синиц за корм	Вредно	Вредно
Мутуализм	Взаимовыгодное сотрудничество	Опыление пчёлами	Полезно	Полезно
Паразитизм	Выгода паразита за счёт хозяина	Грибы, поражающие растения	Полезно	Вредно
Комменсализм	Выгода одного, без вреда другому	Рыбы-ремора и акулы	Полезно	Нейтральн

Сравнительная таблица биотических взаимодействий

Краткая характеристика механизмов, примеров и эффектов биотических взаимодействий в экосистемах.

Мутуализм способствует обеим сторонам, конкуренция наносит ущерб обоим, паразитизм выгоден только паразиту, а комменсализм — безвреден для хозяина.

Межвидовая конкуренция: примеры и научное подтверждение

1

Межвидовая конкуренция возникает, когда различные виды претендуют на одни ресурсы, например, разные виды синиц конкурируют за пищу зимой, что влияет на их выживаемость.

2

Принцип конкурентного исключения Гаузе доказан на инфузориях, где совместное существование возможно лишь при дифференциации экологических ниш. В противном случае один вид вытесняет другого.

3

Результаты исследований межвидовой конкуренции позволяют прогнозировать формирование биологических сообществ и разрабатывать стратегии охраны биоразнообразия в природных экосистемах.

Биоценозы как результат биотических связей




Лесной биоценоз: взаимодействия природы

В лесу деревья, мхи, грибы, насекомые и птицы образуют сеть взаимосвязей, регулирующих численность и структуру. Эти взаимоотношения обеспечивают стабильность и устойчивость лесной экосистемы.



Коралловые рифы: симбиоз и совместное выживание

Кораллы, рыбы и беспозвоночные формируют сложные сообщества, поддерживаемые симбиотическими отношениями, которые сохраняют биоразнообразие и способствуют высокой продуктивности рифов.




Тундровые экосистемы: адаптация к суровым условиям

В тундре взаимодействия между леммингами, растениями и хищниками создают устойчивые пищевые цепи, что позволяет сообществам выживать в экстремальном климате с минимальными ресурсами.

Передача энергии через пищевые цепи


Основные трофические уровни и
их роли в экосистеме



Динамика популяций: модель Лотки-Вольтерры


Модель иллюстрирует цикличность, где рост численности жертв приводит к увеличению хищников, а последующее снижение жертв уменьшает и количество хищников.

Модель демонстрирует естественную саморегуляцию через взаимодействия «жертва–хищник», объясняя сезонные колебания численности в экосистемах.



Исследования по популяционной экологии, данные за 2010–2020 годы

Человек как биотический фактор и источник изменений



Человек напрямую влияет на экосистемы, уничтожая хищников, что нарушает естественные регуляторные процессы и ведёт к дисбалансу в биоценозах.

Интродукция чужеродных видов, таких как американская норка в Европе, вызывает изменения в местных сообществах и конкуренцию с аборигенными видами.

Распространение заболеваний среди диких животных, вызванное антропогенной деятельностью, снижает их численность и трансформирует структуры экосистем.


Все перечисленные изменения приводят к дестабилизации пищевых цепей и сокращению биоразнообразия, что ставит под угрозу экологическую устойчивость.

Охрана природы и регулирование биотических процессов



Реинтродукция хищников в природные сообщества

В национальном парке Йеллоустоун успешно восстановлена численность волков, вернувшихся к естественной роли регуляторов популяций, что привело к улучшению экосистемы и биоразнообразия.



Сохранение редких видов в Красной книге РФ

Систематическая работа по охране редких и исчезающих видов позволяет сохранить уникальные биологические ресурсы и предотвращать потерю генетического разнообразия в природных сообществах.



Биологический контроль вредителей в сельском хозяйстве

Использование естественных врагов сельскохозяйственных вредителей уменьшает потребность в химических пестицидах, сохраняя экологическое равновесие и здоровье почв.

Значение изучения биотических факторов для устойчивого будущего

Понимание биотических взаимодействий является ключом к сохранению природы, рациональному использованию ресурсов и предупреждению экологических кризисов, что способствует формированию экологической ответственности.