



Экологические факторы и закономерности их действия

Как среда определяет жизнь организмов?

Почему условия среды решают судьбу вида

Каждый организм существует в определённом диапазоне температуры, света, влажности и состава среды. Именно эти условия задают границы распространения, темпы обмена веществ, успех размножения и шансы на выживание.



Классификация экологических факторов

Абиотические

01

Это факторы неживой природы: свет, температура, влажность, давление, кислотность, солёность и химический состав среды. Они формируют физические условия, в которых организм может жить и нормально развиваться.

Биотические

02

Они возникают при взаимодействии организмов между собой. Конкуренция, хищничество, паразитизм и симбиоз меняют доступ к ресурсам, численность популяций и структуру сообществ.

Антропогенные

03

Эта группа связана с деятельностью человека: загрязнением, вырубкой лесов, распашкой земель, урбанизацией и промышленным воздействием. Такие изменения часто быстро перестраивают экосистемы и сокращают биоразнообразие.

Разные уровни влияния

04

Одни факторы действуют непосредственно на отдельный организм, другие — через изменение среды обитания или через отношения между видами. Поэтому классификация помогает точнее понимать причины экологических изменений.

Общее значение

05

Все группы факторов вместе определяют, где вид может существовать, насколько успешно он размножается и какие приспособления для него оказываются решающими в конкретных условиях.

Абиотические факторы как основа среды обитания

Температура

Она влияет на скорость ферментативных реакций, обмен веществ и работу мембран. Для каждого вида существует свой диапазон, в котором рост и размножение идут наиболее эффективно.

Свет и влажность

Освещённость определяет интенсивность фотосинтеза и поведение животных, а влажность влияет на испарение воды, газообмен и общий водный баланс организма.

Давление и солёность

Эти факторы особенно важны в водной среде и на больших высотах. Они определяют, какие организмы способны поддерживать осмотическое равновесие и нормальное дыхание.

Почва и вода


Состав почвы и воды задаёт доступность минеральных веществ, кислорода и влаги. От этого зависят корневая система растений, питание, рост и распределение видов по территории.



Пределы выносливости организма

Схема показывает, что даже при одном факторе среда может быть благоприятной лишь в ограниченном диапазоне. За его пределами процессы быстро угасают.

Наиболее высокая жизненная активность наблюдается в зоне оптимума; при отклонении к крайним значениям выживаемость резко падает.



Схематическая модель по закону толерантности В. Шелфорда; учебная иллюстрация

Закон минимума и лимитирующий фактор

Суть закона

Жизнедеятельность организма определяется не всеми условиями сразу, а тем фактором, которого не хватает сильнее всего. Именно он первым сдерживает рост, развитие и продуктивность.

01

Почему это важно

Лимитирующий фактор объясняет, почему один и тот же вид может быть обычным в одном месте и редким в другом. Различие часто связано не с общим количеством ресурсов, а с их нехваткой.

03

Что ограничивает растения

Для растений такими факторами часто становятся вода, азот, фосфор, свет или тепло. Даже при хорошем обеспечении другими ресурсами дефицит одного элемента тормозит весь процесс.

02

Практический вывод

Зная ограничивающий фактор, можно повышать урожайность и устойчивость организмов: улучшать полив, минеральное питание, освещённость или тепловой режим в зависимости от конкретной ситуации.

04

Свет как экологический фактор

Фотосинтез

Для растений свет — источник энергии, необходимый для образования органических веществ. Особенно важны интенсивность освещения, длительность дня и спектральный состав света.

Суточные ритмы

У животных свет помогает ориентироваться во времени суток, регулирует активность, кормовое поведение и периоды отдыха. У многих видов он запускает сезонные изменения.

Фотопериодизм

Длина светового дня влияет на цветение, листопад, образование семян и подготовку к зиме. Это позволяет растениям согласовывать развитие с сезонными изменениями среды.

Разные местообитания


Растения открытых пространств и тенистых лесов приспособлены к разной освещённости. Одни выдерживают яркое солнце, другие лучше развиваются при рассеянном свете.



Температура и жизненные процессы организмов

Температурный режим особенно заметен у холоднокровных организмов, но важен для всех живых систем. Он влияет на скорость реакций, активность и устойчивость к стрессу.

Кривая подтверждает наличие оптимума: при охлаждении и перегреве жизненные процессы ослабевают, а устойчивость организма снижается.



Схематическая зависимость по общим закономерностям влияния температуры на живые организмы; учебная модель

Вода, влажность и солёность среды



Вода как основа жизни

Вода участвует в транспорте веществ, фотосинтезе, терморегуляции и поддержании формы клеток. Без достаточного водоснабжения нарушаются обмен веществ и рост организма.



Реакция на засуху

При нехватке влаги растения уменьшают площадь листьев, закрывают устьица и замедляют рост. У многих видов это помогает сократить потери воды и пережить неблагоприятный период.



Солёность среды

Содержание солей определяет, какие организмы могут жить в воде. Пресноводные, морские и солоноватоводные виды имеют разные пределы осмотической устойчивости и по-разному регулируют обмен воды.



Влажность воздуха

Влажность влияет на испарение и газообмен, особенно у наземных растений и мелких животных. В сухом воздухе возрастает риск обезвоживания, поэтому важны приспособления к экономии влаги.

Фактор	Приспособление	Пример
Температура	густой мех	белый медведь
Температура	спячка	сурок
Влага	глубокие корни	саксаул
Солёность	осморегуляция	морские рыбы

Примеры приспособлений к абиотическим условиям

Таблица показывает связь между фактором среды, приспособлением и организмом, у которого оно помогает выживать.

Приспособления позволяют видам сохранять жизнедеятельность в разных климатических и водных условиях; один фактор часто требует сразу нескольких адаптаций.

Биотические факторы: взаимодействия организмов

Конкуренция

Организмы одного или разных видов соперничают за пищу, пространство, свет и партнёров. Такая борьба ограничивает численность популяций и заставляет виды занимать разные экологические ниши.

Хищник и жертва

Хищничество регулирует численность добычи и влияет на поведение, расселение и приспособления видов. При этом хищники поддерживают равновесие в сообществах, не допуская чрезмерного увеличения отдельных популяций.

Паразитизм

Паразиты получают выгоду за счёт хозяина, ослабляя его рост, питание и размножение. В природе такие связи часто долго сохраняются, но при сильном заражении могут заметно снижать жизнеспособность популяции.

Симбиоз и комменсализм


Взаимовыгодные и нейтральные связи повышают устойчивость организмов к неблагоприятным условиям. Опыление, расселение семян и совместное обитание помогают видам успешнее использовать ресурсы и расширять ареал.

Роль в сообществах

Биотические факторы формируют структуру экосистемы, распределение ресурсов и характер пищевых связей. Они одновременно ограничивают одни виды и создают преимущества для других, поддерживая динамическое равновесие в природе.

Влияние биотических связей на численность популяции

Схема показывает, как рост численности и различные взаимодействия изменяют дальнейшую динамику популяции.



Антропогенные факторы и их воздействие на природу

Загрязнение среды

Выбросы в атмосферу и сбросы в водоёмы меняют химический состав среды, ухудшают условия жизни организмов и могут накапливаться в пищевых цепях, усиливая вред на последующих уровнях.

Изменение местообитаний

Вырубка лесов, распашка земель и урбанизация разрушают привычные биотопы. Виды теряют укрытия, кормовые ресурсы и места размножения, поэтому их численность часто быстро сокращается.

Истощение ресурсов

Добыча полезных ископаемых, чрезмерное водопользование и интенсивное земледелие ускоряют истощение природных запасов. Это приводит к деградации почв, нарушению круговорота веществ и снижению продуктивности экосистем.

Глобальные последствия


Изменение климата усиливает засухи, смещает сроки сезонных процессов и нарушает миграции видов. В результате пищевые цепи становятся менее устойчивыми, а отдельные виды теряют привычные границы распространения.



Основные источники антропогенного воздействия

Диаграмма помогает увидеть, что влияние источников различается по масштабу и характеру: одни сильнее загрязняют воздух, другие — почвы и водоёмы.

Наибольшую нагрузку обычно создают транспорт, промышленность и энергетика, тогда как сельское хозяйство и отходы усиливают деградацию почв, накопление мусора и потери биоразнообразия.



Схематическая учебная диаграмма по теме; значения условные для сравнения источников

3

группы условий среды:
оптимальные,
неблагоприятные
и критические.

Такое деление помогает понять, почему один и тот же организм может успешно существовать в одной обстановке и быстро терять жизнеспособность в другой.

*Учебная схема по теме «Экологические факторы
и закономерности их действия»*

Реакция организма на условия среды


Таблица показывает, как меняются жизненные процессы организма при разных уровнях благоприятности среды.

Чем дальше условия от оптимума, тем сильнее угнетаются жизненные функции и выше риск локального исчезновения популяции.

Условия	Состояние	Итог
Оптимальные	Рост, развитие	Размножение
Неблагоприятные	Стресс, замедление	Падение плодовитости
Критические	Повреждение, гибель	Сокращение ареала

Экологическая ниша и распределение вида

Схема отражает связь между ресурсами, условиями среды, приспособлениями и ареалом вида.



Экологические закономерности в природных сообществах

Устойчивость сообщества

01

Устойчивое сообщество сохраняет относительное равновесие, даже если отдельные условия меняются. Это возможно благодаря множеству связей между видами, которые распределяют нагрузку и поддерживают круговорот веществ.

Саморегуляция

02

Численность организмов в природе не растёт бесконечно: она ограничивается ресурсами, хищниками и болезнями. Саморегуляция помогает системе возвращаться к равновесию после кратковременных нарушений.

Сезонные колебания

03

Во многих сообществах численность видов меняется по сезонам из-за температуры, освещённости и доступности корма. Такие колебания отражают ритмы природы и адаптацию организмов к смене условий.

Сукцессии

04

Сообщества постепенно изменяются во времени: одни виды сменяют другие, а структура экосистемы усложняется или перестраивается. Сукцессия показывает, что природные системы не статичны, а постоянно развиваются.

Практическое значение знаний об экологических факторах

Сельское хозяйство

Знание температурных и водных потребностей культур позволяет выбирать подходящие сорта, планировать полив и повышать урожайность без лишней нагрузки на почвы и водные ресурсы.

Лесоводство и охрана природы

Понимание условий обитания помогает восстанавливать леса, сохранять редкие виды и проектировать особо охраняемые территории так, чтобы поддерживать естественные связи между организмами.

Городская среда

При проектировании городов учитывают качество воздуха, шум, озеленение и тепловой режим. Это помогает снижать стресс для людей и уменьшать давление на окружающие экосистемы.

Прогноз изменений климата

Экологические факторы позволяют оценивать, как сместятся ареалы видов, где возрастёт риск засух или наводнений и какие меры нужны для сохранения биоразнообразия.



Экология учит видеть связи в природе

Экологические факторы задают границы жизни организмов, а законы минимума и толерантности объясняют, почему важны не только условия, но и пределы выносливости. Понимание этих связей помогает беречь природу осознанно.