



Развитие жизни в протерозойской и палеозойской эрах

Как Земля стала планетой сложной жизни: от микробов к первым наземным организмам.

От докембрия к палеозою: путь к усложнению жизни

Эти две эры охватывают почти два миллиарда лет, когда менялись атмосфера, климат, океаны и сами живые системы. Именно тогда возникли ключевые биологические новшества, подготовившие появление сложных организмов и наземных экосистем.



Ранняя жизнь в протерозое

01

Прокариоты и цианобактерии

В начале протерозоя главную роль играли бактерии и цианобактерии. Они образовывали строматолиты и через фотосинтез постепенно изменяли химический состав океанов и атмосферы.

03

Многоклеточность и эдиакарская биота

В позднем протерозое возникают первые многоклеточные организмы и мягкотелая эдиакарская биота. Это был важный шаг к увеличению размеров тела, специализации клеток и усложнению строения организмов.

02


Появление эукариот

Около 1,8–1,6 млрд лет назад в палеонтологической летописи появляются первые достоверные эукариоты. Их клетки уже имели ядро и мембранные органоиды, что расширило возможности обмена веществ.

Рост содержания кислорода в атмосфере

Повышение кислорода изменило не только воздух, но и условия на поверхности: ослабило действие ультрафиолета и сделало возможным более активный обмен веществ.

Два этапа роста кислорода создали среду, в которой аэробное дыхание и крупные организмы получили эволюционное преимущество.



Схематизация по данным Международной стратиграфической шкалы и обобщениям о Великом кислородном событии

Строматолиты: каменная летопись древней микрожизни



Слоистые постройки древних мелководий

Строматолиты выглядят как каменные купола, нарастающие в спокойной мелководной воде. Их создавали микробные сообщества, прежде всего цианобактерии, которые улавливали частицы осадка и постепенно формировали слоистую минеральную структуру. Такие образования особенно характерны для докембрия.



Живое наследие древней Земли

Для науки строматолиты важны как один из самых ранних следов жизни в геологической истории. Современные аналоги можно наблюдать в Австралии и на Багамских островах, где сходные условия позволяют увидеть, как такие биостроения продолжают формироваться и сегодня.

Ключевые события протерозоя


Последовательность событий показывает, как менялись химия планеты и уровень сложности жизни.

Протерозой последовательно создал кислородную среду, более сложные клетки и предпосылки для крупных организмов.

Время	Событие	Значение
2,4 млрд лет назад	Кислородная революция	Рост O ₂
1,8–1,6 млрд лет назад	Первые эукариоты	Новые клетки
635–541 млн лет назад	Эдиакарская биота	Первые крупные формы

От фотосинтеза к сложной жизни

Схема построена по данным о биохимических и эволюционных изменениях протерозоя.



541 млн лет назад

начался резкий рост разнообразия животных, когда в морях быстро возникли новые типы организмов и экологические ниши.


Международная стратиграфическая шкала

Этот рубеж открыл палеозой: в геологически короткий срок животные стали значительно разнообразнее, а морские сообщества — сложнее и динамичнее.

Основные группы кембрийских животных

Разнообразие морских беспозвоночных в раннем палеозое выросло неравномерно: одни группы стали особенно многочисленными, другие заняли узкие экологические ниши.

Доминирование трилобитов и брахиопод показывает, что кембрийские моря уже поддерживали устойчивые и специализированные сообщества.



Обобщение по палеонтологическим данным кембрийских морских фаун

Трилобиты как характерные обитатели палеозоя

Узнаваемое строение

Трилобиты имели сегментированный панцирь, разделённый на три продольные лопасти, и сложные фасеточные глаза. Такое строение помогало им ориентироваться у дна и успешно существовать в разнообразных морских условиях.

Долгая история группы

Появившись в кембрии, трилобиты просуществовали до конца перми и дали тысячи видов. Их длительное существование делает их одной из самых показательных групп для изучения палеозойской эволюции.

Роль в датировке пород

Окаменелости трилобитов часто используют как руководящие ископаемые. По ним геологи уточняют возраст слоёв и сопоставляют разрезы, потому что разные виды быстро сменяли друг друга во времени.

Образ жизни

Большинство трилобитов передвигалось по дну и питалось органическими частицами, а у части видов был хищный образ жизни. Это показывает, насколько рано в морях сформировались разные пищевые стратегии.



Ордовик и силур: расцвет морских сообществ и первые шаги на сушу

1. Морское разнообразие

В ордовике моря стали гораздо богаче жизнью: широко распространились кораллы, брахиоподы, мшанки, головоногие моллюски и граптолиты. Экосистемы усложнились, а пищевые связи стали более разнообразными.

3. Первые наземные формы

В силуре на суше появились первые сосудистые растения и наземные членистоногие. Эти организмы ещё были связаны с влажными местообитаниями, но именно они открыли путь к освоению континентов.

2. Кризис на границе

В конце ордовика похолодание вызвало оледенение и падение уровня моря. Многие мелководные сообщества исчезли, и это вымирание резко сократило число морских видов, изменив состав фауны.

Крупные кризисы палеозоя

Событие	Дата	Главные потери
Ордовик	~444 млн	Морская фауна
Поздний девон	~372–359 млн	Рифы, рыбы
Конец перми	252 млн	Почти всё живое


Три крупнейших биосферных кризиса палеозоя и их основные последствия.

Кризисы повторно перестраивали биосферу, но каждый раз открывали экологические ниши для новых групп организмов.

Выход растений на сушу и усложнение наземной флоры

С переходом к суше растения постепенно накапливали приспособления к дефициту воды, механической опоре и размножению без постоянного водоёма.

Чем лучше развиты проводящие ткани и семя, тем успешнее растения занимали сухие и более разнообразные местообитания.



Девон — век рыб

01

Разнообразие морей

В девоне особенно широко представлены панцирные рыбы, акулы, лучепёрые и кистепёрые формы. Морские и пресноводные экосистемы стали сложнее, а позвоночные заняли больше экологических ниш.

03

Промежуточные формы

Тиктаалик считается одной из ключевых переходных форм: он сочетал черты рыб и первых четвероногих. Такие находки показывают, что выход позвоночных на сушу происходил постепенно.


02

Переход к суше

Кистепёрые рыбы важны тем, что у них были прочный внутренний скелет, мясистые плавники и способность жить в мелководных водоёмах. Эти признаки подготовили переход к наземному образу жизни.

Освоение суши животными

Схема отражает последовательность изменений, связанных с появлением наземных экосистем в палеозое.



Каменноугольные леса и образование угля

● Болотные леса

В каменноугольном периоде обширные заболоченные леса из древовидных плаунов, хвощей и папоротников росли в тёплом влажном климате и быстро накапливали огромную биомассу.

● Уголь из остатков

Погребённые растительные остатки разлагались медленно из-за нехватки кислорода в заболоченных отложениях. Со временем они уплотнялись и превращались в каменный уголь.

● Крупные насекомые


Высокое содержание кислорода в атмосфере способствовало развитию очень крупных насекомых. Это был редкий период, когда размеры тела у многих форм заметно увеличивались.



Доминирующие группы палеозоя

Соотношение групп менялось неравномерно: сначала ведущую роль играли морские формы, затем всё заметнее становились наземные позвоночные и растения.

Палеозой показывает общий переход от морского биоразнообразия к более устойчивым наземным экосистемам.



Обобщение по палеонтологической летописи палеозоя

Пермь, Пангея и перестройка климата

Суперконтинент Пангея

К концу палеозоя почти все материки объединились в Пангею. Огромные внутренние области оказались далеко от океана, поэтому климат стал более континентальным и резко сезонным.

Аридизация суши

Сокращение мелководных морей и усиление засушливости изменили условия жизни. В таких ландшафтах особенно успешно распространялись голосеменные растения, рептилии и зверозубые пресмыкающиеся.

Предкризисная перестройка

Перед пермским вымиранием экосистемы уже были ослаблены климатическими контрастами и потерей морских местообитаний. Это сделало биосферу более уязвимой к последующим катастрофическим изменениям.

Эволюционные новшества протерозоя и палеозоя

Ключевые инновации, которые последовательно усложняли живой мир и расширяли его возможности.

Сначала возникли клеточные и энергетические преимущества, затем защитные и репродуктивные решения, позволившие жизни освоить сушу.

Новшество	Период	Значение
Фотосинтез	Архей–протерозой	Кислород
Эукариоты	1,8–1,6 млрд	Клеточная сложность
Семя	Поздний палеозой	Независимость

От микробов к наземным экосистемам

Протерозой создал кислородную и клеточную основу жизни, а палеозой превратил морские сообщества в сложные наземные экосистемы. Эта история ясно показывает роль среды в направленном усложнении живого мира.