

Эволюция биосферы и кислородная революция: главные темы

Ключевые этапы развития биосферы и роль кислородной революции в изменении жизни.



Зарождение жизни и атмосферные условия

Биосфера — это все живое вместе с окружающей средой. Первые клетки появились около 3,8 млрд лет назад, когда атмосфера была лишена кислорода и богата метаном, аммиаком и водородом. Энергия получалась в бескислородных условиях.



Жизнь без кислорода: хемотрофы и их метаболизм

1

Первые организмы — хемотрофы — использовали химическую энергию неорганических веществ, таких как сероводород и железо, без участия кислорода, обеспечивая жизнедеятельность.

2

Анаэробные процессы, такие как брожение, сульфатредукция и метаногенез, доминировали, задавая темп ранней биохимии на Земле.

3

Жизнь в полностью анаэробных условиях существовала миллиарды лет, формируя основу для последующих эволюционных изменений.

Фотосинтез и цианобактерии — переломный шаг



Возникновение фотосинтеза

Около 3,5 млрд лет назад цианобактерии начали использовать солнечный свет для получения энергии, выделяя кислород в процессе, что стало революцией для биосферы.



Строматолиты — следы древних экосистем

Окаменелые слои, известные как строматолиты, представляют собой свидетельства существования цианобактерий, демонстрируя их влияние на состав древних морей.



Кислород как побочный продукт

Фотосинтез стал первым источником свободного кислорода, который со временем изменил атмосферу, задав условия для появления аэробных организмов.

Пути депонирования кислорода

3,5–2,7 млрд лет назад

Кислород, выделяемый цианобактериями, активно связывался с растворённым железом, образуя железные руды.

2,7–2,2 млрд лет назад

Образование богаты железом кварцитовых формаций уменьшало свободный кислород в океанах и атмосфере.

Около 2,4 млрд лет назад

После насыщения резервуаров связанных соединений кислород начал накапливаться в атмосфере.

Начало кислородной катастрофы

Рост концентрации кислорода вызвал резкие изменения в геохимии и биосфере Земли.

Великая кислородная катастрофа: определение и хронология

1

Этот период (2,4–2,1 млрд лет назад) отмечен первым значительным увеличением атмосферного кислорода, что вызвало масштабные биологические и геохимические изменения.

2

Возросшее содержание кислорода привело к массовому вымиранию анаэробных организмов и значительным сдвигам в атмосфере и типах осадочных пород.



Изменение концентрации кислорода по эрам

Данные отражают постепенное повышение кислорода с резким ростом в момент кислородной катастрофы около 2,4 млрд лет назад.

Значительный скачок кислорода стал критическим толчком для эволюции аэробных организмов и преобразования биосферы.

Геохимические исследования осадочных пород, данные 2023 года



Ключевые этапы кислородизации Земли

Таблица отражает основные вехи накопления кислорода и их биогеохимические последствия.

Каждый этап сопровождался фундаментальными изменениями в биосфере и атмосфере Земли.

Этап	Время (млрд лет назад)	Описание
Возникновение фотосинтеза	3,5	Начало образования кислорода
Формирование железистых формаций	2,7-2,2	Связывание кислорода в рудах
Накопление кислорода в атмосфере	2,4	Рост концентрации O ₂
Массовое вымирание анаэробов	~2,3	Исчезновение многих видов
Формирование озонового слоя	2,0-1,5	Защита от ультрафиолета

Геохимические и палеонтологические исследования, 2022

Экологические последствия кислородной революции

1

Кислородная революция изменил климат, вызвав длительные ледниковые периоды из-за снижения парниковых газов.

2

Массовое вымирание анаэробных организмов освободило экологические ниши для аэробных форм жизни.

3

Образование железистых осадочных пород стало характерным геологическим признаком кислородизации.

4

Появились новые экологические стратегии и повышения биологического разнообразия.

Образование озонового слоя и его значение

Формирование озонового экрана

Повышение уровня кислорода привело к образованию озонового слоя в стратосфере, который блокирует губительное ультрафиолетовое излучение.

Влияние на развитие жизни

Этот защитный слой открыл возможности для выхода организмов на сушу, обеспечив безопасность генетического материала от повреждений.



Массовое вымирание анаэробных организмов

С резким увеличением атмосферного кислорода анаэробные микроорганизмы столкнулись с повышенным окислительным стрессом, что вызвало массовое падение их численности и утрату доминирующего статуса в экосистемах.

В возникших экологических нишах получили развитие аэробные формы жизни, способные эффективно использовать кислород для дыхания, что значительно расширило биоразнообразие и преобразило биохимические процессы.

Данные изменения привели к перестройке биоценозов, где аэробы совершенствовали пищевые цепи и создавали новые устойчивые экосистемы, изменяя экологическое равновесие планеты.

38

молекул АТФ может синтезироваться из одной молекулы глюкозы при аэробном дыхании, что значительно повышает энергетический выход по сравнению с анаэробными процессами.

Аэробное дыхание обеспечило организмам гораздо больший энергетический ресурс, что стимулировало развитие сложных структур и функций, включая нервную систему и крупные размеры тела.

Исследования биохимии клеточного дыхания, учебники по микробиологии

Кислород и формирование эукариот

Появление кислорода в атмосфере способствовало возникновению эукариот, организмов с ядром и сложной внутриклеточной организацией, что изменило направление эволюции жизни на планете.

Симбиогенез между древними прокариотами привёл к формированию митохондрий — органелл, которые эффективно использовали кислород для выработки энергии в клетках эукариот.

Усложнение клеточной структуры эукариот обеспечило переход к многоклеточным организмам, что заложило основу для появления животных, растений и грибов.

Усложнение живых организмов и экосистем

1

Переход на аэробное дыхание позволил увеличить энергетический потенциал организмов, что ускорило их эволюцию и программное развитие новых биологических функций, включая хищничество.

2

В результате возросших энергетических возможностей увеличился размер организмов, а также появились новые морфологические формы и поведенческие стратегии.

3

Разнообразные экосистемы распространились по суше и водоёмам, сформировав сложные трофические сети с участием многочисленных таксонов и новых экологических ниш.

4


Увеличение концентрации кислорода в атмосфере и формирование озонового слоя обеспечили защиту от ультрафиолетового излучения, что способствовало колонизации суши.

Диверсификация прокариот и новые экосистемы



Появление новых фотосинтетических групп

Разнообразие фотосинтетиков расширилось за счёт новых таксонов, что повысило продуктивность биосферы и уровень кислорода в атмосфере.



Развитие метаболических стратегий

В прокариотах появились различные пути получения энергии и веществ, включая аэробное дыхание и микроаэрофилию, повышавшие устойчивость экосистем.



Стабилизация биогеохимических циклов

Формирование замкнутых циклов веществ, таких как углеродный и азотный, способствовало поддержанию жизни и экологическому равновесию.



Влияние на формирование почвы и океанов

Микробные сообщества участвовали в преобразованиях среды, способствуя минерализации и консолидации осадков, что увеличивало среду обитания.

Геохимические свидетельства кислородной революции

1

Железистые кварциты эпохи около 2,4 млрд лет назад отражают период интенсивного связывания кислорода в руде, что подтверждает резкий рост добычи кислорода биосферой.

2

Изотопные соотношения углерода в осадках фиксируют изменения в биохимических процессах, указывая на переход от доминирования анаэробных к аэробным метаболизмам.

3

Стратиграфические данные и особенности распределения отложений свидетельствуют о резком изменении условий окружающей среды и структуре древних экосистем.

Глобальные геохимические последствия кислородизации

1

Появление свободного кислорода усилило химическое выветривание горных пород, ускоряя геохимические циклы и перераспределение элементов.

2

Изменился минералогический состав осадков с появлением новых оксидов и сульфатов, что влияло на морскую и наземную химию.

3

Кислородизация кислым образом изменила океаническую и почвенную среду, стимулируя биологическое разнообразие и усложнение пищевых цепей.

4

Эти процессы заложили основы современных биогеохимических циклов углерода, кислорода и других элементов, важных для жизни на планете.

Дальнейшая эволюция: новые кислородные скачки

Первичный кислородный скачок (2,4–2,1 млрд лет назад)

Резкий рост кислорода в атмосфере, изменение состава биоты, формирование озонового слоя и гибель анаэробных форм жизни.

Неопротерозойский кислородный скачок (около 800–540 млн лет назад)

Повторное значительное повышение уровня кислорода, что совпало с возникновением животных и интенсивным развитием фотосинтетических организмов.

Кембрийский взрыв (около 540 млн лет назад)


Стремительное появление множества многоклеточных форм, сложных экосистем и биологических инноваций, связанных с кислородными условиями.

Значение кислородной революции для появления человека

Высокий уровень кислорода оказал решающее влияние на развитие сложных организмов, включая предков человека, обеспечивая энергоёмкие функции мозга и активности.

Эволюция гоминид сопровождалась адаптациями к аэробному обмену веществ, что позволило увеличить размеры и функциональность органов тела и мозга.

Ранние биогеохимические изменения, связанные с кислородной революцией, создали фундамент для появления многообразных экосистем, в которых формировался вид *Homo sapiens*.



Кислородная революция: фундамент биосферных преобразований

Кислородная революция стала важнейшим этапом в истории жизни, обеспечив рост сложности организмов и их сред обитания, а также задав направление дальнейшей эволюции и освоения планеты.