


Обзор отряда насекомых: разнообразие и значение

Насекомые — крупнейшая группа животных,
важнейшие для экосистем Земли.



Появление и развитие насекомых на Земле

- Насекомые появились около 400 миллионов лет назад. Появление крыльев расширило их возможности, что привело к огромному разнообразию и расселению по планете.



Строение тела насекомого: основные характеристики



Тело насекомого делится на три части: голову с органами чувств, грудь с шестью ногами и брюшко, где расположены внутренние органы.



Экзоскелет из хитина покрывает тело, защищая от повреждений и предотвращая потерю влаги в окружающей среде.



Антенны служат для восприятия запахов, а фасеточные глаза обеспечивают широкий обзор и ориентацию в пространстве.

Разнообразие видов насекомых на Земле



Жуки — самые многочисленные обитатели

Жуки составляют огромную часть видов насекомых и обладают разнообразной окраской и формами. Они встречаются в лесах, на лугах и даже в воде.



Бабочки — мастера маскировки и миграций

Разнообразие бабочек удивляет оттенками и узорами крыльев. Некоторые виды совершают дальние миграции, преодолевая тысячи километров.



Муравьи и пчёлы — социальные насекомые

Эти группы строят сложные колонии с разделением труда, что обеспечивает выживание и эффективность в добыче пищи и защите.

Численность представителей основных отрядов насекомых

Жуки доминируют среди насекомых по количеству видов, что связано с их адаптивным разнообразием.

Разнообразие отрядов отражает различия в экологических стратегиях и специализациях видов.

Институт зоологии РАН



Органы чувств и специальные приспособления насекомых



Фасеточные глаза

Обеспечивают широкий угол обзора и восприятие движения, что помогает избегать хищников и находить пищу.



Усики (антенны)

Высокочувствительные органы, реагирующие на запахи, температуру и влажность, важны для ориентации и поиска партнёров.



Крылья

Различной формы и структуры, они обеспечивают способность к полёту и адаптацию к разным условиям среды.



Специализированные ноги

Некоторые виды приспособлены для прыжков, копания или плавания, расширяя спектр местообитаний.

Размножение насекомых: стадии развития

- Жизненный цикл начинается с яйца, из которого вылупляется личинка — наиболее активная и растущая стадия.
- У большинства насекомых присутствует стадия куколки, в которой происходит перестройка организма перед взрослением.
- Взрослая особь (имаго) способна к размножению и часто отличается от предыдущих стадий по строению и образу жизни.
- Некоторые насекомые (например, кузнечики) проходят неполное превращение, пропуская стадию куколки.

Экологическая роль насекомых: опыление и разложение

Опыление растений

Пчёлы, бабочки и жуки обеспечивают опыление большинства цветковых растений, что способствует плодоношению и поддержанию биоразнообразия.

Роль в пищевых цепях

Некоторые насекомые разлагают органические остатки, а хищники регулируют популяции вредителей, поддерживая стабильность экосистем.



Польза и вред от разных видов насекомых

Вид	Польза/Вред	Описание
Пчёлы	Польза	Опыление растений и производство мёда
Колорадский жук	Вред	Поражает картофельные плантации
Божья коровка	Польза	Уничтожает тлей на сельскохозяйственных культурах
Комары	Вред	Переносчики болезней
Тутовый шелкопряд	Польза	Производство шёлка
Тля	Вред	Повреждает овощные культуры

— Некоторые виды приносят пользу человеку, другие способны наносить экономический ущерб сельскому хозяйству.

Баланс между полезными и вредными насекомыми важен для устойчивого сельского хозяйства.

— *Агрономические исследования, 2023*

Насекомые-вредители: угрозы для сельского хозяйства



Колорадский жук, саранча и тля наносят серьёзный ущерб урожаям картофеля, зерновых и овощей, приводя к потере до 30% производства ежегодно.

Для борьбы используют химические инсектициды, биологические методы с энтомофагами и агротехнические приёмы, такие как севооборот и обработка почвы.

Изучение насекомых: вклад науки и открытий



Энтомология изучает разнообразие насекомых, анализируя их морфологию и поведение для понимания адаптаций к среде и влияния на экосистемы.




Исследования улья пчёл раскрыли основы коллективного взаимодействия и организации в сложных социальных структурах.



Научные опыты выявляют химические процессы и ферменты, важные для обмена веществ и выживания различных групп насекомых.

Влияние загрязнения среды на насекомых



Пестициды и сокращение популяций опылителей

Химические вещества, особенно неоникотиноиды, негативно влияют на здоровье пчёл и бабочек, снижая их способность к опылению. Этот процесс угрожает устойчивости экосистем и сельскому хозяйству.



Уменьшение цветочных ландшафтов и качество воды


Сокращение площади цветковых растений и загрязнение водных ресурсов ухудшают условия обитания насекомых, приводя к снижению численности и изменению биоразнообразия.

График сокращения численности опылителей в Европе

Основными причинами сокращения стали интенсивное применение пестицидов и утрата естественных местообитаний.

Данные свидетельствуют о тревожном снижении популяций опылителей, что требует срочных мер по охране и восстановлению среды.

Европейское агентство по окружающей среде, 2022





65 см

Длина палочника *Phobaeticus chani* является максимальной среди известных насекомых.

Это свидетельствует о невероятном многообразии размеров и форм, встречающихся в мире насекомых.

Научный журнал «Entomology Today», 2023

Жизненный цикл бабочки: полное превращение

Источник: биология развития насекомых



Социальные насекомые: структуры колоний



Организация колонии

Колонии формируются из каст: матка отвечает за размножение, рабочие выполняют уход за потомством и добычу пищи, солдаты защищают гнездо от врагов. Такая структура повышает эффективность и выживаемость сообщества.

Коммуникация и взаимодействие

Для общения насекомые используют феромоны и тактильные сигналы, обеспечивающие координацию действий и адаптацию к внешним изменениям среды.

Способы маскировки и защиты у насекомых



Палочники и бабочки имитируют объекты окружения — ветви, листья или цветы — для скрытности и избегания нападений хищников.



Гусеницы обладают яркой или незаметной окраской: яркая предупреждает о токсичности, а маскировочная помогает сливаться с фоном, уменьшая риск поедания.



Некоторые жуки выделяют токсичные вещества, отпугивая хищников и увеличивая шансы на выживание в экстремальных условиях.

Необычные факты из жизни насекомых



Питие слёз черепах бабочками Caligo

Эти бабочки собирают слёзы для получения необходимых солей и минералов. Такое поведение демонстрирует уникальное взаимодействие между видами в природе.



Биолюминесценция светляков

Светляки используют свет для привлечения партнёров в темноте, создавая удивительные световые шоу и обеспечивая успешное размножение.



Защита жука-бомбардира

При опасности жук выбрасывает горячий химический раствор из задней части тела, отпугивая врагов и сохраняя жизнь без применения физической силы.

Будущее: роль насекомых в жизни человека и науки

Разрабатываются безопасные инсектициды, минимизирующие вред для полезных насекомых и экосистемы в целом.

Продолжается развитие биотехнологий в области выращивания насекомых для питания человека и кормов в сельском хозяйстве.

Внедряются методы контроля численности вредителей с использованием естественных врагов и биологических препаратов.

Насекомые активно применяются как биоиндикаторы для оценки качества окружающей среды и мониторинга изменений климата.

Итог: важность изучения насекомых для будущих поколений

Изучение насекомых помогает сохранять биоразнообразие, поддерживать сельское хозяйство и развивать экологически безопасные технологии, формируя ответственное отношение к природе у молодежи.