


Сцепленное наследование и хромосомная теория наследственности

Гены наследуются вместе, если находятся в одной хромосоме.



От наследственных факторов к хромосомам

В начале XX века стало ясно: законы Менделя описывают не абстрактные «факторы», а поведение хромосом в мейозе. Работы Саттона, Бовери и Моргана связали наследование признаков с их физическим носителем — ДНК-хромосомным комплексом.



Ген, локус и аллели как основа наследования

Ген как единица наследственности

Ген — это участок ДНК, который связан с формированием признака или синтезом определённого белка. Именно он несёт информацию, передающуюся из поколения в поколение.

Локус определяет положение

Локус — это точное место гена в хромосоме. У разных гомологичных хромосом один и тот же ген расположен в одинаковом локусе, что важно для правильного расхождения при мейозе.

Аллели и их расхождение

Аллели — это разные варианты одного гена. Во время мейоза они расходятся в разные гаметы, поэтому потомство получает лишь одну из двух аллельных форм от каждого родителя.


Почему гены наследуются вместе

Если гены находятся близко друг к другу в одной хромосоме, они часто переходят в гамету как единый блок. Такое физическое соседство и создаёт сцепленное наследование.

Число групп сцепления у разных организмов

Число групп сцепления связано с гаплоидным набором хромосом и помогает сопоставлять генетическую организацию разных видов.

Данные показывают прямое соответствие между числом групп сцепления и количеством хромосом в гаплоидном наборе.



Закон сцепленного наследования

1 Одна хромосома — одна группа

Гены, расположенные в одной хромосоме, обычно передаются потомству совместно и образуют группу сцепления. Чем ближе локусы, тем устойчивее такое совместное наследование.

2 Кроссинговер ослабляет сцепление

Если между генами есть расстояние, в профазе I мейоза может произойти обмен участками между гомологичными хромосомами. Тогда часть гамет получает новые комбинации аллелей.

3 Отклонение от независимости

Сцепление объясняет, почему результаты скрещиваний не всегда совпадают с третьим законом Менделя. Вместо полного независимого распределения часто наблюдается преобладание родительских сочетаний.



Полное и неполное сцепление: сравнение признаков

Сравнение показывает, как кроссинговер меняет состав потомства и позволяет оценивать расстояние между генами.

Полное сцепление сохраняет родительские сочетания, а неполное позволяет измерять частоту рекомбинации и строить генетические карты.


Тип	Кроссинговер	Потомство	Результат
Полное	Нет	Только родительские	Рекомбинантов нет
Неполное	Да	Есть рекомбинанты	Оценка расстояния

Опыты Моргана на дрозофиле



Белые глаза против красных

Морган скрестил белоглазую самку с красноглазым самцом и получил потомство, которое не соответствовало ожиданиям независимого наследования. Необычное распределение признаков заставило искать их связь с полом.



Ген на X-хромосоме

Оказалось, что ген белоглазости связан с X-хромосомой. Самцы дрозофилы имеют только одну X-хромосому, поэтому рецессивный признак у них проявляется особенно наглядно и легко обнаруживается в потомстве.



Эксперимент как доказательство

Серия скрещиваний показала: наследование признака подчиняется не только законам расщепления, но и расположению гена в хромосоме. Эти опыты стали ключевым подтверждением хромосомной теории наследственности.

Как возникает рекомбинация при кроссинговере


Последовательность стадий мейоза I, в которых происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.



Связь между расстоянием между генами и частотой рекомбинаций

Рост частоты рекомбинаций используют как ориентир при сравнении локусов и построении карт хромосом.


Чем дальше друг от друга расположены гены, тем выше вероятность рекомбинации; при больших расстояниях она приближается к пределу.




Схематические данные, отражающие закон Моргана о частоте кроссинговера



Эта единица позволяет оценивать относительное расстояние между генами и упорядочивать локусы на генетической карте без знания точной длины ДНК.



1%
рекомбинаций
соответствует 1
сантиморганиде.



Классическое определение генетической карты
в хромосомной генетике

Хромосомная теория наследственности

Гены в хромосомах

Наследственные признаки определяются генами, которые находятся в хромосомах и передаются вместе с ними при делении клеток. Поэтому наследование зависит не только от самих аллелей, но и от их положения.

Линейное расположение


Гены в хромосоме расположены последовательно, как участки на нити. Такое строение позволяет объяснить, почему одни признаки наследуются совместно, а другие разделяются при образовании гамет.

Локус и аллели

Каждый ген занимает строго определённое место — локус. Аллели одного гена лежат в одинаковых локусах гомологичных хромосом и расходятся по разным гаметам в ходе мейоза.

Сцепление и обмен

Близко расположенные гены чаще передаются как единый блок. Однако кроссинговер между гомологичными хромосомами может разрывать сцепление и создавать новые сочетания аллелей.



Основные положения хромосомной теории

Кратко перечислены ключевые идеи, которые связали законы наследования с поведением хромосом и опытом Саттона, Бовери и Моргана.

Теория объясняет наследование через структуру хромосом: расположение генов, их совместную передачу и рекомбинацию, а также связь числа групп сцепления с гаплоидным набором.

Положение	Смысл
Гены в хромосомах	Саттон, Бовери
Линейное расположение	Гены идут рядами
Локус гена	Свое место
Кроссинговер	Рекомбинация
Группы сцепления	По числу хромосом
Морган	Доказал сцепление

Классические данные цитологии и генетики начала XX века: работы У. Саттона, Т. Бовери, Т. Моргана.

Сцепление с полом как частный случай наследования

1 Почему наследование особое

Гены, расположенные в половых хромосомах, передаются не так, как аутосомные. Различие между X- и Y-хромосомами делает наследование некоторых признаков асимметричным у мужчин и женщин.

2 Почему мужчины болеют чаще

У мужчины одна X-хромосома, поэтому рецессивный аллель, находящийся на ней, сразу проявляется в фенотипе. У женщины такой же аллель может быть скрыт вторым, нормальным вариантом.


3 Классические примеры

К X-сцепленным признакам относят дальтонизм и гемофилию. Их изучение показало, что половые хромосомы подчиняются общим законам наследственности, но дают особые схемы передачи признаков.

Наследование признаков, сцепленных с X-хромосомой

Схема показывает типичное распределение для X-сцепленных признаков: у мужчин чаще наблюдается проявление, у женщин — носительство без симптомов.

Разница связана с тем, что сын получает X-хромосому от матери, а отец передаёт X-хромосому дочерям. Поэтому рецессивные аллели чаще проявляются у мужчин.




Схематическая иллюстрация по правилам X-сцепленного наследования; значения условные, используются для сравнения полов.

Практическое значение знаний о сцеплении

Селекция

Знание сцепления помогает сочетать полезные признаки у растений и животных, подбирая родительские формы так, чтобы нужные аллели чаще наследовались вместе.



Генетическое картирование

Карта хромосом нужна при поиске маркеров болезней и изучении родословных. Она помогает локализовать гены и сравнивать участки ДНК у разных организмов.

Медицинская генетика

В медицине сцепление используют для оценки риска наследственных болезней, связанных с определёнными хромосомами, и для более точного анализа семейных случаев.

Алгоритм решения задач на сцепление генов

Последовательность анализа родительских форм, потомства и частоты рекомбинаций позволяет установить расстояния между генами и их порядок.



Почему сцепление не бывает абсолютным

Даже при тесном расположении генов в хромосоме кроссинговер может нарушать исходные комбинации аллелей. Поэтому сцепление всегда оценивают вероятностно.

Основную долю потомства составляют родительские сочетания, но рекомбинанты неизбежны. Чем дальше гены друг от друга, тем выше вероятность обмена участками.



Схематическое распределение по результатам классических опытов по сцеплению и кроссинговеру.

Ограничения и особенности хромосомной карты

1 Частота неравномерна

Кроссинговер происходит в разных участках хромосомы с неодинаковой частотой. Поэтому одинаковое расстояние по карте не всегда означает одинаковую вероятность рекомбинации.

2 Предел в 50 процентов

Если локусы расположены очень далеко друг от друга, наблюдаемая частота рекомбинаций приближается к 50 процентов. Тогда такие гены почти не отличимы от несцепленных.

3 Нужны большие выборки

Для построения надёжной карты используют многочисленные скрещивания и большие серии потомства. Это снижает случайные ошибки и позволяет точнее оценить порядок генов.



Современное значение хромосомной теории



От хромосомы к маркеру

Сегодня хромосомная теория работает не только в школьной генетике. Она лежит в основе анализа ДНК-маркеров, которые помогают находить участки генома, связанные с признаками и наследственными заболеваниями. Такие карты позволяют быстро сопоставлять наследование признака с конкретным локусом и уточнять его положение.



Геномика и медицина

В геномике теория стала языком, на котором описывают строение генома и взаимное расположение генов. В медицине она помогает искать гены предрасположенности, определять хромосомные нарушения и выстраивать более точную диагностику для пациента и его семьи.



Карта живой системы

Современная карта хромосомы — это не просто схема линий и подписей, а инструмент исследования организма. На ней отмечают локусы, маркеры и участки, важные для селекции, диагностики и сравнения разных видов, что делает теорию по-прежнему актуальной.

Итоги: как сцепление дополнило законы Менделя

Сцепленное наследование показало, что гены передаются не изолированно, а в связи с их положением в хромосомах. Хромосомная теория объяснила кроссинговер, рекомбинацию и генетическое картирование, связав классическую и современную генетику.