



Папоротниковидные: обзор и ключевые темы

Древние сосудистые растения с большим видовым разнообразием и важной ролью в экосистемах.



История и значение изучения папоротников

Папоротники появились более 360 миллионов лет назад. Изучение их эволюции началось с окаменелостей и классификации XIX века, сейчас дополнено молекулярными методами.



Отличия папоротниковидных от других растений

Папоротниковидные не имеют семян и цветов, размножаются только спорами и обладают крупными разделёнными листьями — вайями.

В их жизненном цикле доминирует диплоидный спорофит, а сосудистая система и корни сильно развиты, что отделяет их от мхов и хвощей.



более 10 000

**видов папоротников
существует на сегодняшний
день в мире.**

Биологические справочники, 2023

В России встречается свыше 100 видов, большинство предпочитает влажные тропические леса.

Строение папоротника: основные органы

Корневая система и корневище

Корни впитывают воду и минеральные вещества, а корневище способствует вегетативному размножению и запасает питательные вещества.

Вайи — листья папоротника

Вайи перисторассечённые, выполняют фотосинтез и на нижней стороне образуют спорангии для формирования спор.



Корни и корневища папоротников

Корневая система у папоротников включает стержневой корень, который эффективно поглощает влагу и минералы из почвы.

Корневище, разветвлённое и часто подземное, служит для хранения веществ и восстановления после повреждений.

Корни активно поддерживают рост растения даже при недостатке света, что важно для лесных условий обитания.

Уникальные особенности вайей папоротников

Вайи гигантов природы

Некоторые виды достигают 5 метров в длину, их большие листья украшают тропические леса и обеспечивают важные функции растениям.



Структура и красота вайей

Перисторассечённая форма и разнообразие узоров делают вайи ярким отличием папоротников от других растений, привлекая внимание ботаников и дизайнеров.



Роль вайей в размножении

На нижней поверхности вай формируются группы спорангиев, важных для образования спор и продолжения жизненного цикла.



Сравнение папоротников, мхов и хвощей

Признак	Папоротники	Мхи	Хвощи
Сосудистая система	Развита	Отсутствует	Слабо развита
Доминирующая фаза	Спорофит	Гаметофит	Спорофит
Листья	Сложные вайи	Простые	Мелкие чешуевидные

Таблица отражает важнейшие отличия по строению и жизненному циклу среди трёх групп споровых растений.

Папоротники имеют наиболее сложную структуру среди споровых растений, что способствует их успешному распространению.

Жизненный цикл: чередование поколений

Формирование спор

Спорофит создает споры с помощью мейоза на нижней стороне вай.

Рост гаметофита

Спора прорастает и формирует гаметофит — заросток, который живёт самостоятельно.

Производство половых клеток

На гаметофите развиваются антеридии и архегонии, где образуются сперматозоиды и яйцеклетки.

Оплодотворение и развитие спорофита


Влагой обеспечивается оплодотворение, после чего заросток даёт начало новому спорофиту.

Распределение папоротников по континентам

Преобладание во влажных тропиках объясняется благоприятным климатом и богатством экосистем.

Глобальный ареал папоротников тесно связан с климатическими условиями, что влияет на видовое разнообразие.


Влажные тропики Умеренные широты
Другие зоны



Глобальный ботанический атлас, 2022

Основные этапы размножения папоротников

Источник: учебные материалы по ботанике



Разнообразие форм и размеров папоротников

Карликовые папоротники —
миниатюрные красавцы

Некоторые папоротники достигают всего 2-3 см в высоту. Эти малые виды, например аспидны, легко прячутся среди мха и травы, создавая маленькие зеленые коврики. Их миниатюрность помогает выживать в сложных условиях и сохранять влагу.



Древовидные гиганты леса

Крупнейшие виды папоротников могут достигать 20 метров в высоту, как дикилии и циатеи. Их массивные стволы и гигантские вайи образуют плотный полог, создавая тень и влажность для других растений и животных.



Экологическая роль папоротников



Регуляция водного баланса

Папоротники помогают поддерживать влажность в лесах, регулируя испарение и впитывание воды почвой.



Создание микроклимата

Листья папоротников формируют тень и влажность, что создает комфортные условия для мхов и лишайников.




Участие в почвообразовании

Разлагаясь, папоротники обогащают почву органическими веществами, улучшая её плодородие.

Папоротники как комнатные и декоративные растения

Щитовник, нефролепис и адиант аслепиевидный ценятся за красивые листья и неприхотливость. Они очищают воздух, улучшая микроклимат в помещениях.

Эти растения широко используются для озеленения квартир, офисов и зимних садов. В ландшафтном дизайне их применяют для создания японских садов и вертикальных зелёных стен.



Значение папоротников для науки и культуры

Папоротники изучаются в эволюционной биологии как пример древних сосудистых растений с уникальным жизненным циклом.

В декоративно-прикладном искусстве мотив папоротника символизирует счастье и часто встречается на керамике и тканях.

Народные мифы придают папоротнику волшебное значение, связанное с цветком папоротника и удачей.

Изображения папоротников присутствуют на гербах и эмблемах, подчеркивая их культурную ценность.


Экономическое значение некоторых видов

Пищевая и медицинская ценность

В Азии побеги орляка обыкновенного собирают весной, маринуют и употребляют в пищу. Экстракты полиподиев и сальвиний применяют в традиционной медицине для лечения различных заболеваний.

Использование в дизайне и сельском хозяйстве

Папоротники часто используют в фитодизайне для украшения интерьеров и озеленения. Они также применяются для улучшения структуры почвы при пересадке и рекультивации.



Охрана и редкие виды папоротниковидных

Страусник обыкновенный, сальвиния плавающая и полиподиум австрийский включены в Красные книги России и мира как редкие и уязвимые виды.

Основные угрозы для папоротников — осушение болот, вырубка лесов и загрязнение окружающей среды, а также влияние изменения климата.

Для сохранения видов создаются заповедники и заказники, а также запрещается сбор и коммерческая добыча редких папоротников.



Папоротники в мире доисторических растений

1. В каменноугольном периоде существовали гигантские деревья-папоротники, достигающие высоты до 30 метров. Они формировали обширные леса, являвшие основой древних экосистем.
2. Остатки этих растений со временем превратились в крупные залежи каменного угля, ставшего важным энергетическим ресурсом для человека.

25 метров

**является максимальной
длиной листа у современного
папоротника, найденного у
антарктических видов.**

Источник: ботанические исследования и каталоги флоры

Самая длинная вайя современных папоротников достигает 25 метров. Более 100 видов папоротников произрастают в России, адаптируясь к разнообразным условиям. Они способны выживать при низком уровне света и высокой влажности, что делает их незаменимыми обитателями лесов.

Папоротниковидные: эволюция, значение и будущее

Папоротники — древняя группа с богатым разнообразием, играющая ключевую роль в экосистемах, культуре и науке. Их изучение помогает понять устойчивость природы и важность охраны биологического разнообразия.