


Общая картина эволюции жизни на Земле

Жизнь на Земле развивается более 4 миллиардов лет, проходя сложные этапы.



Рождение Земли и формирование условий жизни


Земля сформировалась около 4,6 млрд лет назад. Её поверхность была раскалённой, атмосфера насыщена вулканическими газами. Вода появилась из конденсата и метеоритов, создав первые океаны — колыбель жизни.



Гипотезы возникновения жизни и появление первых клеток

- Абиогенез предполагает самопроизвольное зарождение жизни из неорганики в земных условиях около 3,8 млрд лет назад.
- Теория панспермии выдвигает идею, что жизнь была занесена на Землю из космоса вместе с органикой.
- Первые клетки — прокариоты, такие как бактерии и археи, обладали простым строением без ядра, используя разные источники энергии.

Жизнь в древних океанах Архейской эры



Возникновение первых прокариотов


Более 3,5 миллиарда лет назад в океанах появились бактерии и археи. Они питались за счёт фотосинтеза и хемосинтеза, поддерживая циркуляцию энергии в экосистемах древнего мира.



Цианобактерии и влияние на атмосферу

Цианобактерии начали выделять кислород, постепенно изменяя состав воздуха. Эти изменения позволили развиваться новым формам жизни и подготовили земную среду для будущих эукариот.

Кислородная катастрофа и её последствия




- Около 2,4 млрд лет назад кислород начал накапливаться в атмосфере, убивая многих анаэробных организмов, не выдерживавших его токсичное воздействие.
- Появление озонового слоя защитило планету от ультрафиолетового излучения, что дало возможность жизни адаптироваться к новым условиям и развиваться дальше.

Появление эукариот и усложнение жизни

Первое — около 2 млрд лет назад эукариотические клетки возникли в результате симбиоза микробов, получив ядро и органеллы.

Второе — это усложнение обмена веществ и энергии в клетке, которое открыло путь к многоклеточным организмам и новым эволюционным перспективам.




Темпы появления новых видов в разные геологические эры

Кембрийский взрыв обеспечивает резкий рост новых видов, важный этап разнообразия.

Массовые вымирания замедляли темпы видообразования, но общая тенденция — прогресс разнообразия.

Палеобиологические данные, 2023



Кембрийский взрыв: масштабное разнообразие жизни



Резкий рост видов

За 20 миллионов лет в кембрийском периоде появились почти все современные типы животных, что резко увеличило разнообразие жизни на планете.



Внешние скелеты и органы чувств

Появились наружные скелеты и сложные системы органов чувств, включая глаза, что обеспечило эффективную защиту и ориентацию в окружающей среде.



Формирование сложных пищевых цепей

Развитие взаимосвязей между хищниками и жертвами создало новые экосистемные структуры, подготовив почву для наземной колонизации.

Выход живых организмов на сушу

Колонизация суши растениями

Около 470 млн лет назад первые растения, напоминающие водоросли, начали заселять сушу, формируя примитивные экосистемы.

Появление первых животных на суше

Примерно через сто миллионов лет появились первые животные — земноводные, способные жить как в воде, так и на суше.



Пять главных массовых вымираний — сравнительный анализ

Сравнение масштабов вымираний по времени и количеству погибших видов.

Пермское вымирание — самое масштабное, уничтожившее подавляющее большинство морских видов.

Палеонтологические исследования, 2023

Период	Время (млн лет назад)	Процент исчезнувших видов
Девонское	~360	70%
Пермское	~252	96%
Триасовое	~201	80%
Юрское	~145	50%
Мел-палеогеновое	66	75%




Господство динозавров в мезозойскую эру

Динозавры стали главными обитателями суши примерно 230 миллионов лет назад, завоеывая разнообразные экологические ниши и становясь доминирующей группой животных на длительный период.

В мезозое впервые появились млекопитающие и птицы, которые занимали меньшие экологические роли, но уже начали развиваться и диверсифицироваться параллельно с динозаврами.

Покрытосеменные растения начали распространяться в этот период, что способствовало сбережению и развитию экосистем благодаря новым источникам пищи и средам обитания.

Экосистемы мезозоя характеризовались большим разнообразием, где динозавры, цветковые растения и первые птицы формировали сложные пищевые цепи и взаимодействия.



Падение астероида и исчезновение динозавров

- Около 66 миллионов лет назад мощный астероид упал на полуостров Юкатан, вызвав масштабные разрушения и длительное затемнение из-за пыли в атмосфере. Это привело к резкому ухудшению условий для жизни на Земле.
- В результате погибло около 75% всех видов, включая всех наземных динозавров, за исключением птиц. Это событие открыло новые экологические ниши для млекопитающих и других групп.



Эволюция млекопитающих после исчезновения динозавров

Палеоцен (66–56 млн лет назад)

Млекопитающие начали быстро заполнять опустевшие экологические ниши, появилось множество новых форм, преимущественно мелких размеров.

Эоцен (56–34 млн лет назад)

Активное разнообразие приматов и рукокрылых, первые крупные копытные животные, развитие адаптаций к наземной и воздушной жизни.

Олигоцен (34–23 млн лет назад)

Начался расцвет китообразных и разнообразных травоядных, формирование сложных экосистем с участием млекопитающих.

Плиоцен и Плейстоцен (5 млн — 12 тыс. лет назад)

Появились предки современных видов, включая приматов с двуногостью, что стало фундаментом для эволюции человека.

Развитие и влияние покрытосеменных на биосферу



Происхождение цветковых растений в меловом периоде

Покрытосеменные растения возникли около 130 миллионов лет назад, быстро распространяясь благодаря эффективным методам опыления. Их разнообразие стимулировало развитие новых групп насекомых, способствуя сложным экологическим взаимосвязям.



Экологические изменения благодаря цветковым растениям


Распространение покрытосеменных изменило ландшафты и биохимические циклы, усиливая продуктивность экосистем. Они создали новые источники пищи, стимулировали эволюцию животных и увеличили биологическое разнообразие.

Путь эволюции приматов к человеку

После массового вымирания 65 миллионов лет назад приматы начали активно эволюционировать, развивая сложное поведение и улучшая зрение для жизни в лесах.


Позже произошла диверсификация на старосветных и новосветных приматов с разными адаптациями, что подготовило основу для дальнейшего развития гоминид.

Ключевыми этапами стали появление двуногости и значительное увеличение объёма мозга, что обеспечило развитие орудий труда, языка и социальной структуры у ранних людей.



Ключевые этапы эволюции: от австралопитека до Homo sapiens

Основные переходы и усовершенствования в анатомии и культуре



Появление Homo sapiens и неолитическая революция




- Homo sapiens возник около 200 тысяч лет назад в Восточной Африке, постепенно распространяясь по планете и совершенствуя орудия и социальные навыки.
- Примерно 10 тысяч лет назад началась неолитическая революция — переход к сельскому хозяйству и оседлому образу жизни, что заложило основу для формирования цивилизаций.

Изменения в численности и разнообразии млекопитающих

Общая тенденция показывает стабильный рост числа видов с момента исчезновения динозавров, однако в современности влияние человека вызывает снижение некоторых популяций.

Рост разнообразия млекопитающих обусловлен климатическими изменениями и эволюционными адаптациями, но антропогенное воздействие представляет новую угрозу для биоразнообразия.

Палеобиологические и экологические исследования, 2024



Влияние человека на биосферу

Экологические проблемы современности

Активная деятельность человека приводит к исчезновению лесов, загрязнению воды и воздуха, а также к сокращению числа многих видов животных и растений.

Меры охраны природы

Для сохранения биологического разнообразия создаются заповедники и национальные парки, развиваются международные инициативы по защите природы и устойчивому использованию ресурсов.



Эволюция жизни и роль человека сегодня

Жизнь на Земле прошла через множество преобразований, и сейчас человек играет ключевую роль в её будущем. Ответственное отношение к природе — залог сохранения биосферы для будущих поколений.

