



Обзор подцарства Простейшие: ключевые темы и значение



Подцарство Простейшие включает одноклеточных животных с разнообразием форм и важной ролью в природе.

История и значение изучения простейших



Простейшие — одна из самых древних групп животных, насчитывающая более 60 000 видов. Термин введён Э. Геккелем в XIX веке. Изучение простейших помогает понять эволюцию многоклеточных и изучается в школьной биологии с 5 по 8 класс.



Ключевые признаки и отличия простейших

Простейшие состоят из одной клетки с ядром и органоидами, обеспечивающими жизнедеятельность и обмен веществ.

Имеются как свободноживущие, так и паразитические формы, демонстрирующие различные способы питания и передвижения.

Для простейших характерны признаки животных: активность, гетеротрофное питание, раздражимость и способность к размножению.

Таксономия и основные классы простейших

01 Саркодовые, или амёбы, передвигаются с помощью ложноножек и обладают аморфной формой тела.

02 Жгутиконосцы включают эвглен и трипаносом, передвигающихся жгутиками и способных к фотосинтезу или паразитизму.

03 Инфузории имеют реснички и два типа ядер, их пример — инфузория туфелька с клеточным ртом.

04 Споровики — паразитические формы, например малярийный плазмодий, со сложным циклом развития и сменой хозяев.

Внутреннее строение и органы движения простейших




01 Структура клетки простейших

Клетка содержит ядро и цитоплазму с пищеварительными и сократительными вакуолями, обеспечивающими пищеварение и выведение воды.



02 Средства передвижения

Для движения у простейших используются жгутики, реснички и ложноножки, что зависит от принадлежности к определённой группе.



03 Особенности различных видов

Эвглена имеет глазок и хлоропласты, инфузория — клеточный рот, а споровики выделяются специализированным апикальным комплексом.

Органоиды простейших: строение и функции



Сократительные вакуоли регулируют водный баланс, удаляя излишки жидкости из клетки.



Пищеварительные вакуоли захватывают и переваривают пищу, обеспечивая клетки необходимыми веществами.



Жгутики и реснички обеспечивают активное передвижение в водной среде, поддерживая жизнедеятельность.



Ложноножки служат не только для движения, но и для захвата пищи и взаимодействия с окружающей средой.

Таблица: Разнообразие простейших по строению и питанию



Класс/Примеры	Орган движения	Характер питания
Саркодовые (амёба)	Ложноножки	Фагоцитоз, гетеротроф
Жгутиконосцы (эвглена)	Жгутик	Миксотроф, фотосинтез
Инфузории (туфелька)	Реснички	Гетеротроф, пищеварительный рот
Споровики (плазмодий)	Нет	Паразитизм

Характерные органы движения и типы питания у разных классов простейших.

Органы движения и питание отражают адаптации к образу жизни и роль в экосистемах.

Распределение простейших по классам



■ Саркодовые ■ Жгутиконосцы ■ Инфузории
■ Споровики



Свободноживущие классы преобладают над паразитическими, что отражает разнообразие экологических ниш.

Доля классов указывает на важность свободноживущих форм в водных экосистемах.

Современные исследования биоразнообразия простейших, 2023

Жизненный цикл малярийного плазмодия

Жизненный цикл Plasmodium и этапы передачи инфекции



Среда обитания и география простейших

Простейшие населяют пресные и морские воды, почву и растительные поверхности, где обеспечивают основу пищевых цепей.


Свободноживущие и паразитические формы широко распространены по всему земному шару, включая экстремальные условия.

Некоторые виды адаптированы к горячим источникам, полярным регионам и заболоченным территориям, что подтверждает их биологическую пластичность.

Внешняя форма и размеры клеток простейших

Овальная форма эвглени и её особенности

Эвглена имеет удлинённое овальное тело, покрытое пелликулой — гибкой мембраной, придающей форму и защиту. Размеры её клетки варьируются в пределах нескольких сотен микрон, что позволяет легко рассмотреть структуру под микроскопом.



Аморфная форма амёбы: изменчивая и подвижная

Амёба отличается аморфным телом, постоянно меняющим форму с помощью ложноножек. Такая пластичность обеспечивает эффективное перемещение и захват пищи. Диаметр амёбы может достигать от 10 до 600 микрон.



Ресничные инфузории с симметричным строением

Инфузория туфелька имеет характерную грушевидную форму с множеством коротких ресничек по всей поверхности, обеспечивающих движение. Её размеры обычно составляют около 200-300 микрон, что даёт высокую функциональность при передвижении.



Способы передвижения простейших: уникальные механизмы



01 Жгутики эвглены — источник активного движения

Жгутики эвглены представляют собой длинные тонкие выросты, которые совершают волнообразные движения. Это позволяет организму плавно перемещаться в воде, осваивая разные экосистемы и обеспечивая поиск питания.



02 Реснички у инфузорий: координированное движение

Инфузории используют многочисленные короткие реснички, которые двигаются синхронно, создавая струи воды. Такой способ движения даёт им возможность эффективно контролировать направление и скорость передвижения.



03 Ложноножки амёб — временные выросты для движения

Амёбы передвигаются, формируя ложноножки — временные выступы цитоплазмы, позволяющие им захватывать субстрат и перемещаться по нему. Этот метод обеспечивает высокую адаптивность в изменяющихся условиях среды.

Питание простейших: разнообразие стратегий



Гетеротрофные простейшие, такие как амёбы и инфузории, поглощают готовые органические вещества, используя процессы фагоцитоза и пищеварения внутри вакуолей.

Автотрофные и миксотрофные формы, как эвглена, способны к фотосинтезу благодаря наличию хлоропластов, что позволяет добывать энергию из солнечного света.

Паразитические простейшие всасывают растворённые питательные вещества всей поверхностью тела, адаптируясь к жизни внутри хозяина и обеспечивая своё существование.



Размножение и жизненные циклы простейших

Основной способ размножения — бесполое бинарное деление, когда одна клетка делится на две идентичные, что характерно для амёб и эвглен.

Споровики демонстрируют множественное деление, создавая большое количество спор, а инфузории могут размножаться почкованием или половым путём - конъюгацией.

Скорость деления варьируется: некоторые виды способны делиться каждые 24 часа, что способствует быстрому росту популяций в благоприятных условиях.



Раздражимость и защита простейших

- Простейшие реагируют на свет и химические сигналы с помощью фототаксиса и хемотаксиса, направляя своё движение к благоприятным условиям или избегая вредных веществ.
- При неблагоприятных факторах окружающей среды простейшие образуют цисты — устойчивые, защитные структуры, способные долго сохранять жизнеспособность и распространяться на большие расстояния.

Экологическая роль простейших

01

Простейшие лежат в основе пищевых цепей водных экосистем, обеспечивая пищу фильтраторам и молоди рыб, что поддерживает биологическое равновесие.

02

Они активно участвуют в разложении органических остатков, способствуя минерализации и возвращению веществ в круговорот среды.

03

Определённые виды контролируют численность бактерий и водорослей, предотвращая избыточный рост и создавая условия для разнообразия экосистем.

04

Простейшие взаимодействуют с другими организмами через мутуализм или конкуренцию, влияя на структуру и стабильность сообществ.

Прикладное значение простейших

Простейшие служат индикаторами качества воды: присутствие инфузорий показывает загрязнение, а жгутиконосцев — стадии эвтрофикации водоёмов.


В биотехнологиях их используют для выращивания аквакультур, а также в качестве модельных организмов при научных исследованиях.

В медицине изучение простейших помогает выявлять заболевания, разрабатывать методы профилактики и создавать новые лекарственные препараты.

Паразитические простейшие и их влияние на здоровье человека

Малярийный плазмодий и болезнь малярия

Plasmodium вызывает малярию — серьёзное заболевание с высокой смертностью в тропиках. Паразит развивается в организме человека и комара, вызывая лихорадку и повреждение крови. Борьба с комарами и профилактика играют ключевую роль в контроле заболевания.



Трипаносомы — возбудители болезней Чагаса и сонной болезни

Trypanosoma передаётся через укусы мух и клопов. Патогены вызывают хронические и острые заболевания с поражением нервной системы и сердца. Контроль кровососущих насекомых и санитарные меры снижают риск заражения.



Лямблии и кишечное лямблиозное заражение

Lambia intestinalis обитает в кишечнике человека, вызывая нарушение пищеварения и диарею. Инфекция распространяется через загрязнённую воду и продукты. Гигиена и очистка воды — основные методы профилактики.



Известные представители простейших и их особенности



01 Амёба протей — образец изменчивости

Свободноживущая амёба протей имеет аморфное тело, активно меняющее форму. Использует ложноножки для передвижения и фагоцитоза, демонстрируя высокую адаптивность в пресноводных средах.



02 Инфузория туфелька — ресничная сила

Туфелька покрыта многочисленными ресничками, которые обеспечивают плавное движение и поток воды к клеточному рту. Двухъядерность поддерживает сложные функции жизнедеятельности.



03 Эвглена зелёная с фотосинтезом

Эвглена обладает жгутиком для движения и глазком для ориентирования в свете. Хлоропласты позволяют проводить фотосинтез, объединяя особенности животных и растений.



04 Малярийный плазмодий — паразит с комплексным циклом

Этот споровик имеет сложный жизненный цикл с чередованием хозяев: комар носитель и человек. Вызывает тяжёлое заболевание, требующее внимательного медицинского контроля.



Значение изучения простейших и перспективы

Простейшие — ключевые организмы экосистем и медицины. Их изучение помогает решать экологические и здравоохранительные задачи, а новые технологии углубляют понимание их биологии и потенциала.