



Комплексный обзор суточных и сезонных изменений биогеоценозов


Изучение ритмов биогеоценозов и их влияния
на природу и человека.



- Понятие и историческая значимость биogeоценозов



Биogeоценоз объединяет живые организмы и окружающую среду, взаимодействующие на определённой территории. Термин введён В. Н. Сукачёвым в 1942 году для описания устойчивых природных сообществ, что стало ключом к развитию экологии и рационального природопользования.



- Причины суточных и сезонных изменений в природе

Суточные изменения связаны с вращением Земли, вызывающим смену дня и ночи и связанные колебания температуры и освещения.

Сезонные изменения обусловлены движением Земли вокруг Солнца и наклоном оси, формирующим время года и длительность светового дня.

Эти природные циклы влияют на доступность ресурсов и условия обитания для растений и животных, регулируя биоритмы экосистем.

Суточные колебания ключевых параметров биогеоценоза



Температурные изменения в течение суток

На открытых пространствах температура может изменяться до 15°C , достигая пика днём и падения ночью. Эти колебания влияют на жизнедеятельность организмов и физико-химические процессы.



Вариации влажности подстилки и воздуха

Влажность достигает максимума ночью из-за пониженного испарения и снижения температуры, а днём уменьшается, создавая разные условия для микроорганизмов и растений.



Фотосинтез и дыхание растений

Основная активность фотосинтеза приходится на период с 10 до 16 часов, в ночное время процесс заменяется дыханием, что отражает суточный ритм обмена веществ у растений.

● Поведение животных в зависимости от суточного ритма



Активность ночных животных

Совы и ежи проявляют активность преимущественно в ночное и сумеречное время, используя низкую освещённость для охоты и защиты от хищников.



Дневные виды и их особенности

Бабочки и певчие птицы ведут активный образ жизни в светлое время суток, используя дневное тепло и свет для питания и размножения.



Влияние внешних факторов на насекомых

Температура и влажность регулируют время выхода насекомых из убежищ, что является важным механизмом адаптации к изменяющимся условиям среды.

● Ключевые признаки и проявления сезонных изменений



Изменение продолжительности светового дня

На широте Москвы световой день варьируется от 7 до 17,5 часов в году, что оказывает решающее влияние на физиологию и поведение организмов.



Температурные различия между сезонами

Зимой температура воздуха и почвы может опускаться до -30°C , а летом подниматься до $+30^{\circ}\text{C}$, меняя условия обитания и биохимические процессы.



Сезонные биологические циклы

У животных проявляются периоды размножения и покоя, у растений — листопад и цветение, обусловленные изменениями климатических факторов.

- Роль фотопериода в физиологии растений

Фотопериод регулирует начало цветения и плодоношения; например, флоксы начинают цвести при длительности дня свыше 14 часов.

Листопад является ответом лиственных деревьев на сокращение светового дня, что помогает подготовиться к зимнему периоду.

У некоторых сельскохозяйственных культур даже изменение длины дня на 1–2 часа вызывает смещение фаз роста, влияя на урожай.

Знания о фотопериодизме применяются для точного планирования агротехнических мероприятий и повышения эффективности растениеводства.

• Суточные и сезонные циклы климата





Диаграмма отражает важные климатические особенности умеренной зоны с значительной вариацией температуры и длины светового дня.

Изменения температуры и продолжительности дня существенно влияют на жизненные циклы организмов в данной зоне.

Данные Росгидромета, 2023

● Городской биогеоценоз: особенности суточной активности



Повышенная вокальная активность птиц на рассвете

В городской среде птицы усиливают пение на рассвете, реагируя на шум и освещение, что связано с конкуренцией за территорию и привлечение партнёров.



Ночная активность млекопитающих

Ночью возле мусорных контейнеров активизируются крысы и другие мелкие млекопитающие, использующие антропогенный ресурс для питания.



Влияние искусственного освещения

Искусственные источники света создают иллюзию дневного времени, что меняет поведение насекомых и затрудняет рост растений, нарушая естественные циклы.

● Сезонные изменения в лесных экосистемах



Весенний и летний рост живой массы

В лесах активизируется рост зелёных растений, усиливается размножение птиц и млекопитающих, обеспечивая максимальную биологическую продуктивность.



Осенний листопад и подготовка к зимнему периоду

Начало листопада у деревьев сопровождается физиологическими изменениями, позволяющими растениям экономить ресурсы для зимовки.



Зимняя активность организмов

Зимой наблюдается снижение активности животных, миграция птиц на юг и впадение в спячку у ряда видов, что обеспечивает выживание в суровых условиях.

● Сезонные изменения в степных биогеоценозах



Весеннее пробуждение степи

Весной в степи появляются многочисленные эфемерные растения, которые быстро прорастают и цветут, используя короткий период увлажнения. Одновременно активизируется разнообразная фауна беспозвоночных, поддерживая пищевую цепь и способствуя опылению.



Максимальная активность летом

Летом степь достигает пика биомассы, что создаёт богатую кормовую базу для копытных животных и насекомых. В это время происходит активное размножение многих видов, формируются устойчивые экосистемные связи между организмами.



Осенние и зимние процессы

Осенью большинство трав усыхает, начинается массовая миграция птиц на юг. Зимой многие животные впадают в состояние спячки или анабиоза, что позволяет им выживать в условиях пониженных температур и дефицита пищи.

● Сезонные изменения в болотных биогеоценозах



Весенний подъём воды и
возрождение жизни

С наступлением весны таяние снега вызывает увеличение уровня воды в болотах. В это время перелётные водоплавающие птицы возвращаются для гнездования, что запускает новую волну биоразнообразия и активности.



Лето — время фотосинтеза и
биоактивности

Летом в болотах преобладают процессы фотосинтеза, усиливается жизнь лягушек и многочисленных насекомых. Болотная флора активно развивается, поддерживая сложные пищевые сети и обеспечивая кислородное насыщение водной среды.



Осенний спад и зимний покой

Осенью уровень воды в болотах понижается, метаболизм организмов снижается. Зимой биологические процессы почти полностью останавливаются из-за низких температур и ледяной корки, создавая условия для зимовки многих видов.

● Сезонные изменения в водных биогеоценозах



Весенняя и осенняя циркуляция воды

В весенний и осенний периоды происходит перемешивание водных слоёв, что способствует равномерному распределению кислорода и питательных веществ по всему объёму водоёма, поддерживая жизнедеятельность организмов.



Летняя стратификация и её последствия

Летом водоёмы стратифицируются: тёплый слой формируется сверху, холодный — снизу. В придонных слоях недостаток кислорода ограничивает активность организмов, что особенно заметно в глубоководных экосистемах.



Зимний покой и адаптация рыб

Зимой водная поверхность покрывается льдом, замедляя жизненные процессы в водоёмах. Многие виды рыб переходят в состояние зимней спячки, замедляя обмен веществ для выживания в холодных условиях.

● Сравнительная таблица: суточные и сезонные изменения

Таблица сравнения основных параметров, отражающих отличие суточных и сезонных изменений в биогеоценозах.

Сезонные изменения оказывают более глубокое влияние на развитие и поведение видов по сравнению с суточными ритмами, обуславливая смену фаз жизненного цикла.

Параметр	Суточные изменения	Сезонные изменения
Температура	5–15°C в сутки	40–50°C в год
Световой режим	день/ночь	длинные/короткие дни
Влажность	резкие колебания	постепенные изменения
Активность растений	пик днём	рост весной, спад зимой
Животные	активность ночь/день	миграции, спячка, размножение

Данные основаны на исследовании климатических и биологических условий умеренной зоны

Влияние климата на динамику изменений в биогеоценозах

Климатический режим формирует особенности длительности и выраженности суточных и сезонных биоритмов. В тропиках сезонные колебания слабы, что обеспечивает относительно стабильные условия для жизни.

Умеренная зона характеризуется значительными годовыми перепадами температуры до 60°C, что формирует ярко выраженные сезонные изменения, влияющие на жизненные циклы растений и животных.



• Влияние деятельности человека на суточные и сезонные ритмы биогеоценозов

Антропогенные факторы, такие как вырубка лесов и распашка земель, нарушают естественные ритмы, изменяя гидрологические и температурные условия экосистем.

Искусственное освещение и урбанизация искажают суточные циклы активности живых организмов, уменьшая биоразнообразие и сбивая природные механизмы адаптации.



Влияние глобального изменения климата на биоценоотические ритмы



● Практическое значение знаний о ритмах биогеоценозов

- 1 Знание биоритмов позволяет оптимизировать сроки посева и сбора урожая, повышая продуктивность сельского хозяйства и снижая потери культуры.
- 2 Биологические циклы важны для контроля численности вредителей, что способствует снижению использования пестицидов и сохранению экосистем.
- 3 Ведение лесного и рыбного хозяйства с учётом сезонных ритмов обеспечивает устойчивое использование природных ресурсов и поддержание биоразнообразия.

• Современные методы исследования изменений в экосистемах

1

Дистанционное зондирование обеспечивает спутниковый мониторинг растительности и водных ресурсов с высокой точностью и регулярностью.

2

Автоматизированные биоклиматические станции фиксируют параметры среды и биологическую активность, позволяя анализировать динамические процессы в режиме реального времени.


3

Использование фотоловушек и сенсоров помогает отслеживать поведение и численность животных без человеческого вмешательства.

4

Экспериментальные лабораторные исследования позволяют моделировать влияние различных факторов на рост растений и поведение организмов, способствуя пониманию механизмов экосистем.

● Важность изучения биоритмов для устойчивости природы



Исследование суточных и сезонных ритмов способствует сохранению экосистем, помогает сбалансировать природопользование и формирует экологическую культуру у молодого поколения.

