




Клеточный цикл: ключевой процесс жизни клетки

Последовательные стадии роста,
синтеза ДНК и деления обеспечивают
жизнь клеток.



История изучения клеточного цикла

В XIX веке изучение клеточного деления начало свой путь с открытий Вирхова и Гертвига. В XX веке применение меченых изотопов позволило измерить длительность и фазность клеточного цикла.



Структурные компоненты жизненного цикла клетки



Интерфаза: подготовка к делению

Интерфаза включает три стадии: G1 — рост и подготовка, S — синтез ДНК, G2 — завершающая подготовка к митозу. Этот период занимает большую часть клеточного цикла.



Митотическая фаза: деление клетки

Митотическая фаза состоит из митоза — деления ядра, и цитокинеза — разделения цитоплазмы на две дочерние клетки, завершая процесс клеточного размножения.



Интерфаза: этапы подготовки клетки к делению

Фаза G1 — период интенсивного роста, активного метаболизма и синтеза белков, необходимых для дальнейшей репликации ДНК.

В фазе S происходит удвоение всего генетического материала клетки с одновременным синтезом гистонов и других ядерных белков.

Фаза G2 характеризуется контролем целостности реплицированной ДНК и подготовкой клеточных структур, таких как веретено деления, к митозу.


Тщательное завершение интерфазы критически важно для успешного и точного деления клетки, предотвращая генетические ошибки.

Продолжительность фаз клеточного цикла у эукариот

Интерфаза занимает значительно больше времени, чем митоз, обеспечивая тщательную подготовку к делению.



Данные подтверждают, что ключевые процессы, связанные с ростом и репликацией, требуют длительного времени по сравнению с самим делением клетки.



Исследования клеток человека и млекопитающих, 2022

Первая промежуточная фаза: G1

Активный синтез белков и формирование новых органелл обеспечивают рост цитоплазмы и подготовку к DNA-репликации.


Клетка анализирует внутренние ресурсы и внешние сигналы, принимая решение о переходе в фазу S или выходе в состояние покоя.

Восстановление энергетического баланса и накопление АТФ необходимы для поддержки интенсивных процессов деления.


Фаза S: удвоение наследственного материала



В течение S-фазы происходит репликация ядра, образуя идентичные сестринские хроматиды для каждой хромосомы.



Процесс репликации строго регламентирован, чтобы предотвратить ошибки и гарантировать точное копирование генетической информации.



Одновременно синтезируются гистоны — белки, обеспечивающие упаковку и структурирование вновь образованной ДНК.



Точная координация синтеза ДНК и белков ядра критична для дальнейшего нормального деления клетки.

Вторая промежуточная фаза: G2

Завершается синтез белков, необходимых для структур митотического аппарата и регуляции начала деления.



Продолжается рост органелл и накопление запасов энергии для подготовки к энергозатратному митозу.




Клетка осуществляет контроль целостности ДНК, исправляя возможные повреждения перед переходом в митоз.



Схема клеточного цикла с контрольными точками

Источник: Обзор Campbell, «Биология», 2021



Митоз: этапы деления ядра

Профаза начинается с конденсации хромосом и расхождения центриолей к полюсам клетки.

Метафаза характеризуется выстраиванием хромосом по экватору клетки на метафазной пластинке.


В анафазе сестринские хроматиды размыкаются и перемещаются к противоположным полюсам клетки.

Телофаза сопровождается формированием новых ядерных оболочек и деконденсацией хроматина для подготовки к цитокинезу.

Разновидности цитокинеза в клетках животных и растений

1 Цитокинез у животных: механизм формирования борозды

В животных клетках цитокинез начинается с образования борозды перетяжки, которая сжимается благодаря актин-миозиновому кольцу. Это приводит к равному разделению цитоплазмы и образованию двух самостоятельных дочерних клеток.



2 Цитокинез у растений: формирование клеточной пластинки

У растительных клеток цитокинез происходит через создание клеточной пластинки посередине клетки. Эта структура формируется из везикул, доставляющих компоненты клеточной стенки, что обеспечивает отделение дочерних клеток прочной перегородкой.



Фаза G0: функциональная дифференцировка и покой

В фазу G0 клетки временно или постоянно выходят из клеточного цикла, прекращая деление, но сохраняя жизненно важные функции и метаболическую активность.



Нейроны, клетки печени и мышечные волокна чаще всего находятся в фазе G0, что отражает их специализированные функции и снижение потребности в делении.




Фаза G0 обеспечивает поддержание стабильности тканей, предотвращая избыточную пролиферацию и позволяя клеткам адаптироваться к физиологическим требованиям организма.




Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла



Циклозависимые киназы (CDK) активируются в комплексе с циклонами, обеспечивая переход между фазами клеточного цикла.



Регуляция клеточного цикла включает системы обратной связи, позволяющие останавливать цикл при повреждении ДНК или нарушениях внутреннего гомеостаза.



Уровень и активность циклин-зависимых комплексов строго контролируется различными факторингами и ингибиторами для предотвращения ошибок деления.



Молекулярные сенсоры обеспечивают своевременную активацию репликации и митоза, гарантируя генетическую стабильность при передаче наследственного материала.

Локализация и функции ключевых контрольных пунктов клеточного цикла

Контрольный пункт	Расположение	Функция
G1/S	Переход из G1 в S	Оценка размеров клетки, проверка целостности ДНК
G2/M	Переход из G2 в митоз	Контроль полной репликации ДНК и выявление повреждений
Митотический контроль	Метафаза митоза	Обеспечение правильного прикрепления хромосом к веретену деления



Основные контрольные пункты клеточного цикла обеспечивают проверку готовности клетки к переходу на следующий этап и предотвращают некорректное деление.

Эти контрольные пункты являются критическими для поддержания генетической стабильности и предотвращения патологий клеточного деления.

Генетический контроль клеточного цикла: роль супрессоров и онкогенов

Гены-супрессоры, как p53 и Rb, тормозят прогрессию клеточного цикла при обнаружении повреждений, обеспечивая время для ремонта ДНК или активацию апоптоза.

Онкогены, включая Ras и Мус, стимулируют деление клетки, способствуя быстрому росту и пролиферации, что при неправильной регуляции ведёт к онкологии.

Мутации в этих генах нарушают баланс контроля и регулируют неисправное деление, что является ключевым фактором в развитии опухолевых процессов.

Апоптоз как защитный механизм от нарушений клеточного цикла


Апоптоз активируется при невозможности исправления повреждений ДНК, предотвращая распространение дефектного генетического материала.

Этот процесс программирует клеточную гибель через каспазный каскад, что важно для удаления потенциально опасных клеток из ткани.

Апоптоз поддерживает гомеостаз и здоровье тканей, исключая излишнюю пролиферацию и формирование опухолей.

Регулярное функционирование апоптоза является ключом для предотвращения заболеваний, связанных с дисрегуляцией клеточного цикла.

Клеточный цикл в развитии и регенерации организма



Роль клеточного цикла в эмбриогенезе

На стадии зиготы и в ходе эмбрионального развития происходит интенсивное деление клеток, обеспечивающее формирование всех тканей и органов. Этот процесс требует точного регулирования циклов для правильного распределения генетической информации.



Обновление тканей у взрослого организма

Взрослые организмы поддерживают жизнеспособность тканей через процессы регенерации, где деление клеток эпителия, костного мозга и зародышевых клеток способствует восстановлению и ремонту повреждений.

Применение знаний о клеточном цикле в медицине и биотехнологии

Разработка химиотерапии базируется на нарушении клеточного цикла в опухолевых клетках, позволяя избирательно подавлять их пролиферацию.



Методы клонирования и контроль стволовых клеток зависят от умения управлять этапами клеточного цикла для поддержания их потенциала дифференцировки.



Современные технологии искусственной регенерации тканей включают манипуляции с клеточным циклом для повышения эффективности заживления и восстановления органов.



Заболевания, связанные с нарушениями клеточного цикла

Клеточные сбои приводят к различным патологиям, преимущественно к раковым заболеваниям, отражая критическую роль регуляции деления в здоровье.

Большинство патологий обусловлено нарушением клеточного цикла, особенно чрезмерной пролиферацией, что подчёркивает необходимость контроля регуляторных механизмов.



Медицинские исследования, 2022



Клеточный цикл: фундамент жизни и перспектива медицины будущего

Клеточный цикл обеспечивает жизнедеятельность и восстановление организма. Современные исследования открывают новые пути терапии, направленные на исправление нарушений и создание биотехнологических инноваций.

