


Краткий обзор: естественные сообщества и биогеоценозы

Естественные сообщества — основа биосферы, их структура и роль в устойчивости планеты.



Истоки и развитие понятий в экологической науке

С XIX века концепции естественных сообществ формировались в трудах ученых. В 1942 году В.Н. Сукачёв предложил термин «биогеоценоз», объединяющий живые организмы и среду. XXI век усилил интерес из-за экологического кризиса и важности исследований устойчивости природных систем.



Структура и основные компоненты биогеоценоза

1

Биогеоценоз состоит из совокупности живых организмов — растений, животных, микроорганизмов и грибов — взаимодействующих на конкретной территории с абиотической средой.

2

Абиотическая среда включает типы почв, воды, воздуха, а также климатические и географические условия, создающие уникальный биотоп для сообщества.

3

Внутренние процессы основываются на обмене веществ и энергии между организмами и средой через питание, разложение и физиологические связи.

4

Характерны устойчивость экосистемы, общее развитие с историческим прошлым, а также чёткие пространственные границы, отделяющие биогеоценозы друг от друга.

Биоценоз: уровни организации и трофические группы

1

Биоценоз объединяет все живые виды на территории, разделяясь на продуцентов, консументов и редуцентов, играющих ключевые экологические роли.

2

Продуценты — растения и фотосинтезирующие организмы, создающие органическую материю из неорганических соединений для всей системы.

3


Консументы и редуценты обеспечивают передачу и возвращение веществ, поддерживая баланс и функциональную устойчивость всего сообщества.

Роль биотопа в формировании сообщества




Почвенно-грунтовые условия

Тип и качество почвы формируют основу для видов растений и микробов, влияя на весь биоценоз и его продуктивность.




Водный режим

Наличие и движение воды определяют влажность, обитание водных организмов и биоразнообразие экосистемы.








Освещённость и температура

Условия освещения и климатические параметры регулируют фотосинтез и сезонную активность организмов.






Обратное влияние организмов

Живые организмы влияют на характеристики биотопа, изменяя почву и микроклимат своей жизнедеятельностью.



Поток энергии и круговорот веществ в биогеоценозах



Поглощение солнечной энергии растениями

Основной источник энергии — солнце, поглощаемое продуцентами для синтеза органических веществ, служащих пищей для всех остальных уровней экосистемы.



Перенос энергии через трофические уровни

Энергия передаётся по цепям: от травоядных к хищникам, обеспечивая жизнедеятельность и деятельность всех организмов сообщества.




Разложение и возвращение веществ в природу

Редуценты разлагают органические остатки, возвращая элементы в почву и атмосферу, что замыкает кругооборот и поддерживает плодородие.



Взаимосвязь компонентов

Поток энергии и обмен веществ объединяют растения, животных и микроорганизмы, создавая стабильную, устойчивую систему.



Пищевые цепи и их роль в устойчивости экосистем



Наземные цепи питания

Пример: трава, кузнечик, лягушка, змея, еж демонстрирует передачу энергии и вещества сквозь несколько уровней живых организмов.



Водные экосистемы в действии


Пищевые цепи водоёмов включают водоросли, дафний, мелких рыб и щуку, формируя основу питания и поддержания популяций.




Стабилизация экосистемы через цепи

Разнообразные цепи создают структуру, позволяющую поддерживать баланс и динамическое равновесие в биогеоценозах.


Передача энергии по трофическим уровням: количественные оценки




Только часть энергии, полученной продуцентами, достигает высших уровней, остальное теряется в виде тепла и метаболических процессов.




Уменьшение энергии с каждым уровнем приводит к уменьшению биомассы и плотности организмов на верхних трофических ступенях.



Значение почвы в биogeоценозах



Свойства почвы, такие как плодородие, кислотность и влажность, влияют на развитие растительно-животных сообществ и климаксные процессы экосистем.



Чернозёмы отличаются высоким содержанием гумуса, обеспечивая богатство степей, в то время как подзолы и торфяники создают специфические условия для таёжных и болотных биogeоценозов.




Типы биogeоценозов России: обзор и характеристики

Наземные экосистемы

Россия представлена разнообразными наземными биogeоценозами: леса с хвойными и лиственными породами, бескрайние степи, суровые тундры и обширные болота с уникальной флорой и фауной.

Водные экосистемы

В водных биogeоценозах преобладают разнообразные пресноводные и морские системы с богатым видом живых организмов, сильно зависящих от качества среды и сезонных изменений.



Лесные биогеоценозы: структура и функции

Многоярусная растительная структура


Лесные биогеоценозы характеризуются несколькими ярусами растительности: высокие деревья (ель, сосна, дуб), кустарники (рябина, шиповник), травянистый и моховой покров. Такая структура обеспечивает разнообразие микорукет и условий для разных видов.

Фауна и круговорот веществ

Типичная фауна включает хищников и травоядных, например волка и кабана. Медленное разложение органики и активная роль грибов и бактерий поддерживают устойчивый круговорот питательных веществ в экосистеме.



Степные биогеоценозы: особенности состава и адаптации




Особенности растительности степей

В степных биогеоценозах доминируют травянистые растения, такие как ковыль и типчак. Отсутствие древесного яруса связано с климатическими условиями. Растения обладают адаптациями, например, засухоустойчивостью, что позволяет им выживать в жарких и сухих условиях.

Животный мир и приспособления

Множество мелких млекопитающих, включая сусликов и степных хорьков, населяют степи. Обитатели ведут роющий образ жизни, что помогает им сохранять влагу и избегать хищников. Степи важны для сельского севооборота и поддержания плодородия почвы.



Водные биогеоценозы: типы и динамика экосистем



Различия между пресноводными и морскими экосистемами

Пресноводные и солёные биогеоценозы имеют различный состав организмов и условия среды. Пресноводные системы характеризуются особыми видами рыб и растений, тогда как морские содержат более разнообразный планктон и нектон.



Основные группы организмов водных экосистем

Водные экосистемы включают планктон — микроскопические организмы, бентос — обитателей донных слоёв, и нектон — подвижных животных. Эти группы взаимосвязаны, формируя сложные пищевые сети.



Динамичность и чувствительность водных систем

Водные биогеоценозы быстро меняются из-за постоянного обновления среды обитания. Они особо уязвимы к загрязнению и антропогенным воздействиям, что требует внимательного мониторинга и защиты.

Антропогенное воздействие на биogeоценозы: современные вызовы

1


Вырубка лесов и распашка степей приводят к потере местообитаний, а осушение болот снижает водный резерват биogeоценозов. Загрязнение водоемов химикатами подрывает здоровье экосистем и их биоразнообразие.



2

Экологические последствия включают сокращение численности редких видов и нарушение круговорота веществ. Массовое исчезновение степных животных и снижение рыбных ресурсов в российских реках ярко демонстрируют эти угрозы.

Кейс: восстановление болотных биогеоценозов в России





Искусственное увлажнение болот

В Московской области реализован проект по искусственному увлажнению истощённых болот. Благодаря мероприятиям повысился уровень грунтовых вод и улучшились условия для жизнедеятельности характерных болотных растений.

Реабилитация биоценоза и её результаты

С 2020 года наблюдается восстановление популяций сфагновых мхов, а также увеличение численности журавлей и амфибий. Эти изменения улучшают качество воды и содействуют сохранению редких видов, увеличивая экологическую ценность территории.





150

видов сосудистых растений обнаружено в смешанных лесах европейской части России, что демонстрирует богатство флоры и её вклад в биологическое разнообразие.

В смешанных лесах насчитывается свыше 150 видов сосудистых растений и около 200 видов позвоночных животных, что способствует экосистемной устойчивости и адаптивности к внешним стрессам.

Национальный экологический мониторинг, 2023

Пищевые сети: сложность и роль во взаимодействиях

1

Пищевые сети отображают сложные взаимодействия, где один организм может служить пищей для нескольких хищников и одновременно питаться разными добычами, обеспечивая гибкость системы.

2






Например, ёж питается насекомыми, ягодами и мелкими грызунами, что повышает его адаптивность и поддерживает разнообразие источников питания внутри биогеоценоза.

3

Разветвлённость пищевых сетей предотвращает колебания популяций при потере одного из видов, обеспечивая стабильность и целостность всей экосистемы.

4

Такая многомерность связей повышает устойчивость систем к внешним воздействиям, минимизируя угрозы резких нарушений структуры биогеоценоза.



Факторы дестабилизации и угрозы для биогеоценозов

1

Исчезновение ключевых видов, например бобра и волка, нарушает равновесие и снижает функциональную сложность экосистем, приводя к деградации среды обитания.


2

Введение инвазивных видов, таких как борщевик и енотовидная собака, изменяет местные пищевые сети и конкуренцию, что негативно сказывается на коренных биоценозах.


3

Загрязнения и экологические катастрофы вызывают массовую гибель организмов и сокращают естественные экологические услуги, ухудшая качество жизни человека и природы.

Стратегии сохранения биогеоценозов и участие общества



Создание заповедников и национальных парков, включая Байкальский и Центрально-Лесной, обеспечивает долгосрочную охрану экосистем и их биологического разнообразия.



Экологическое просвещение и программы для школьников, такие как «Зеленые школы», а также системный мониторинг помогают вовлечь общество в защиту природы и восстановление нарушенных территорий.



Значение изучения биogeоценозов для будущего

Изучение биogeоценозов раскрывает ключевые механизмы экологической устойчивости и показывает, как сохранить природное равновесие. Осознанное природопользование и охрана биоразнообразия — залог гармоничного сосуществования человека и природы.

