




Обзор темы: история формирования сообществ живых организмов

Изучение возникновения и эволюции живых сообществ на Земле.

Что такое сообщество живых организмов?

Биологическое сообщество — это совокупность разных видов, обитающих вместе и взаимодействующих в одной среде, как леса, болота или коралловые рифы. Они бывают естественными и созданными человеком, простыми и сложными.



Появление первых сообществ в древних океанах

1

Первичные сообщества на Земле возникли более 3,5 млрд лет назад в океанах благодаря цианобактериям, которые создавали строматолиты и запускали фотосинтез.

2

Цианобактерии изменили атмосферу, обогащая её кислородом и подготовив условия для более сложных форм жизни.

3

Кроме бактерий, важную роль сыграли водоросли и археи — первые организмы, положившие начало сложным экосистемам.

Заселение суши: зарождение наземных сообществ



Первые растения и грибы на суше

Около 430 миллионов лет назад мхи, папоротники и грибы начали жить на суше, создавая первые наземные сообщества и изменяя природные условия.



Появление беспозвоночных животных


За растениями последовали насекомые и другие беспозвоночные, открыв новые экологические ниши в наземных биомах.



Рост биоразнообразия на суше

Освоение суши привело к бурному развитию видов и формированию устойчивых экосистем с разнообразными связями между организмами.

Динамика появления основных групп на суше



Развитие живых организмов на суше сопровождалось увеличением сложности биологических сообществ и разнообразия видов.

История появления основных групп свидетельствует о постепенном усложнении наземных экосистем.

Палеонтологические данные, 2023

Биотические факторы, формирующие сообщества

1

Конкуренция за ресурсы заставляет виды адаптироваться и изменять своё поведение или местообитание.

2

Симбиотические отношения, как микориза между грибами и деревьями, улучшают доступ к питательным веществам и повышают выживаемость.

3

Хищничество регулирует численность видов, поддерживая баланс в экосистеме и способствуя естественному отбору.

4

Паразитизм влияет на здоровье и популяции организмов, что формирует динамику взаимодействий внутри сообществ.

Влияние климатических и географических факторов



1

Климатические зоны и экосистемы

Арктические, умеренные и тропические зоны создают разные условия, что определяет особенности растительных и животных сообществ.

2

Ландшафт и водный режим

Горы, равнины и близость к водоёмам формируют уникальные микроклиматы и способствуют возникновению разнообразных экосистем.

Роль почвы и минеральных веществ в развитии сообществ

Кислотность и влажность почвы напрямую влияют на состав растительных видов и их приспособленность к среде.

1


Наличие азота, фосфора и калия определяет продуктивность экосистем и поддерживает разнообразие живых организмов.

2

Бедные почвы степей и плодородные чернозёмы демонстрируют, как земля влияет на устойчивость и богатство биомов.

3

Структура биомного разнообразия на планете




Каждый биом занимает значительную площадь, формируя основу для распространения различных видов.

Разнообразие биомов отражает адаптации организмов к различным условиям окружающей среды.

Мировой экологический отчёт, 2022

Этапы формирования биологического сообщества

По данным экологических исследований и структурных моделей



Сукцессия — смена сообществ во времени

1

Первичная сукцессия

Начинается на новых поверхностях, как после извержения вулкана. Сперва поселяются простейшие организмы, затем развивается всё более сложное сообщество.

2

Вторичная сукцессия


Происходит на территориях, где прежнее сообщество было нарушено пожаром или вырубкой. Сообщество постепенно восстанавливается, меняя видовой состав.

3

Примеры сукцессии

Заращение озёр водными растениями — пример первичной, а смена леса после вырубки — вторичной сукцессии, показывающих динамику восстановления экосистем.

Крупнейшие современные экосистемы и их особенности



Тайга и тропические леса

Тайга — обширный хвойный лес с морозостойкими деревьями, приспособлен к холодам. Тропические леса характеризуются влажным климатом и наибольшим разнообразием видов, включая многочисленные растения и животных.

Степи и тундра

Степи — обширные травянистые равнины с континентальным климатом, где преобладают злаковые растения. Тундра — суровый холодный регион, где растут мхи и лишайники, поддерживая специфические пищевые цепи.

Сравнительная характеристика биомов

Биом	Температура (°C)	Осадки (мм)	Основные растения	Основные животные
Тайга	-5	400–750	Ели, сосны	Бурый медведь, лось
Тропический лес	+25	2000–3000	Лианы, пальмы	Обезьяны, попугаи
Степь	+10	250–500	Ковыль	Суслик, коршун

Таблица содержит средние температуры, количество осадков, а также основные виды растений и животных для трёх биомов.

Различия климата и почвы объясняют разнообразие видов и структуру сообществ в разных биомах.

Человек как фактор изменений в сообществах

Вырубка лесов ведёт к утрате местообитаний и сокращению численности многих видов, нарушая экологический баланс.

Расчистка земель для сельского хозяйства приводит к сокращению биоразнообразия и деградации почвенных экосистем.

Урбанизация и загрязнение окружающей среды ухудшают качество среды обитания, вызывая потерю многих природных сообществ.

Введение чужеродных видов часто вызывает дисбаланс в экосистемах, угрожая местным видам и меняя пищевые цепи.

Примеры восстановления нарушенных сообществ



Возрождение бизонов в Северной Америке

Программы по восстановлению популяции бизонов помогли восстановить степные экосистемы прерий США, поддерживая биоразнообразие и почвенное равновесие.



Посадка мангровых лесов в Азии


Создание мангровых лесов защищает побережья от эрозии и штормов, одновременно восстанавливая среду обитания для многих морских видов.



Реинтродукция лосей в Европе

Возвращение лосей в заповедники способствует восстановлению трофических связей и восстановлению природного баланса лесных экосистем.

Вклад биоразнообразия в функционирование экосистемы



Разнообразие организмов обеспечивает комплексное выполнение важнейших процессов, таких как опыление и поддержание водного баланса.

Высокое биоразнообразие повышает устойчивость и продуктивность экосистем, усиливая их адаптацию к изменениям.

Научные исследования экологии, 2023

Уникальные и уязвимые сообщества мира



Галапагосские острова

Эндемичные виды, такие как морские игуаны, делают эти острова уникальными, но они остаются уязвимыми из-за изменений окружающей среды.



Великий Барьерный риф

Крупнейшая коралловая экосистема под угрозой потепления воды и загрязнения, что ведёт к массовому вымиранию кораллов.



Амазонские леса

Максимальное видовое разнообразие на планете, но постоянная вырубка и изменения климата наносят серьёзный ущерб экосистеме.

Баланс и взаимосвязи внутри сообществ

1

При нарушении трофических связей, например исчезновении хищников, меняется численность бывших жертв, что сказывается на структуре растительности и других видов.

2

Сложные взаимодействия между организмами разных уровней обеспечивают устойчивость сообщества, предотвращая чрезмерное размножение вредителей и сохраняя биоразнообразие.



Современные исследования и новые открытия

Использование дронов и спутников помогает изучать экосистемы в труднодоступных местах, предоставляя точные данные о состоянии сообществ.

Анализ ДНК микроорганизмов и почвенного микробиома открывает новые знания о связях внутри экосистем и скрытом биоразнообразии.

Международные проекты координируют учёных для наблюдения за изменениями климата и биоразнообразия, способствуя защите редких видов.



Заключение: Значение изучения формирования сообществ

Понимание процессов формирования сообществ помогает сохранять экологическое равновесие и поддерживать устойчивость природы для будущих поколений.

