

Эволюция органического мира: от первых клеток до современного биоразнообразия

Путь жизни на Земле длился миллиарды лет
и изменил планету.



Как ученые восстанавливают историю жизни

Историю эволюции изучают по ископаемым, строению организмов, ДНК, эмбриональному развитию и следам древних экосистем. Эти данные позволяют не только увидеть смену форм, но и понять родство живых организмов.



Первые формы жизни и господство прокариот

Простейшие организмы

Самые ранние живые формы были одноклеточными, без ядра и сложных органоидов. Они существовали в бескислородной среде и получали энергию из простых химических реакций.


Роль бактерий и архей

В древней биосфере именно прокариоты определяли круговорот веществ и поддерживали основные биохимические процессы. Их разнообразие заложило фундамент для дальнейшей эволюции жизни.

Кислородный фотосинтез

Цианобактерии первыми начали выделять кислород в ходе фотосинтеза. Это привело к накоплению кислорода в атмосфере и сделало возможным появление многих новых типов организмов.

Основные этапы эволюции по геологическому времени



Учебная хронология эволюции и геологическая шкала времени; справочные оценки дат событий.

На шкале видна неравномерность эволюции: долгие периоды накопления изменений сменялись резкими биосферными перестройками.

Крупные инновации возникали скачкообразно и часто совпадали с изменениями среды и кризисами.

Кембрийский взрыв: как моря стали ареной эволюционного скачка

Мир, который вдруг стал сложнее

В раннем кембрии морские сообщества быстро усложнились: рядом с мягкотелыми формами появились животные с панцирями, шипами и другими твердыми структурами. Они лучше сохранялись в осадках, поэтому именно этот период особенно хорошо виден в ископаемой летописи.




Трилобиты и древние хищники

Трилобиты стали одними из самых узнаваемых обитателей кембрийских морей. Рядом с ними существовали активные хищники, чье появление усилило борьбу за выживание и ускорило развитие защитных приспособлений у добычи.




Новые ниши и рост разнообразия

Расширение экологических ниш, повышение содержания кислорода и усложнение пищевых связей создали условия для быстрого появления новых групп. Кембрийский взрыв показал, как изменения среды способны резко ускорить эволюцию.



Как возникают эволюционные изменения

Схема показывает, как наследственная изменчивость и изоляция приводят к образованию новых видов.



Выход жизни на сушу

Первые наземные растения

Сначала сушу освоили растения. Их покровы защищали от высыхания, а опорные ткани помогали удерживать тело в воздушной среде и использовать солнечный свет эффективнее.

Почвы и первичные экосистемы

Растения изменили поверхность суши, способствовали формированию почв и создали основу для первых наземных пищевых цепей. Без этого не могло бы возникнуть устойчивое сообщество наземных организмов.

Наземные беспозвоночные и позвоночные

Затем на суше появились животные, которые постепенно приспосабливались к дыханию воздухом, передвижению по твердому субстрату и защите от высыхания. Освоение среды шло поэтапно.

Сложные наземные биомы

В дальнейшем сформировались высокопродуктивные леса, степи и другие наземные экосистемы. Они стали центрами разнообразия и ускорили специализацию организмов по различным условиям жизни.

Крупные ароморфозы и их значение в эволюции

Ароморфоз	Пример	Значение
Фотосинтез	Цианобактерии, растения	Кислород и органика
Ядро и органоиды	Эукариоты	Усложнение клетки
Семя и цветок	Семенные растения	Независимость от воды
Теплокровность	Птицы, млекопитающие	Активность в холоде

Обобщение школьного курса биологии: основные ароморфозы живых организмов.

Ароморфозы повышали уровень организации живых систем и открывали доступ к новым средам обитания.

Ключевые новшества не просто добавляли признаки, а расширяли возможности выживания, расселения и освоения новых экологических ниш.

Эра рептилий и разнообразие динозавров

Ведущая группа суши

В мезозое пресмыкающиеся заняли доминирующее положение среди наземных позвоночных. Их успех был связан с эффективной защитой от высыхания, внутренним оплодотворением и разнообразием способов передвижения.

Динозавры в трех периодах

Триас, юра и мел — время расцвета динозавров. Среди них были гигантские растительноядные формы, быстрые хищники и виды, приспособленные к разным условиям среды и типам питания.


Первые птицы и млекопитающие

Параллельно с динозаврами развивались ранние птицы и мелкие млекопитающие. Долгое время они оставались второстепенными группами, но именно тогда закладывались их будущие эволюционные успехи.



Массовые вымирания и перестройка биосферы

Ордовикское Девонское Пермское Триасовое
Меловое



Обобщенные данные палеонтологии; доли на диаграмме условные и служат для сравнения масштаба кризисов.

Даже крупнейшие кризисы не останавливали жизнь: после них биосфера быстро перестраивалась и заполняла освободившиеся экологические ниши.

Самое сильное вымирание произошло в конце перми; именно масштаб потерь определял глубину последующей эволюционной перестройки.

Ключевые преимущества млекопитающих



Постоянная температура тела

Теплокровность позволила млекопитающим сохранять активность независимо от внешних колебаний температуры. Это расширило их ареалы и сделало возможным освоение холодных и сезонно изменчивых климатов.



Забота о потомстве

Вынашивание, вскармливание молоком и длительная родительская опека повышали выживаемость детёнышей. Благодаря этому потомство лучше переживало неблагоприятные условия и быстрее включалось в жизнь популяции.



Разнообразие способов питания

Дифференцированные зубы и подвижные челюсти помогали использовать разные источники пищи: от насекомых и травы до семян и мяса. Это усиливало конкуренцию и способствовало специализации групп.



Освоение разных сред

Млекопитающие заняли сушу, воду и воздушное пространство в форме летучих видов. Такая экологическая гибкость позволила им быстро занять освободившиеся ниши после вымирания динозавров.

Основные группы позвоночных


Группа	Размножение	Среда
Рыбы	икрометание, наружное	вода
Земноводные	икрометание, вода нужна	вода и суша
Пресмыкающиеся	внутреннее, яйца	преимущественно суша
Птицы и млекопитающие	яйца / живорождение	суша, воздух, вода

Сопоставление показывает, как при переходе к суше усложнялись размножение, покровы и способы поддержания температуры тела.

Чем дальше от водной среды, тем совершеннее становятся покровы, дыхание и способы размножения. Это отражает общий ход адаптации к жизни на суше.

Как формируется новый вид

Схема отражает общий механизм видообразования при географической или экологической изоляции популяций.




66 млн лет назад

Этот рубеж отделяет мир доминирования динозавров от эпохи, в которой появились условия для широкого расцвета млекопитающих и дальнейшего становления человека.

после этого рубежа
млекопитающие получили
пространство для бурного
разнообразия, а линия приматов
продолжила собственную
эволюцию.

Граница мела и палеогена; данные палеонтологии
и геохронологии

Рост разнообразия жизни в фанерозое



На графике видны не только общая тенденция к росту, но и резкие просадки, совпадающие с массовыми вымираниями и перестройкой экосистем.

Разнообразие увеличивалось скачками: кризисы сокращали число видов, а затем освобождали экологические ниши для новой радиации.

Обобщение по палеонтологическим данным о биоразнообразии фанерозоя

Как растения изменили биосферу

1. Кислород и климат

Фотосинтезирующие растения увеличили содержание кислорода и снизили долю углекислого газа в атмосфере. Это изменило газовый состав среды и создало условия для более сложной жизни.

2. Основа наземных экосистем

Растения стали первичными продуцентами на суше и запустили новые пищевые цепи. Без этого перехода наземные экосистемы не получили бы устойчивой энергетической базы.

3. Каменноугольные леса

Обширные леса из древних папоротников, хвощей и других растений накапливали органическое вещество. Их остатки в дальнейшем стали источником залежей угля и повлияли на климатические процессы.



Эволюция наблюдается и сегодня

Устойчивость к препаратам

У бактерий быстро возникают наследственные варианты, которые переживают действие антибиотиков. В результате в популяции растёт доля устойчивых форм, и лечение становится менее эффективным.

Приспособление к среде

Насекомые и сорные растения изменяются под действием пестицидов, урбанизации и загрязнения. В городах выживают и размножаются те особи, чьи признаки лучше подходят новым условиям.

Изменения в реальном времени

Современная биология фиксирует эволюционные сдвиги не только в ископаемой летописи, но и в живых популяциях. Это делает процесс эволюции наблюдаемым и проверяемым.

Факторы эволюции и их роль

Фактор	Роль	Пример
Мутации	новые варианты	изменения ДНК
Рекомбинации	новые сочетания	признаки потомства
Отбор	закрепляет полезное	устойчивость к антибиотикам
Изоляция и дрейф	разделяют и случайно меняют	островные популяции

Школьный курс эволюционного учения; обобщение основных факторов

Таблица показывает, что разные механизмы действуют совместно: одни создают наследственные различия, другие закрепляют или случайно меняют их частоты.

Эволюция не сводится к одному механизму: наследственная изменчивость создаёт материал, а отбор, изоляция и дрейф направляют его дальнейшую судьбу.

Что рассказывают ископаемые

Археоптерикс: между двумя мирами

Эта находка стала классическим примером переходной формы, потому что сочетает признаки рептилий и птиц. По строению перьев, зубов и костей видно, как постепенно складывались особенности полёта и теплокровности.



Тиктаалик: шаг к суше

Тиктаалик показывает переход от рыб к наземным позвоночным. У него были признаки плавательного и опорного аппарата, что помогало ориентироваться в мелководье и стало важным этапом освоения суши.



Гоминины в слоях времени

Ископаемые остатки древних людей и их предков позволяют проследить изменения скелета, объёма мозга и орудийной деятельности. Сопоставление слоёв пород делает эволюцию человека частью общей истории жизни.



Эволюция — это история изменений и приспособлений

От первых клеток до человека жизнь на Земле развивалась через усложнение, отбор и смену сред обитания. Современное биоразнообразие — результат длительного эволюционного пути.