


Комплексный обзор: белки, их состав и структура

Белки — ключевые молекулы жизни, выполняющие разнообразные функции, важные для здоровья и экологии.



История открытия белков и развитие науки о них


Исследования белков начались в XIX веке с введением термина «протеин». В XX веке раскрыли их структуру, показав важность для клеточного роста и обмена веществ.



Ключевые функции белков в биологии

Ферментативная активность

Белки-ферменты катализируют химические реакции, ускоряя обмен веществ без расхода собственной структуры.




Структурная поддержка

Коллаген и кератин обеспечивают прочность тканей — суставов, кожи, волос и ногтей, создавая каркас организма.



Транспорт и защита

Гемоглобин переносит кислород, а антитела распознают и нейтрализуют патогены, защищая организм от инфекций.



Основные химические элементы белков

Белки состоят из углерода, водорода, кислорода и азота, которые формируют аминокислотные остатки.

Часто в составе белков присутствует сера, придающая специфические свойства молекулам.

Иногда встречаются элементы фосфор, железо и медь, влияющие на функции белковых комплексов.

Азот, присутствующий в аминоклуппах, отличает белки от других классов биомолекул.

Разнообразие аминокислот и их роль в белках


20 стандартных аминокислот в белках

Основу белков составляют 20 аминокислот, связанные пептидными связями, что позволяет формировать сложные структуры.




Радикалы определяют свойства

Каждая аминокислота отличается радикалом R, который влияет на растворимость и взаимодействия белка с другими молекулами.




Незаменимые и заменимые аминокислоты

Девять аминокислот человек получает с пищей, остальные синтезирует самостоятельно, что важно для здоровья и метаболизма.



Процентное содержание элементов в белках




Основные элементы, их средние проценты в составе белков по данным федерального учебника.

Высокое содержание азота и серы служит характерной чертой белков среди органических молекул.

Элемент	Процент содержания
Углерод (C)	50–55%
Водород (H)	6–7%
Кислород (O)	20–23%
Азот (N)	15–18%
Сера (S)	0,3–2,5%

Федеральный учебник по биологии, 2023



Строение и роль пептидной связи в белках

Пептидная связь образуется между карбоксильной группой одной и аминок группой другой аминокислоты, сопровождаясь выделением воды.

Эти связи повторяются, создавая длинные полипептидные цепи, основу белковой структуры.

Пептидная связь придаёт цепи жёсткость и линейность, что важно для дальнейшей укладки белка.

Соотношение незаменимых и заменимых аминокислот




Незаменимые аминокислоты нельзя синтезировать организмом, они должны поступать с пищей.

Баланс незаменимых и заменимых аминокислот критичен для полноценного питания и здоровья.

Медицинские справочники, 2023


Первичная структура белка: основы и значение



Первичная структура — уникальная последовательность аминокислот в цепи, определяемая генетическим кодом.

Эта последовательность напрямую влияет на свойства и функции белка, задавая дальнейшую пространственную укладку.

Мутации в первичной структуре могут нарушать функции белка, приводя к заболеваниям, например, серповидной анемии.



Вторичная структура белка: формы и функции

Вторичная структура возникает вследствие водородных связей между аминокруппами и карбонильными группами в цепи.

Основные формы — альфа-спираль и бета-слой, обеспечивающие стабильность и устойчивость молекулы.

Эти структуры придают белкам прочность и гибкость, что важно для механических свойств тканей.

Примером служат кератин в волосах и шелк у некоторых насекомых.


Третичная структура: укладка в глобулу

Компактная организация полипептидной цепи

Третичная структура представляет собой трёхмерную укладку полипептидной цепи в компактную глобулу, которая обеспечивает функциональную форму белка. Такая организация появляется вследствие взаимодействия между различными участками цепи.

Роль межмолекулярных связей в стабилизации

Стабилизация достигается за счёт водородных, ионных и дисульфидных связей, а также гидрофобных взаимодействий. Эта уникальная структура определяет биологическую активность глобулярных белков, таких как гемоглобин и миоглобин.





Четвертичная структура: белковые комплексы

Четвертичная структура возникает при объединении нескольких полипептидных цепей — субъединиц, образующих функциональные комплексы. Это придаёт белкам новые свойства и синергическую активность.


Связи между субъединицами преимущественно нековалентные — водородные и ионные, что обеспечивает динамичность комплекса. Иногда встречаются прочные дисульфидные мостики для дополнительной стабилизации.

Примером служит гемоглобин, состоящий из четырёх субъединиц. Его четвертичная структура обеспечивает эффективный перенос кислорода в крови и регулирует его связывание.



Иерархия организации белка от гена до комплекса


По данным биохимии и молекулярной биологии



Денатурация белка: механизмы и последствия

Денатурация — это нарушенный порядок вторичной и выше структур белка под воздействием внешних факторов: температуры, изменений pH, органических растворителей или тяжёлых металлов. Это приводит к потере функциональной активности белка.

Изменённая структура часто сопровождается коагуляцией и выпадением осадка. Процесс может быть обратимым, если условия восстановлены, либо необратимым с потерей биологической функции.



Ферментативные белки как биологические катализаторы

Ферменты ускоряют химические реакции, снижая энергетику активации, при этом сами оставаясь неизменными в процессе. Они обеспечивают регуляцию метаболизма во всех живых организмах.


Каждый фермент обладает высокой специфичностью к своему субстрату, что обусловлено формой и химическим составом активного центра белка.

Примеры включают амилазу, расщепляющую крахмал, каталазу, разлагающую перекись водорода, и ДНК-полимеразу, синтезирующую новые цепи ДНК в процессе репликации.

Разнообразные функции белков в транспорте и защите


Гемоглобин и миоглобин: перенос и хранение кислорода

Гемоглобин в эритроцитах переносит кислород от лёгких к тканям, тогда как миоглобин в мышцах запасает кислород, обеспечивая непрерывное дыхание клеток во время нагрузки.




Альбумины и глобулины: универсальные переносчики

Эти белки транспортируют ионы, гормоны и лекарственные вещества по кровотоку, регулируя физиологические процессы и оказывая влияние на обмен веществ и гомеостаз.



Иммуноглобулины: защитники организма

Антитела распознают и связываются с чужеродными антигенами, нейтрализуя патогены и стимулируя иммунный ответ, что является ключевым фактором защиты от инфекций.



Потребность подростков в белке



Потребность варьируется в зависимости от пола и уровня физической активности, что связано с интенсивным ростом и изменениями организма в пубертатном периоде.

Недостаток белка приводит к задержке развития и снижению иммунитета, а избыток может вызвать нагрузку на внутренние органы.

Содержание белка в основных пищевых продуктах

Продукт	Содержание белка (%)
Говядина	19–21
Курица	20–23
Рыба	18–22
Яйцо	13
Молоко	3
Сыр	20–25
Фасоль	23
Соя	34

Таблицы пищевой ценности Российской Федерации

Таблица показывает разнообразие белкового состава в продуктах животного и растительного происхождения. Бобовые являются ценным растительным источником белков.

Растительные источники, особенно соя и фасоль, по содержанию белка сопоставимы с животными продуктами и важны для сбалансированного питания.

Генетические мутации и болезни белковой природы

Мутации в генах, кодирующих белки, могут изменять первичную структуру, вызывая патологии, например, серповидноклеточная анемия связана с изменением β -цепи гемоглобина.

Дефекты ферментов вследствие мутаций приводят к нарушению обмена веществ, как при фенилкетонурии, где нарушен фермент фенилаланингидроксилаза.

Мутации гена CFTR при муковисцидозе вызывают нарушение транспорта ионов, что отражается на функции слизистых и приводит к хроническим заболеваниям.

Белки — фундамент жизни и здоровья подростков

Белки формируют основу жизненно важных процессов и структур, обеспечивая рост и иммунитет. Соблюдение баланса белкового питания критически важно для полноценного развития и здоровья молодого организма.

