

Тип Хордовые: общая характеристика и ключевые темы

Животные с хордой, нервной трубкой и жаберными щелями, важные для природы и человека.



История возникновения и эволюции хордовых

Первые хордовые появились около 530 миллионов лет назад в кембрийский период. Их эволюция привела к появлению позвоночных, освоивших воду и сушу, что способствовало развитию разнообразных современных животных.



Общие признаки и строение хордовых

1

Все хордовые на определённой стадии развития имеют хорду — упругий осевой стержень, поддерживающий тело и обеспечивающий форму и движение.


2

Помимо хорды, у хордовых есть спинная нервная трубка, которая развивается в центральную нервную систему, и жаберные щели, играющие роль в дыхании или формировании органов.

3

Также у них присутствует хвост за анальным отверстием, который служит для движения или равновесия, объединяя группы внутри типа морфологическими признаками.

Строение хорды и её биологическая функция



- Хорда представляет собой прочный и гибкий стержень, расположенный под нервной трубкой вдоль тела; она выполняет опорную функцию и облегчает движение животных.

- У позвоночных хорда сохраняется лишь на ранних эмбриональных стадиях, заменяясь позвоночным столбом, в то время как у других групп она может сохраняться на всю жизнь.

Строение и особенности нервной системы хордовых



Нервная трубка — основа ЦНС

Нервная система хордовых формируется из спинной нервной трубки, которая расположена над хордой и служит источником для головного и спинного мозга. Она обеспечивает обработку информации и координацию.

Функции и развитие мозга

Развитие головного и спинного мозга обеспечивает сложные движения, восприятие окружающего мира и быстрые реакции, что выгодно отличает хордовых от других животных типов.

Жаберные щели: строение и значение

1

Жаберные щели — парные отверстия на боковой поверхности глотки, появляющиеся у всех хордовых в эмбриональном развитии и служащие для фильтрации или дыхания.

2

У водных хордовых, таких как рыбы, жаберные щели сохраняются во взрослой стадии и используются для газообмена с окружающей средой через жабры.

3

У наземных позвоночных жаберные щели присутствуют только в эмбрионе и преобразуются в структуры головы и шеи, например, уха или щитовидной железы.

4

Таким образом, жаберные щели свидетельствуют о единстве типа и служат важным признаком эволюционного происхождения всех хордовых животных.

Классификация: подтипы хордовых и их отличия



Оболочники (Туникаты)

Морские беспозвоночные, приспособленные к неподвижному образу жизни взрослой стадии, с организмом, защищённым оболочкой, и хордой только у личинок.



Бесчерепные (Ланцетники)

Маленькие морские животные, сохраняющие хорду и нервную трубку на протяжении всей жизни, ведущие полужарытый образ жизни и фильтрующие пищу.



Позвоночные (Вертебраты)

Крупные животные с развитием позвоночника, который заменяет хрящевую или хордальную структуру, включая рыбы, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

Подтип Оболочники: строение и образ жизни



Асцидии: морские фильтраторы с прикреплённым образом жизни

Асцидии обитают на морском дне, прикрепляясь к камням или водорослям. Личинки обладают хордой, но взрослые особи утрачивают её и фильтруют воду с помощью сифонов, питаясь микроорганизмами.



Редукция признаков у взрослых оболочников

Со взрослостью у оболочников происходит значительная потеря подвижности и упрощение строения. Хорда и нервная система редуцируются, что отражает их приспособление к прикреплённой жизни.

Подтип Бесчерепные: ланцетник как пример



1

Ланцетник сохраняет хорду и нервную трубку на протяжении всей жизни, что позволяет ему эффективно двигаться и обеспечивать фильтрационный тип питания. Это помогает ему обитать на морском дне.

2

Ланцетник зарывается в донные отложения, фильтруя воду для пищи. Его примитивное строение близко к общим предкам хордовых, что ценится для изучения эволюции данного типа.

Подтип Позвоночные: разнообразие классов



Рыбы: первые позвоночные обитатели водной среды

Рыбы характеризуются наличием позвоночника, развитых жабр и разнообразных плавников. Они занимают разные водные экосистемы — от морей до пресных рек — и демонстрируют многообразие форм.



Земноводные: адаптация к жизни на суше и в воде

Земноводные ведут двойной образ жизни — в воде и на суше. Их тонкая кожа участвует в дыхании, а жизненный цикл включает метаморфоз от личинки к взрослой особи.



Рептилии: первые наземные позвоночные с кожей из чешуи

Рептилии освоили сушу, защитившись от высыхания через роговые чешуи. Они откладывают яйца с плотной оболочкой, что позволяет независимость от водных источников для размножения.



Птицы и млекопитающие: вершины эволюции позвоночных

Птицы приобрели полёт, облегчённый полым скелетом и перьями. Млекопитающие развили активное теплообеспечение и развитую нервную систему, что дало им высокую адаптивность и сложное поведение.

Сравнительная таблица подтипов хордовых

Подтип	Среда обитания	Наличие позвоночника	Сохранение хорды	Образ жизни
Оболочники	Морская	Отсутствует	Только личиночная стадия	Прикреплённые
Бесчерепные	Морская	Отсутствует	Сохраняется всю жизнь	Полузарные
Позвоночные	Наземные и водные	Присутствует	Только эмбрионально	Активный, разнообразный

Таблица показывает основные различия оболочников, бесчерепных и позвоночных по среде обитания, наличию позвоночника, сохранению хорды и образу жизни. Позвоночные представляют наиболее развитые формы.

Наибольшая специализация и разнообразие форм присущи позвоночным, что обеспечило их широкое освоение различных экосистем.

Среда обитания и распространение хордовых



- Хордовые животные обитают в разнообразных средах: морские и пресноводные рыбы занимают
- водные пространства, обеспечивая экосистемы богатством видов и функциональной ролью.

- Наземные амфибии, рептилии и млекопитающие приспособились к разным климатическим
- условиям, а птицы заняли воздушное пространство, освоив полёт и миграцию на большие расстояния.

Численность позвоночных: сравнение по классам

Рыбы занимают лидирующее место по числу видов, что отражает их разнообразие и природу водных экосистем. Птицы и рептилии имеют схожее видовое разнообразие, обеспечивая экосистемы землями и воздухом.

Данные свидетельствуют о богатом видовом составе рыб и значимости адаптаций у воздушных и наземных позвоночных, что формирует биосферу планеты.



Международный союз охраны природы (IUCN)

Роль хордовых в экосистемах

1

Хордовые занимают ключевые позиции в пищевых цепях, регулируя численность популяций других организмов и обеспечивая устойчивость экологических сообществ.

2

Они способствуют распространению семян и опылению, поддерживая плодородие экосистем и взаимоотношения между видами.

3

Звери-хищники и травоядные балансируют биоценозы, контролируя виды, влияющие на здоровье и разнообразие природы.

Приспособления у водных и наземных хордовых

Адаптации рыб и амфибий

Рыбы имеют жабры и плавники для передвижения и дыхания под водой. Амфибии обладают влажной кожей, необходимой для газообмена и жизни во влажных условиях. Эти приспособления обеспечивают выживание в водной и влажной среде.

Особенности птиц и млекопитающих

Птицы обладают перьями, облегчённым скелетом и дышат через воздушные мешки, что позволяет летать. Млекопитающие покрыты волосами и имеют сложную зубную систему для питания разнообразной пищей.



75%

всех продуктов животного происхождения поступает от позвоночных, что подчёркивает их важность в питании и сельском хозяйстве.

Около трех четвертей потребляемых людьми животного белка получают именно от позвоночных, включая рыбу, мясо и молочные продукты.

Редкие и исчезающие виды хордовых



Амурский тигр — символ уязвимости природы

В дикой природе осталось менее 600 амурских тигров из-за браконьерства и потери ареала. Это крупнейший подвид тигра, нуждающийся в международной охране и восстановлении среды обитания.



Белый северный носорог на грани исчезновения

Осталось всего два представителя белого северного носорога в природе. Спасение вида возможно только с помощью репродуктивных технологий и строгой охраны в заповедниках.



Распад морской свиньи вакаиты

Менее десяти особей вакаиты остаётся из-за загрязнения вод и рыболовных сетей. Этот вид морских млекопитающих считается самым редким, нуждающимся в экстренных мерах защиты.

Адаптации хордовых к экстремальным условиям

Миграции горбатых китов

Горбатые киты ежегодно преодолевают тысячи километров между холодными кормовыми зонами и тёплыми местами размножения, адаптируясь к изменениям среды.

Пара полёта рыбы-летяги

Рыба-летяга использует увеличенные грудные плавники, чтобы скользить над водой на расстояния до 50 метров, избегая хищников и экономя энергию при миграциях.

Выживание африканской жабы

Африканская жаба зарывается в сухую землю и впадает в состояние спячки, чтобы пережить засуху, восстанавливая активность только при возвращении влаги.



Необычные факты о хордовых

1

Китовая акула — самый крупный представитель рыб, достигающий длины 18 метров, питается планктоном посредством фильтрации. Колибри является уникальной птицей, способной летать в обратном направлении благодаря быстрым и точным движениям крыльев.

2

Летучая мышь — единственное млекопитающее с активным полётом, используя эхолокацию для ориентации в темноте. Самый мелкий позвоночный — лягушка *Paedophryne amauensis*, её длина всего 7,7 миллиметров.



Значимость хордовых для природы и человека

Хордовые играют незаменимую роль в поддержании экологического баланса и развитии цивилизации, их сохранение обеспечивает стабильность и процветание жизни на Земле.

