



Общая характеристика грибов: основные темы и вопросы

Обзор уникального мира грибов: строение, питание, разнообразие и значение для природы.

Грибы: происхождение, классификация и роль в природе

Грибы существуют свыше 400 миллионов лет как отдельное царство. Они питаются готовыми веществами, играя ключевую роль в разложении и почвообразовании. Классификация включает плесневые, дрожжевые и шляпочные, отличающиеся строением и размножением.



Строение клеток грибов: главные отличия



Хитиновая клеточная стенка

Клетки грибов покрыты крепкой клеточной стенкой из хитина, что отличает их от растений. Эта особенность придаёт прочность и защиту грибнице в окружающей среде.



Отсутствие фотосинтеза

Грибы не содержат хлорофилл и не могут самостоятельно производить пищу. Они зависят от поглощения веществ из окружающей среды, используя ферменты для внешнего переваривания.



Особенности цитоплазмы

Внутри клеток грибов находится эукариотическое ядро и крупные вакуоли. Такая структура обеспечивает эффективный обмен веществ и рост мицелия.

Питание грибов: способы и значение

01

Сапротрофы питаются мёртвыми органическими веществами, разлагая их и возвращая питательные элементы в почву.

02

Паразитические грибы живут на живых организмах, используя их ресурсы и иногда вызывая болезни.

03

Симбиотические грибы образуют микоризу с растениями, улучшая их поглощение воды и питательных веществ.

Способы размножения грибов: споры и мицелий



Размножение спорами

Грибы образуют споры на разных органах, таких как спорангии или пластинки. Эти легко распространяемые структуры обеспечивают быстрый рост и распространение грибницы.



Вегетативное размножение

Некоторые грибы размножаются частями мицелия или почкованием, как дрожжи. Такой способ помогает сохранять генетический материал и расширять ареал обитания.

Мицелий и грибница: основа жизни гриба



● Мицелий — это тонкие нити (гифы), создающие главную массу гриба под землёй или в субстрате. Он поглощает питательные вещества, обеспечивая рост и развитие.

● Грибница может достигать больших размеров — десятки метров в диаметре. Плодовое тело, видимое над землёй, лишь малая часть целого организма.

Шляпочные грибы: строение и определение



01

Плодовое тело состоит из шляпки и ножки. Под шляпкой расположены пластинки или трубочки, на которых образуются споры, необходимые для размножения.

02

Для определения вида нужно учитывать цвет, размер и форму плодового тела. К популярным относятся белый гриб, подберезовик, сыроежка и мухомор.

Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы: отличительные признаки



Пластинчатые грибы

Споры у этих грибов формируются на тонких пластинках под шляпкой. Они часто имеют яркие оттенки и включают виды, как сыроежка и опята.



Трубчатые грибы

У трубчатых грибов споры находятся внутри губчатых трубочек. Шляпка обычно мягкая и пористая, как у белого гриба и масленка, что важно для их идентификации.

Видовое разнообразие шляпочных грибов в России

В России разнообразие пластинчатых грибов более чем в три раза превышает количество трубчатых. Это отражает богатство экосистем и особенности климата.

Энциклопедия грибов России, 2023



Большое видовое разнообразие пластинчатых грибов указывает на их успешную адаптацию и важность в лесных экосистемах страны.

Экологические функции шляпочных грибов




Разложение органики

Грибы ускоряют разложение мёртвых растений и животных, способствуя возврату питательных веществ в почву.



Формирование микоризы

Микоризные грибы образуют симбиоз с деревьями, улучшая поглощение влаги и минералов, что укрепляет лесные экосистемы.



Паразитизм на растениях

Некоторые грибы паразитируют на растениях, вызывая болезни, что влияет на динамику растительного сообщества.

Съедобные и ядовитые шляпочные грибы: сравнение

Вид гриба	Внешний вид	Место произрастания	Характеристика	Симптомы отравления
Белый гриб	Широкая светлая шляпка	Лес, под берёзами и елями	Съедобный, вкусный гриб	—
Мухомор	Красная с белыми пятнышками шляпка	Лес, травянистые места	Ядовитый, опасен для жизни	Тошнота, рвота, галлюцинации
Бледная поганка	Бледно-зеленая, кольцо на ножке	Влажные леса и парки	Смертельно ядовитая	Судороги, поражение печени
Подберезовик	Темная шляпка с пятнышками	Смешанные леса	Съедобный, часто встречается	—

Только хорошо знакомые и правильно определённые шляпочные грибы безопасны для сбора и употребления в пищу.

Таблица отражает различия между съедобными и ядовитыми шляпочными грибами по внешнему виду, месту произрастания, пользе и вреду, а также симптомам отравления. Это помогает безопасно определить грибы при сборе.

Микологический атлас, 2022

Где встречаются шляпочные грибы: ареал и среда обитания

Разнообразие сред обитания

Шляпочные грибы широко населяют различные природные среды: леса, парки, луга, а также растут около пней и поваленных деревьев. Они образуют микоризу с растениями, что обеспечивает взаимовыгодное существование.



Географическое распространение

Эти грибы распространены по всему миру, встречаясь на всех материках, кроме Антарктиды. В России зарегистрировано около 4000 видов, из которых значительную часть составляют шляпочные грибы.

Примеры съедобных шляпочных грибов: особенности и значение



Белый гриб – ценный лесной деликатес

Белый гриб характеризуется крупной светлой шляпкой и обычно растёт в берёзовых и еловых лесах. Этот гриб высоко ценится за вкус и питательность в кулинарии многих стран.



Подберезовик – обитатель смешанных лесов

Подберезовик имеет тёмную шляпку и характерные пятнышки на ножке. Широко распространён в смешанных лесах и является популярным съедобным грибом из-за хорошего вкуса.



Масленок – гриб с маслянистой шляпкой

Масленок легко узнать по скользкой поверхности шляпки. Этот вид предпочитает сосновые боры и часто собирается грибниками за свои кулинарные свойства.



Лисичка – яркий представитель микоризных грибов

Лисичка выделяется насыщенно-жёлтой гофрированной шляпкой и образует микоризу с корнями деревьев. Популярна в кулинарии благодаря приятному аромату и способности сохраняться после сушки.

Ядовитые шляпочные грибы: чем опасны

1.

1. Мухомор отличается яркой красной или оранжевой шляпкой с белыми пятнышками. Отравление приводит к тяжелым симптомам: тошноте, головокружению и галлюцинациям, требующим немедленной медицинской помощи.

2.

2. Бледная поганка имеет зелёно-белую шляпку и кольцо на ножке. Это один из самых смертельно опасных грибов, вызывающий сильное поражение печени и почек, что зачастую заканчивается летальным исходом.



Правила сбора грибов: безопасность школьника



● Следует собирать только хорошо знакомые и изученные виды грибов. Ни в коем случае не берите и не пробуйте на вкус незнакомые или подозрительные грибы, чтобы избежать отравлений.

● Не собирайте грибы вдоль дорог, возле промышленных зон и свалок. Выбирайте только свежие, неповреждённые экземпляры, избегая старых или червивых, чтобы сохранить здоровье и безопасность.

Хозяйственное значение грибов: сферы применения



Пищевая промышленность

В пищевой отрасли выращивают шампиньоны и вёшенки на фермах, а также собирают трюфели — дорогостоящие деликатесы. Эти грибы востребованы как источник белка и вкусовой насыщенности.



Медицинское применение

Грибы стали источником ценных антибиотиков, таких как пенициллин и цефалоспорин. Их использование спасло миллионы жизней и продолжает играть важную роль в фармакологии.



Экологические и технологические инновации

Мицелий используют для производства биоразлагаемой упаковки и ферментации кормов. Это новаторские технологии в области устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Грибы в культуре и искусстве: влияние на традиции

Образ грибов в народных традициях

Грибы часто появляются в народных сказках и легендах, символизируя загадочность природы и её силу. Использовались для изготовления красителей и обрядовых предметов в традиционной культуре.

Кулинарное и художественное значение

В русской кухне грибы занимают важное место — из них готовят супы, пироги и соленья. Их образ часто вдохновляет художников, что отражено в народных ремёслах и декоративно-прикладном искусстве.



Удивительные факты о грибах

Опёнок тёмный - самый большой организм

Грибница опёнка тёмного в штате Орегон занимает площадь свыше 8,8 квадратных километров, что делает его крупнейшим живым организмом на Земле.

Открытие пенициллина

В 1928 году Александер Флеминг выделил первый антибиотик из гриба плесени, что стало революцией в медицине и спасло множество жизней.

Новые виды грибов

Ежегодно учёные описывают более 1000 новых видов грибов, расширяя наше понимание биоразнообразия и экологии разных регионов.

Свечение в темноте

Некоторые виды грибов обладают биолюминесценцией, позволяющей им светиться в темноте, что привлекает исследователей и любителей природы.

Красная книга и охрана грибов: современные угрозы



01

1. В Красную книгу России внесены около 60 видов грибов, которые находятся под угрозой из-за вырубki лесов и загрязнения окружающей среды. Это требует срочных охранных мероприятий.

02

2. Основные меры по защите включают создание охраняемых территорий, запрет сбора редких грибов и просветительскую деятельность среди населения для сохранения грибного биоразнообразия.



Заключение: значение шляпочных грибов в природе и жизни человека

Шляпочные грибы — важный элемент природных экосистем и сырьё для человека. Их изучение и бережное отношение позволяют сохранить разнообразие и обеспечить устойчивое использование ресурсов.