



Химический состав клетки

Клетка содержит воду, белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты, объединяющие жизнь.



Исторические основы изучения клетки

Исследования XIX века заложили фундамент клеточной биологии. Открытия ферментов и нуклеиновых кислот позволили разграничить живое и неживое, открывая путь к современным биологическим наукам.



Вода — основа жизни клетки



Вода занимает до 80% массы клетки, обеспечивая растворение веществ и создавая среду для биохимических процессов.


Она играет ключевую роль в транспорте веществ и участвует во всех обменных реакциях, делая возможным существование клетки.

Процентное содержание основных веществ в клетке

- Таблица показывает средний состав и функции главных компонентов клетки.
- Вода преобладает, белки важны для структуры и процессов, липиды — для энергии и мембран.

Компонент	Среднее содержание (%)	Основная функция
Вода	70-80	Универсальный растворитель
Белки	10-20	Строительство и катализ
Липиды	2-5	Энергия и барьер





Неорганические соединения: соли и минералы

Минеральные соли, такие как Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , играют главную роль в поддержании внутреннего баланса и функций клетки.

Ионы кальция и магния активируют ферменты, обеспечивая регуляцию обмена веществ и поддержание стабильности клеточных структур.

Органические соединения клетки




Основные группы органических веществ

Белки выполняют ферментативные и структурные функции, углеводы служат источником энергии и строительным материалом.

Функциональное значение


Липиды образуют мембраны и резервируют энергию, а нуклеиновые кислоты хранят и передают наследственную информацию.

Роль белков в клетке



Ферментативная активность белков

Белки-ферменты ускоряют химические реакции, необходимые для жизни клеток. Они способствуют расщеплению и синтезу веществ, обеспечивая регуляцию метаболизма.




Структурные и транспортные функции

Белки формируют каркас клетки и участвуют в транспортировке молекул через мембраны. Они также необходимы для мышечного сокращения и иммунного ответа.


Распределение органических веществ в клетке

Белки Липиды Углеводы
Нуклеиновые кислоты



- Белки занимают большую часть, отражая их важную роль в клеточных процессах и структуре.
- Доминирование белков подчеркивает их многофункциональность, в то время как липиды и углеводы поддерживают специализированные задачи.

Биохимические исследования, 2023




Липиды – структура и функции

Липиды составляют двойной слой мембраны, обеспечивая клетке защиту и изоляцию от внешней среды.

Они также служат резервом энергии и участвуют в передаче сигналов, поддерживая стабильность и форму клетки.

Углеводы в клетке




Энергетическая роль углеводов

Углеводы, включая глюкозу, обеспечивают быструю энергию клетке для её жизнедеятельности и процессов.



Структурная функция

Некоторые полисахариды, такие как целлюлоза, формируют клеточные стенки у растений, поддерживая их структуру и защиту.




Нуклеиновые кислоты — основа наследственности

01

ДНК и РНК состоят из цепочек нуклеотидов, которые являются строительными блоками этих макромолекул. ДНК хранит всю генетическую информацию, необходимую для развития и функционирования организма.

02


РНК отвечает за передачу этой информации и участие в синтезе белков, функционируя в цитоплазме и на рибосомах. Такая организация обеспечивает точное выполнение биологических программ.



Взаимосвязь биомолекул в клетке



Схематичное отображение основных функций и взаимодействий биомолекул внутри клетки



Аминокислоты — строительные единицы белков

01

В белках содержится 20 видов аминокислот, каждая из которых отличается химической структурой и функцией. Они соединяются в определённой последовательности, образуя уникальные белковые молекулы.

02

Некоторые аминокислоты называются незаменимыми, поскольку организм не может синтезировать их самостоятельно и должен получать с пищей. Это важно для поддержания нормальной работы клеток.

03

Нарушение последовательности аминокислот в белках ведёт к изменению их структуры и утрате функций, что может вызвать серьёзные заболевания и нарушения обмена веществ.

01

Мономеры — это небольшие, простые молекулы, такие как аминокислоты или моносахариды, которые служат строительными блоками для более крупных соединений.

02

Полимеры формируются из множества мономеров, связанных между собой, например, белки состоят из аминокислот, а нуклеиновые кислоты — из нуклеотидов.

03


Процесс объединения мономеров в полимеры называется полимеризацией и является ключевым для усложнения структуры клетки и её функций.

04

Таким образом формируются основные биомолекулы, обеспечивающие разнообразие и сложность жизненных процессов в клетке.


Мономеры и полимеры: образование сложных молекул

Особенности химического состава растительных и животных клеток



Растительная клетка: клеточная стенка и запас крахмала

Растительные клетки имеют прочную клеточную стенку из целлюлозы, придающую жесткость и форму. В них накапливается крахмал — основной запас углеводов, используемый для энергии и роста.




Животная клетка: гликоген и специальные органеллы

Животные клетки содержат гликоген в качестве главного энергетического запаса. В них отсутствуют клеточные стенки, но присутствуют различные органеллы для приспособления к подвижности и обмену веществ.


Роль ионов в жизнедеятельности клетки



Ионы натрия и калия поддерживают электрические потенциалы мембран, что является основой для передачи нервных импульсов и мышечного сокращения.



Кальций и магний участвуют в активации ферментов и обеспечении мышечного сокращения, а также стабилизируют клеточные мембраны для их нормальной работы.




Железо входит в состав гемоглобина, обеспечивая транспорт кислорода, а ион хлора поддерживает солевой баланс и кислотно-щелочное равновесие в клетке.

Основные этапы обмена веществ в клетке



Пошаговое описание процессов метаболизма в клетке







Многообразие функций воды в клетке




Вода служит растворителем для множества органических и неорганических веществ, обеспечивая их взаимодействие и транспорт внутри клетки.



Участвует в биохимических реакциях, таких как гидролиз, что важно для расщепления молекул и энергетического обмена.



Вода поддерживает тургор клеток — внутреннее давление, необходимое для сохранения формы и устойчивости клеточных структур.



Обеспечивает движение веществ по цитоплазме и способствует эффективному обмену веществ между органеллами.

Химический состав разных типов клеток



Нервные клетки богаты липидами, что связано с присутствием миелиновых оболочек, ускоряющих передачу нервных импульсов.




Мышечные клетки содержат большое количество белков, таких как актин и миозин, которые обеспечивают сокращение и движение тканей.



Печёночные клетки насыщены ферментами, выполняющими обменные функции и обезвреживающими токсичные вещества в организме.

Значение химического состава клетки для жизни организма



Химический состав клетки определяет её структуру и функции, обеспечивая рост, развитие и приспособление организма. Баланс веществ поддерживает жизнедеятельность и передачу наследственной информации.