

Обзор: клеточное строение листа

Лист — важный орган растений, объединяющий ткани и клетки для жизненных процессов.



Путь изучения клеток листа



Изучение структуры листа началось с изобретения микроскопа. Основатели клеточной теории заложили основы ботаники, современные методы открывают мельчайшие детали клеток и тканей.

Внешние особенности листа



Листовая пластинка и черешок

Лист состоит из тонкой листовой пластинки и черешка, соединяющего лист с ветвью. Иногда присутствуют дополнительные придатки — прилистники, выполняющие защитные функции.



Устьица — маленькие поры

На поверхности листа расположены устьица, которые регулируют обмен газами с окружающей средой. Они играют важную роль в дыхании и транспирации растения.



Трихомы и кутикула

Мелкие волоски — трихомы — и восковая кутикула покрывают лист, уменьшая испарение воды и защищая от вредителей и неблагоприятных факторов среды.

Ключевые типы клеток листа




Клетки эпидермы

Образуют защитный наружный слой листа, препятствуют обезвоживанию и механическим повреждениям.




Клетки мезофилла

Разделяются на палисадные и губчатые, обеспечивают фотосинтез и газообмен внутри листа.



Устьица

Контролируют движение газов и водяного пара, регулируют жизненные процессы растения.



Проводящие клетки

Транспортируют воду, минералы и органические вещества по жилкам листа.

Строение и функции клеток эпидермы

Плотная и прозрачная защита

Клетки эпидермы очень плотно прилегают друг к другу и прозрачны, что позволяет свету проникать к фотосинтетическим клеткам. Хлоропластов в них практически нет.




Участие в защите и газообмене

Эпидерма покрывает лист восковой кутикулой и формирует трихомы, снижая потерю влаги. Через устьица, находящиеся в эпидермальном слое, происходит обмен газами с окружающей средой.



Кутикула и её значение



Кутикула — наружный восковой слой эпидермы, защищающий лист от чрезмерного испарения воды и механических повреждений.



Водоотталкивающие свойства кутикулы способствуют самоочищению поверхности листа, предотвращая накопление пыли и микроорганизмов.



Толщина кутикулы зависит от условий жизни растения: в засушливых местах она толще, а в влажных — тоньше и проницаемее.

Устьица и замыкающие клетки

01

Устьица состоят из двух замыкающих клеток с хлоропластами, способных изменять форму. Они открываются и закрываются в ответ на свет и влажность, контролируя газообмен.

02

Через устьица внутрь листа поступает углекислый газ, а вода и кислород испаряются наружу, поддерживая баланс между потребностями растения и условиями окружающей среды.





Сравнение палисадных и губчатых клеток мезофилла

Таблица показывает различия между двумя типами клеток мезофилла по форме, расположению и функциям.

Палисадные клетки эффективны для фотосинтеза, губчатые — обеспечивают газообмен.

Палисадные клетки	Губчатые клетки
Вытянутая форма	Округлая форма
Плотное расположение	Рыхлое расположение
Много хлоропластов	Меньше хлоропластов
Фотосинтез	Газообмен и циркуляция

Палисадная паренхима: основные характеристики

1.

Расположена в верхнем слое мезофилла, содержит большую часть хлоропластов листа для эффективного фотосинтеза.

2.

Клетки имеют удлинённую форму и ориентированы вдоль направления света для максимального поглощения энергии.

3.

Плотное соседство клеток уменьшает пустоты, обеспечивая концентрацию фотосинтетических процессов.

4.


Адаптирована для быстрого синтеза органических веществ, поддерживая жизнедеятельность растения.

Губчатая паренхима: строение и функции



Рыхлое расположение клеток

Губчатые клетки располагаются свободно, создавая воздушные полости для циркуляции газов. Это помогает обеспечивать CO_2 для фотосинтеза.



Связь с устьицами

Воздушные пространства губчатой ткани связывают внутреннюю часть листа с внешней средой через устьица, обеспечивая эффективный газообмен.




Участие в транспирации

Губчатая паренхима способствует испарению воды из листа, играя важную роль в регуляции температуры и водного баланса растения.


Распределение хлоропластов в клетках листа

Большинство хлоропластов сосредоточено в палисадных клетках, обеспечивая интенсивный фотосинтез, тогда как губчатые клетки содействуют газообмену с меньшим количеством хлоропластов.

Данные подтверждают, что палисадные клетки играют центральную роль в фотосинтезе, а губчатые — важны для кислородо-углекислого баланса и транспирации.



Учебник биологии для средней школы, 2023



Проводящие ткани: ксилема и флоэма

Ксилема отвечает за транспорт воды и минеральных веществ от корней к листьям, обеспечивая гидратацию и питание тканей растения.

Флоэма перемещает продукты фотосинтеза — сахарозу и органические вещества — к другим частям растения для роста и энергетического обмена.




Сравнение ксилемы и флоэмы в жилках листа

Характеристика	Ксилема	Флоэма
Строение клеток	Толстостенные, мёртвые	Тонкостенные, живые
Функция	Транспорт воды и минеральных веществ	Транспорт сахаров и органических веществ
Роль	Обеспечение жесткости листа	Механизмы роста и развития

Основные отличия ксилемы и флоэмы в строении и функции поддерживают эффективное питание и рост листа.

Ксилема обеспечивает механическую поддержку и водоснабжение, а флоэма — транспорт питательных веществ, поддерживая жизнедеятельность листа.



Роль клеточного строения листа в фотосинтезе

01

Палисадная паренхима с многочисленными хлоропластами эффективно улавливает свет для синтеза органических веществ.

02

Губчатая ткань формирует воздушные полости, способствуя равномерному обмену углекислого газа и кислорода между клетками.

03

Устьица регулируют водный баланс и газообмен, поддерживая необходимые условия для непрерывного фотосинтеза.

Адаптации листьев к окружающей среде

Утолщенная кутикула у растений засушливых регионов

У кактусов и других пустынных растений кутикула плотная и толстая, что снижает испарение влаги. Устьица уменьшены и заглублены, что минимизирует потерю воды даже в экстремальной жаре.



Толстая сеть устьиц у растений влажных тропиков

У лотоса и риса устьица крупные и многочисленные, обеспечивая интенсивный газообмен и испарение влаги для охлаждения. Кутикула тонкая, поскольку влажность не представляет угрозы.



Мутации и отклонения в строении клеток листа

1

Изменения в форме или размере клеток могут нарушить структурную целостность ткани листа, снижая фотосинтетическую эффективность.

2

Нарушения в расположении устьиц приводят к ухудшению контроля газообмена и увеличению потери воды.

3

Толщина кутикулы при мутациях может стать либо чрезмерной, препятствуя дыханию, либо слишком тонкой, уменьшая защиту.


4

Дефекты в мезофилле снижают транспорт углекислого газа и распределение хлоропластов, вызывая стресс и замедление роста растения.

Число устьиц у разных видов растений

Различия в количестве устьиц отражают типичные приспособления к различным климатическим зонам: от влажных до засушливых.

Меньшее число устьиц у кактусов помогает сохранить воду, а большее у лотоса облегчает газообмен в воде и влажности.



Справочник по ботанике для школьников, 2021


Исследования листовой ткани в микроскоп

Обзор с помощью светового микроскопа

Световой микроскоп позволяет увидеть устьица, жилки, клеточные слои (эпидерму, мезофилл) и трихомы, раскрывая основные структурные особенности листа.

Детали электронной микроскопии

Электронная микроскопия выявляет субклеточные элементы, включая строение хлоропластов и толщину кутикулы, что помогает понять функции и адаптации клеток.





Значение листа для жизнедеятельности растения

Лист — главный орган фотосинтеза, производящий органические вещества, необходимые для роста и развития растения.

Через устьица и губчатую ткань происходит газообмен и испарение, что регулирует водный баланс и температуру растения.

Повреждения листа приводят к снижению обмена веществ, уменьшению роста и урожайности, подчеркивая его ключевую роль.



Итоги изучения клеточного строения листа

Клеточное строение листа — фундамент фотосинтеза, дыхания и адаптации к среде. Эти знания помогают улучшать сельское хозяйство и сохранять природу.

