


Обзор темы: насекомые с неполным превращением

Рассмотрим особенности и представителей насекомых с неполным превращением.



Происхождение и биология насекомых с неполным превращением

Первые насекомые с неполным превращением появились свыше 300 миллионов лет назад и освоили множество сред обитания, отличаясь отсутствием стадии куколки в цикле развития.



Определение и суть неполного превращения

- 1** Неполное превращение — это процесс, когда из яйца вылупляется нимфа, напоминающая взрослое насекомое, но имеет меньшие размеры и неразвитые органы.
- 2** Жизненный цикл состоит из трёх стадий: яйцо, нимфа и имаго — взрослое насекомое, без промежуточной стадии куколки.
- 3** Отсутствие куколки отличает этот тип метаморфоза от полного превращения, где развитие происходит с полным перестроением организма.



Строение тела: сравнение нимфы и взрослой особи

- 1** Нимфа имеет типичное строение: голова, грудь, брюшко, шесть ног и зачатки крыльев, которые постепенно развиваются по мере роста.
- 2** Взрослая особь отличается полностью сформированными крыльями, крупными глазами и развитой половой системой, позволяющими вести активный образ жизни.


Сравнение развития: полное и неполное превращение

Стадия	Полное превращение	Неполное превращение
Яйцо	Да	Да
Нимфа/ Личинка	Личинка, сильно отличающаяся от взрослого	Нимфа, похожа на взрослое насекомое
Куколка	Присутствует	Отсутствует
Имаго (взрослая форма)	Да	Да

Разница стадий, длительности и появления крыльев у различных насекомых. Неполное превращение характеризуется отсутствием куколки.


Основное различие — наличие стадии куколки только при полном превращении; нимфа сразу похожа на взрослого при неполном.

Роль и разнообразие насекомых с неполным превращением



Биоразнообразие

Эти насекомые включают около трети видов класса, играя важную роль в экосистемах и обеспечивая биологическое разнообразие.



Экологические функции

Они участвуют в опылении, разложении органики и создании почвы, поддерживая жизненные циклы многих организмов.



Позиция в пищевых цепях

Являются добычей для птиц, амфибий и хищных насекомых, что поддерживает баланс в экологических сообществах.

Прямкрылы: кузнечики и саранча

Среда обитания кузнечиков

Кузнечики обитают на лугах и степях, где питаются травой и листьями. Их сильные задние ноги помогают быстро прыгать, спасаясь от хищников.



Звуки саранчи для привлечения партнеров

Самцы саранчи издают стрекочущие звуки, создаваемые трением крыльев, чтобы привлечь самок во время брачного периода.



Тараканы: особенности жизни и размножения


1 Тараканы распространены в тёплых помещениях, питаются органическими остатками и отходами человека.

2 Для размножения они откладывают яйца в защитную капсулу — оотеку, которая обеспечивает безопасность эмбрионов.

3 Нимфы проходят от 5 до 7 линек, постепенно увеличиваясь в размерах и развивая органы, необходимые для взрослой жизни.

4 Развитие тараканов может занимать несколько месяцев, после чего нимфы становятся взрослыми особями, готовыми к размножению.

Стрекозы: сложный жизненный цикл



Яйца и водная стадия развития

Стрекозы откладывают яйца в пресную воду, где нимфы развиваются до двух лет, охотясь на мелких водных животных и личинок.



Переход на сушу и последняя линька


После завершения водной стадии нимфа выходит на берег, сбрасывает кожу и приобретает крылья для полёта.



Активная взрослая стрекоза

Взрослые стрекозы — опытные хищники воздуха, использующие ловкие манёвры для поимки добычи и размножения.

Сравнение продолжительности стадий жизненного цикла



Нимфальная стадия у стрекоз значительно длиннее, что связано с их водным образом жизни.

Продолжительность разных стадий отражает адаптацию к среде: у стрекоз – самый длинный нимфальный период, у саранчи – быстрое развитие.

Данные из энтомологической литературы, обновлено 2024



Клопы: примеры разнообразных местообитаний

- 1** Клопы заселяют самые разные среды: леса, поля и даже дома человека. Постельный клоп хорошо адаптирован к жизни рядом с человеком и питается кровью.
- 2** Разные виды клопов имеют разнообразные пищевые предпочтения — от соков растений до крови животных. Их нимфы проходят несколько линек и развиваются рядом с источником пищи взрослых особей.

Богомолы: хищные насекомые с уникальной охотой

1 Богомолы — прожорливые хищники, которые охотятся на насекомых и мелких позвоночных, иногда поедая своих сородичей для выживания.

2 Нимфы богомолов с ранних стадий совершают охотничьи действия, умеют маскироваться в растительности и практически неподвижно застывают в засаде, чтобы поймать добычу.

3 По мере роста нимфы осваивают всё более сложные охотничьи приёмы, приближаясь к поведению взрослых особей с их уникальными методами охоты.

Основные представители отрядов и их экология

Таблица отражает представителей насекомых с неполным превращением, их местообитания и пищевые привычки, подчёркивая экологическое разнообразие.

Показано, как представители отрядов адаптированы к разнообразным средам и выполняют важные экологические роли в питании и экологии.

Отряд	Представитель	Среда обитания	Питание
Прямкрылые	Кузнечик	Луг	Трава
Тараканы	Рыжий таракан	Квартиры	Органика
Клопы	Постельный клоп	Дом	Кровь
Стрекозы	Красотка	Река	Водные животные
Богомолы	Обыкновенный богомол	Кустарник	Насекомые

Особенности размножения и виды кладок

Места и способы откладывания яиц

Насекомые откладывают яйца на растения, в почву или воду. Тараканы создают специальные капсулы — оотеки, обеспечивающие защиту потомству от внешних воздействий.

Морфология и защита яиц

Яйца стрекоз и водных клопов покрыты особой оболочкой, которая защищает их от высыхания и хищников. Такие особенности улучшают шансы выживания молоди.



Линька и рост нимф: биологические закономерности

1 Во время линьки нимфы сбрасывают старую кутикулу, что необходимо для увеличения размеров и развития новых органов, таких как крылья и органы зрения.

2 Количество линек варьируется от четырёх до десяти, в зависимости от вида, с каждым этапом увеличивается сложность и функциональность организма нимфы.

3 После каждой линьки наблюдается заметный рост и улучшение способностей, приближающих нимф к взрослой стадии с полноценным строением.

Численность по отрядам: распределение видов

■ Прямокрылые ■ Тараканы ■ Клопы
■ Стрекозы ■ Богомолы



Клопы составляют наибольшую долю среди насекомых с неполным превращением, что отражает их широкое разнообразие и адаптивность.

Распределение видов подчёркивает важность клопов и прямокрылых в экосистемах, а также сравнительно скромное число богомолов.

Экологическая роль насекомых с неполным превращением

Роль стрекоз в борьбе с комарами

Стрекозы активно охотятся на личинок комаров, снижая их численность и уменьшая распространение заболеваний. Их присутствие важно в пресноводных экосистемах для поддержания баланса.



Вредители сельского хозяйства и переносчики болезней

Некоторые насекомые, например, саранча и постельные клопы, причиняют значительный ущерб растениям и здоровью человека. Их изучение помогает разрабатывать методы борьбы и профилактики.



Способы защиты и адаптации к среде

1 Крепкая кутикула у многих видов служит надёжной защитой от хищников и предотвращает избыточное испарение влаги в сухой среде.

2 Покровительственная окраска позволяет насекомым, таким как кузнечики и богомолы, сливаться с окружающей растительностью, уменьшая вероятность обнаружения хищниками.

3 Некоторые клопы выделяют неприятный запах, который отпугивает потенциальных врагов и обеспечивает дополнительную защиту.

4 Острые конечности и мощные передние лапы богомолов выполняют функцию как охотничьих инструментов, так и средств обороны при нападении врагов.

Научные открытия и интересные факты

Массовая линька саранчи

Учёные наблюдали синхронную линьку саранчи, приводящую к формированию огромных роев, что оказывает сильное влияние на экосистемы и сельское хозяйство.

Дальние миграции стрекоз

Определены маршруты миграции некоторых видов стрекоз, преодолевающих до 2000 километров в поисках подходящих мест для размножения.

Описание новых видов

Регулярно описываются новые виды клопов и стрекоз, расширяя знания об их разнообразии и биологии.

Рекорды перелётов стрекозы-анакс

Стрекоза-анакс установила рекорд по дальности перелётов среди насекомых с неполным превращением, демонстрируя удивительные адаптивные способности.

Значимость изучения насекомых с неполным превращением

Изучение этих насекомых помогает понять механизмы эволюции и взаимодействия в природе, а также способствует сохранению биологического разнообразия и экологической устойчивости.