

Площадь криволинейной трапеции и интеграл

Разберём, как криволинейную фигуру под графиком
измеряют через прямоугольники и предел.

Площадь под графиком — универсальный ответ

Когда границы задаются формулами, площадь превращается в задачу анализа: её связывают с первообразной и знаком функции. Идея площадей развивается от Архимеда к Ньютону и Лейбницу, а в 10 классе становится рабочим инструментом.



Что называют криволинейной трапецией

Криволинейная трапеция — это область между графиком $y=f(x)$, осью Ox и вертикальными прямыми $x=a$ и $x=b$. Такое описание позволяет точно задать фигуру даже при «изогнутых» границах.

В типичных школьных задачах часто рассматривают случай $f(x) \geq 0$ на $[a, b]$, когда вся область лежит «над» осью Ox . Тогда площадь получается чисто геометрической и соответствует одному числу.

Если функция может пересекать ось Ox , меняется геометрический смысл: график то даёт вклад «сверху», то «снизу». Именно поэтому нужно аккуратно учитывать знак при переходе к интегралу.

Графическая модель области под кривой

- Представьте отрезок $[a, b]$ и заштрихованную область между графиком $y=f(x)$ и осью Ox . Чтобы визуализировать измерение, разбивают промежуток на мелкие участки и «подставляют» узкие прямоугольники.
- У каждого прямоугольника высота равна выбранному значению функции, а основание — Δx . На рисунке видно главное: площадь измеряется строго внутри заданных границ $x=a$ и $x=b$, а форма кривой задаёт значения элементов.



Идея разбиения на узкие прямоугольники

Разбиваем промежуток

Отрезок $[a, b]$ делят на части ширины Δx . На каждом маленьком участке берут точку и считают высоту прямоугольника по значению функции.

Складываем приближения

Составляют сумму площадей прямоугольников. Чем меньше Δx , тем ближе накопленная сумма к истинной площади криволинейной трапеции.

Переходим к пределу

При дальнейшем уменьшении шага разбиения получаем предельное значение сумм — определённый интеграл, который и задаёт площадь.

Как уточняется приближённая площадь

По мере роста числа прямоугольников график суммы Римана перестаёт заметно «гулять» и стремится к одному конечному значению.

Стабилизация результата означает, что предельная сумма хорошо описывает площадь. Именно этот предел и является значением определённого интеграла.

Схематичная иллюстрация к теме предела сумм Римана (точные числа зависят от функции и отрезка).

Основные обозначения и записи

Объект	Обозначение	Смысл	Условие применения
Криволинейная трапеция	S	Область под графиком на $[a,b]$	$y=f(x)$ задано на $[a,b]$
Сумма Римана	S_n	Приближённая сумма площадей прямоугольников	для разбиения на части
Определённый интеграл	$\int_a^b f(x)dx$	Предельное значение S_n	если f интегрируема (по школьной программе)
Площадь при $f(x) \geq 0$	S	Геометрическая площадь совпадает с интегралом	$f(x) \geq 0$ на $[a,b]$
Единицы площади	$см^2, м^2$	Как записывать ответ	всегда квадратные единицы

Соберите в одну систему ключевые объекты: область, приближение, предел и итоговая формула площади. Отдельно важно помнить про единицы измерения.

Таблица связывает геометрию с анализом: интеграл — это результат предельного уточнения суммы, а знак функции определяет геометрический смысл площади.

Формула Ньютона–Лейбница


Если $F'(x)=f(x)$, то $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. Здесь первообразная превращает вычисление «площади по пределу» в обычное подстановочное вычисление.

Вместо ручного сложения всё меньших прямоугольников достаточно найти подходящую первообразную и аккуратно подставить границы отрезка. Это существенно ускоряет решение школьных задач.

Так определённый интеграл становится универсальным: он связывает график функции и точное числовое значение площади криволинейной трапеции на выбранном промежутке.

Алгоритм вычисления площади под графиком

Обобщённый порядок действий для задач на площадь в школьном курсе



Когда определённый интеграл не совпадает с геометрической площадью

Определённый интеграл учитывает знак: участки графика выше оси Ox дают положительный вклад, а ниже — отрицательный. Поэтому алгебраическая сумма может «уменьшаться» за счёт нижних частей.

Геометрическая площадь, в отличие от интеграла, не бывает отрицательной. Следовательно, при смешанном расположении относительно оси Ox нельзя брать просто одно значение $\int_a^b f(x)dx$ как площадь.

Нужно разделить промежуток на части, где функция не меняет знак, и отдельно найти площадь каждого участка. Затем складывают именно модули площадей, а не алгебраические значения.

В итоге вы получаете число, соответствующее реальной заштрихованной области: верхние и нижние фрагменты добавляются как «площади», а знак учитывается лишь через модуль.

Положительные и отрицательные вклады функции

На участках, где $f(x) > 0$, вклад в $\int_a^b f(x) dx$ положителен. Там, где $f(x) < 0$, вклад отрицателен, хотя геометрическая площадь остаётся положительной всегда.

Если области над и под Ox частично «компенсируются», алгебраическая сумма может отличаться от геометрической площади; для последней складывают модули.

Построено по смыслу определённого интеграла (школьный курс алгебры и начал анализа, 10 класс).

Пример: площадь под параболой

- Рассмотрим функцию $y=x^2$ на отрезке $[0;2]$. Так как парабола целиком выше оси Ox , геометрическая площадь совпадает с алгебраическим значением определённого интеграла $\int_0^2 x^2 dx$.
- Первообразная равна $F(x)=x^3/3$. Подставляя границы, получаем $S=F(2)-F(0)=8/3-0=8/3$ квадратных единиц; поэтому число рядом с заштрихованной областью — $8/3$.



Сравнение типовых задач на площадь

Одна и та же схема вычислений применяется к разным функциям: находят первообразную, затем делают подстановку на концах отрезка и получают площадь.

При разных функциях меняется «накопление» площади, но метод одинаков: интеграл на заданном промежутке даёт точный результат без разбиения на бесконечно малые прямоугольники.

Функция	Отрезок	Первообразная	Площадь
$y=x$	$[0;1]$	$(x^2)/2$	$1/2$
$y=x^2$	$[0;2]$	$x^3/3$	$8/3$
$y=\sin x$	$[0;\pi]$	$-\cos x$	2

Связь интеграла с другими величинами

В задачах о движении при переменной скорости путь накапливается как сумма малых приращений на коротких интервалах времени. Каждое приращение пропорционально площади под графиком скорости.

В задачах о массе при известной плотности $\rho(x)$ масса распределена по пространству неоднородно. Интеграл суммирует вклады плотности на элементах длины, поэтому геометрия здесь работает как наглядная модель.

Похожие идеи возникают при вычислении количества вещества, заряда и других «накопительных» характеристик, зависящих от положения или времени. Поэтому интеграл соединяет анализ, геометрию и прикладные формулы.

Накопление величины во времени

Наклон графика накопленной величины соответствует текущей интенсивности процесса: чем выше значение функции, тем быстрее растёт накопление и тем больше «площадь набегает» за малый шаг.

Логика проста: конечный результат равен сумме всех микровкладов, а именно — площади под графиком интенсивности на выбранном интервале времени.

Схематические данные для иллюстрации связи накопления и площади (учебные принципы определённого интеграла, без привязки к конкретной физической установке).

Историческое развитие идеи площади

Первые попытки вычислять площади сложных фигур связаны с методом исчерпывания: фигуру «окольцовывали» приближениями, пока разница между оценками не становилась меньше заданной точности.


В XVII веке внимание сместилось к работе с бесконечно малыми величинами. Вклад внесли Пьер Ферма, Бонавентура Кавальери, Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц, расширившие инструменты подсчёта площадей и не только.

Со временем стало важно не просто получать ответы, а формализовать саму процедуру предельного перехода. Так геометрические идеи получили алгебраическую «опору» и стали систематическими.

Школьная запись определённого интеграла — это современный итог долгого пути: она объединяет понятие площади, работу с первообразными и строгую логику предела.

От графика к точной площади

Последовательность действий при вычислении площади криволинейной трапеции через определённый интеграл.



Типичные ошибки при решении задач

Часто путают границы области: берут неверный промежуток или «сдвигают» $x=a$ и $x=b$. Важно строго отмечать отрезок, который соответствует заштрихованной криволинейной трапеции.

Ещё одна ошибка — пропуск знака функции при вычислениях: при отрицательных значениях $f(x)$ алгебраическая сумма и геометрическая площадь различаются. На участках ниже Ox обычно учитывают вклад с модулем при подсчёте площади.

Не менее распространена проблема с первообразной: неверно найден $F(x)$ или ошибаются при подстановке $F(b)-F(a)$. Полезно проверять результат подстановкой размерностей и знака на простых промежуточных точках.

Наконец, встречается смешение единиц измерения: площадь измеряют в квадратных единицах (см^2 , м^2 и т.д.). Если задача разбивается на несколько промежутков, нужно отдельно проверить, где $f(x)$ положительна, а где отрицательна.

Сравнение способов нахождения площади

Диаграмма отражает, что разные методы дают результат разной точности: простые оценки быстрее, но менее точны, а точный интеграл — универсален и наиболее надёжен при наличии первообразной.

Когда доступна первообразная, формула Ньютона–Лейбница обеспечивает точное значение без предельных построений; численные методы полезны, но требуют контроля погрешности.

Сравнение качественных свойств методов из школьного курса (10 класс); точность приведена в относительном порядке, без численных экспериментов.

Площадь криволинейной трапеции — это интеграл

Площадь на $[a,b]$ выражается определённым интегралом, если $f(x) \geq 0$. Если график пересекает Ox , площадь находят по частям с учётом знаков. Так интеграл превращает кривую в точный численный результат.