

Общий обзор: Класс Саркодовые (Корненожки)

Одноклеточные простейшие с ложноножками для движения и питания.



Происхождение изучения корненожек и их роль в науке

В начале XIX века с появлением микроскопов учёные впервые описали корненожки. Немецкий зоолог К. фон Зиглер дал им название в 1835 году. Исследования этих организмов помогают определить возраст горных пород и оценивать экологическое состояние водоёмов.




Особенности строения корненожек



Гибкая форма тела

Корненожки не имеют постоянного очертания, так как их цитоплазма непрерывно меняет положение. Это позволяет им образовывать различные формы и реагировать на окружающую среду.



Органоиды клетки

Внутри клетки находятся одно или несколько ядер, пищеварительные вакуоли, в которых происходит переработка пищи, и сократительные вакуоли для удаления излишков воды.



Функция ложноножек

Основной способ передвижения и питания — это образование временных выростов, называемых ложноножками, которые образуются благодаря вытеканию цитоплазмы и обеспечивают захват пищи.

Роль ложноножек: строение и функции

- Ложноножки формируются путём перемещения цитоплазмы к определённым участкам клетки, что позволяет организму менять форму и осуществлять движения.

- Основные функции ложноножек включают захват и окружение пищи, передвижение, а также восприятие и реакцию на внешние раздражители.

- Существуют плазмодигальные, нитевидные и листовидные формы ложноножек, отражающие разнообразие адаптаций к разным условиям среды.

Механизмы питания корненожек



Поглощение пищи через фагоцитоз

Корненожки используют ложноножки для охвата пищи, создавая вакуоли, где продукты перерабатываются. Этот метод позволяет поедать бактерии, водоросли и мелкие частицы.



Примеры в природе

Часто наблюдается, как амёбы обволакивают одноклеточные водоросли или бактерии, затягивая их внутрь для переваривания в пищеварительных вакуолях.

Среда обитания и распространение корненожек

Разнообразие местообитаний

Корненожки встречаются в пресноводных и морских водоёмах, почвах и влажных средах по всему земному шару, от тропиков до полярных регионов.

Адаптивные механизмы выживания

Формирование цист помогает им переносить неблагоприятные условия, такие как засуха или холод, обеспечивая широкое географическое распространение.



Группы корненожек: классификация и примеры

Амёбы обладают простым телом без раковины и используют гибкие ложноножки для движения и питания.

Фораминиферы отличаются многокамерными известковыми раковинами, обитают в морской среде и важны для палеонтологии.

Радиолярии имеют сложные кремнезёмные скелеты с радиальной симметрией и встречаются главным образом в морском планктоне.

Солнечники образуют радиально-лучистые структуры и часто вступают в симбиоз с микроскопическими водорослями, получая питание.

Численность видов в основных группах корненожек

Данные отражают значительный видовой состав фораминифер, играющих ключевую роль в морских экосистемах.

Фораминиферы доминируют по численности видов, за ними следуют радиолярии и солнечники.

Международный справочник по простейшим, 2020

Амёба обыкновенная: строение и образ жизни

- Амёба имеет изменчивую форму с одним округлым ядром и сократительными вакуолями, обеспечивающими водный баланс клетки.

- Обитает на илистом дне водоёмов, используя ложноножки для перемещения и поглощения микроорганизмов и частиц органики.



Фораминиферы: особенности строения и значение

Многокамерные известковые раковины фораминифер варьируются от 0,2 до 20 мм и обеспечивают защиту клетки.


Обитают преимущественно в морских водах, формируя крупные осадочные отложения, такие как меловые пласты.

Широко используются в палеонтологии для датирования и поиска полезных ископаемых в осадочных породах.

Радиолярии: сложность скелета и экология

Радиолярии обладают прочным кремнезёмистым скелетом с характерной радиальной симметрией. Их размеры варьируются от 50 до 300 микрометров, что позволяет им уверенно удерживаться в морском планктоне.

Эти организмы активно участвуют в круговороте кремния в морях и океанах. Более 5 000 видов радиолярий предпочитают преимущественно тёплые воды, где они образуют важную часть экосистемы.



Сравнительная таблица: Амёба и Фораминифера

В таблице представлены ключевые отличия между амёбой и фораминиферой по основным биологическим характеристикам и среде обитания.

Амёбы и фораминиферы различаются по строению, числу ядер и среде обитания, что отражает их адаптацию к разным условиям и ролям в экосистемах.

Учебник биологии для 7 класса, 2022

Параметр	Амёба	Фораминифера
Наличие раковины	Отсутствует	Присутствует
Число ядер	Одно	Несколько
Среда обитания	Пресная вода	Морская вода
Размер клетки	До 600 мкм	До 20 мм

Размножение у корненожек


Основной способ размножения корненожек — бесполое деление клетки пополам, что обеспечивает быстрое увеличение их численности в благоприятных условиях.

Некоторые виды образуют споры, позволяющие выживать при неблагоприятных воздействиях, таких как засуха или низкие температуры.

У части корненожек наблюдаются половые процессы, способствующие генетическому разнообразию и адаптации к изменяющейся среде.

Жизненный цикл корненожки

Основные стадии существования корненожки с возможными переходами при изменении условий среды



Влияние корненожек на природные процессы



Разложение органики в водных экосистемах

Корненожки активно разлагают органические вещества, способствуя минерализации в илах и почвах. Это важный этап поддержания баланса питательных веществ в экосистемах водоёмов.



Формирование осадочных пород морей

Фораминиферы откладывают известковые раковины, которые со временем образуют меловые породы. Радиолярии участвуют в круговороте кремния, поддерживая химический состав моря.

Взаимодействие корненожек с другими организмами

Многие корненожки охотятся на бактерии и микроскопические водоросли, контролируя их популяцию и поддерживая баланс в микробных сообществах.

Некоторые виды вступают в симбиоз с одноклеточными водорослями, обмениваясь питательными веществами и улучшая выживаемость обоих организмов.

Паразитические формы могут вызывать заболевания у животных и человека, влияя на здоровье и динамику популяций.

Корненожки играют роль пищевого звена в цепях питания, обеспечивая пищу для более крупных организмов в водных и почвенных экосистемах.

Паразитические саркодовые: патогенные примеры

- Энтамёба гистолитика является возбудителем амёбиаза у человека, поражая слизистую кишечника и вызывая серьёзные заболевания.

- Некоторые фораминиферы паразитируют на морских губках, иногда приводя к ухудшению здоровья морских организмов и влияя на экосистемы.



Распределение численности корненожек по типам экосистем

Большинство корненожек предпочитают морские среды, где разнообразие видов наиболее богато. Почвенные и паразитические формы составляют меньшую долю коллектива.

Преобладание морских видов отражает богатство и сложность этих экосистем, а паразитические и почвенные формы занимают специализированные экологические ниши.

Журнал «Биология и среда обитания», 2021

Значение корненожек для науки и экономики

- Корненожки применяются как биоиндикаторы чистоты воды, позволяя оценивать экологическое состояние водоёмов и выявлять загрязнения на ранних стадиях.

- Фораминиферы важны для нефтегазовой промышленности, так как их известковые раковины помогают датировать породы и обнаруживать залежи полезных ископаемых.

- Радиолярии используются в палеоклиматологии, позволяя восстанавливать климатические условия далёкого прошлого по образцам осадочных пород.



Ключевая роль корненожек в природе и науке

Корненожки являются незаменимыми участниками экосистем, влияя на процессы минерализации, пищевые сети и формирование осадков, а также играют важную роль в научных исследованиях и практических применениях.