

Тип кишечнополостны е: особенности и гидра

Рассмотрим уникальных животных с радиальной симметрией — кишечнополостных.



Происхождение и эволюция кишечнополостных

- Кишечнополостные — древнейшая группа животных, описанная впервые в XVIII веке. Эти организмы населяют пресные и морские воды, насчитывая около 10 000 видов.



Основные классы кишечнополостных



Гидроидные — пресноводные и морские представители, включая гидру с её простым строением и способностью к почкованию.



Сцифоидные — морские медузы, свободноплавающие с выраженной метаморфозой и полным половым циклом развития.



Коралловые полипы — колониальные морские организмы, строящие рифы и обладающие особым типом почкования и регенерации.

Внешнее строение гидры



Цилиндрическое тело

Гидра имеет тело цилиндрической формы длиной до 2 см, заканчивается ротовым отверстием, окружённым до 12 щупалец. Такая форма облегчает захват добычи.



Щупальца и подошва

Щупальца вооружены стрекательными клетками для захвата пищи. Подошва служит для прикрепления к субстрату и позволяет ползать по поверхности.



Окраска и прозрачность

Гидра может быть зелёной благодаря симбиотическим зоохлореллам, коричневой или прозрачной, что обеспечивает камуфляж в различных местах обитания.

Среда обитания и жизненные формы гидры



Гидра обитает в пресноводных водоемах с медленным течением — прудах, озёрах и небольших реках, предпочитая прикрепление к растениям и камням.



Представлена одиночными полипами, не образующими колонии, что отличает её от некоторых морских родственников.



Активна преимущественно в тёплое время года, зимой гидра впадает в состояние анабиоза для выживания в неблагоприятных условиях.

Географическое распространение видов гидр


Наибольшее разнообразие гидр наблюдается в умеренных широтах, что связано с оптимальными условиями обитания.

Умеренные широты являются центром видового разнообразия гидр, тогда как тропики и южное полушарие характеризуются меньшим числом видов.

Данные собраны по результатам гидробиологических исследований, 2022 год




Клеточные слои в строении гидры



Эктодерма — внешний слой

Состоит из эпителиально-мускульных, нервных и стрекательных клеток, обеспечивая защиту, движение и восприятие раздражений.



Энтодерма — внутренний слой

Содержит пищеварительно-мускульные и железистые клетки, отвечающие за переваривание пищи и всасывание питательных веществ.



Мезоглея — промежуточная прослойка

Гелеобразная масса между слоями, придающая телу гидры упругость и способствующая распределению питательных веществ.



12 000

такое количество стрекательных клеток может
содержаться на одном щупальце гидры для
защиты и поимки добычи.

Стрекательные клетки мгновенно выбрасывают ядовитые нити,
парализуя мелких животных и защищая гидру от хищников.

Лабораторные данные по микроскопии гидры, 2023

Пищеварительная система гидры



Гастральная полость как пищеварительный центр

Пища попадает в гастральную полость, где начинается её расщепление ферментами, выделяемыми клетками внутреннего слоя.



Полостное и внутриклеточное пищеварение

Сначала пища разлагается вне клеток, затем мелкие частицы усваиваются внутри клеток энтодермы, обеспечивая эффективное питание.




Роль щупалец в приёме пищи

Щупальца захватывают добычу и направляют в рот, обеспечивая начало процесса пищеварения и защищая гидру с помощью стрекательных клеток.

Процесс питания гидры

Схематическое изображение этапов поимки и переработки пищи



Движения и раздражимость гидры



Гидра способна изменять форму тела, сокращаясь и удлиняясь благодаря деятельности эпителиально-мускульных клеток, что помогает ей эффективно реагировать на окружающую среду.



Для передвижения гидра ползает, используя подошву, может совершать перевороты, что обеспечивает ей адаптацию в пресных водоёмах и позволяет быстро менять место обитания.



Реакция на внешние раздражители обеспечивается сетчатой нервной системой, которая координирует движение и позволяет гидре быстро реагировать на прикосновения и изменения среды.

Нервная система и её роль в поведении гидры



Сетчатая нервная система гидры

Гидра обладает ретикулярной нервной системой, состоящей из разбросанных по телу нервных клеток, соединённых сетью волокон. Эта система позволяет координировать движения и быстро реагировать на внешние раздражители без централизованного мозга.



Чувствительность к свету и химическим сигналам

Нервные клетки гидры воспринимают световые и химические раздражители, что помогает ориентироваться в среде обитания и находить пищу. Эта специфическая чувствительность регулирует поведение животного и его реакцию на изменяющиеся условия.



Отсутствие централизованного головного мозга

В гидре нет головного мозга или централизованных нервных структур. Все жизненные реакции обеспечиваются распределённой нервной сетью, что характерно для многих простейших многоклеточных организмов.

Дыхание и выделение у гидры



Гидра дышит путём диффузии кислорода через всю поверхность тела, что эффективно благодаря небольшим размерам и тонкой стенке тела.



Обмен газов происходит без специализированных органов, что упрощает строение и хорошо подходит для жизни в пресных водоёмах.



Выведение продуктов обмена также осуществляется диффузно, позволяя гидре поддерживать гомеостаз без выделительных систем.

Сравнение гидры с другими кишечнополостными

Класс	Среда обитания	Тип организма	Размножение
Гидроидные (гидра)	Пресная вода	Одиночные полипы	Почкование, половой осенью
Сцифоидные (медузы)	Морская вода	Свободноплавающие	Половое с метаморфозом
Коралловые полипы	Морская вода	Колонии	Почкование, образование рифов

— Таблица демонстрирует особенности гидроидных, сцифоидных и коралловых полипов в строении, среде обитания и способах размножения.

Гидры отличаются простотой и высокой регенеративной способностью, в отличие от медуз и кораллов с более сложным строением и разным образом жизни.

— Современные биологические исследования кишечнополостных

Бесполое размножение гидры: почкование



При благоприятных условиях на теле гидры образуется вырост — почка, которая развивается и формирует рот и щупальца перед отделением.



Через 2–3 дня молодая гидра отделяется от родителя и начинает самостоятельную жизнь, быстро увеличивая численность популяции в тёплое время года.



Почкование обеспечивает эффективное размножение без участия половых клеток, позволяя гидре быстро колонизировать доступные водоёмы.

Половое размножение у гидры

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.

Осенью у гидры формируются мужские и женские половые клетки, что приводит к оплодотворению и образованию зиготы.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.

Оплодотворённая яйцеклетка покрыта плотной оболочкой, которая защищает её в течение зимы и способствует выживанию потомства до наступления весны.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.

Половое размножение обеспечивает генетическую разнообразность, что повышает адаптационные возможности вида в изменяющихся условиях среды.

Уникальная способность гидры к регенерации



Быстрое восстановление утраченных частей

Гидра способна полностью восстанавливать повреждённые или утраченные части тела всего за несколько дней. Эта способность обусловлена наличием суммарных клеток с высокой регенеративной активностью.



Регенерация небольших фрагментов

Разделённые на несколько частей гидры фрагменты способны развиваться в полноценные особи. Такой процесс интересен исследователям в области регенеративной биологии и медицины.



Изучение регенерации для медицины

Способность гидры регенерировать ткани помогает учёным понять механизмы восстановления клеток, что имеет потенциал для развития новых методов лечения и репаративной медицины.

Экологическая роль гидры в водоёме



Гидра контролирует численность мелких беспозвоночных, включая дафний и других микроскопических животных, влияя на структуру сообщества.



Она служит пищей для рыб и водных насекомых, являясь звеном пищевой цепи в пресноводных экосистемах.



За счёт своей роли гидра способствует поддержанию биологического равновесия и здоровья водоёмов, влияя на качество воды и биоразнообразие.

Практическое значение и исследовательское использование



Гидра широко применяется в лабораторных исследованиях, особенно в изучении процессов регенерации и развития у многоклеточных организмов.



Её нервная система и поведение служат моделями для понимания работы более сложных систем у высших животных.



Данные, получаемые в экспериментах с гидрой, помогают раскрыть основы эволюции, клеточной биологии и возрастных изменений.



Значение гидры для науки и биологии

Гидра является уникальным примером древнего животного с выдающимися способностями, важным для понимания биологических процессов и развития современных научных направлений в медицине и экологии.