



# Взаимодействие неаллельных генов: как наследуются сложные признаки

Гены работают вместе, и фенотип часто  
сложнее менделевских схем.



# Почему наследование бывает сложнее ожидаемого

Один признак нередко определяется несколькими генами, их биохимическими связями и влиянием среды. Поэтому окраска, форма, рост и масса тела могут наследоваться не по простым правилам доминантности и рецессивности.



# Понятие неаллельных генов

## Разные локусы

Неаллельные гены находятся в разных участках одной хромосомы или на разных хромосомах. Именно поэтому они наследуются независимо по положению, но могут совместно влиять на один и тот же признак.

## Совместное действие

Такие гены способны дополнять, усиливать или ослаблять эффект друг друга. В результате конечный фенотип определяется не отдельным геном, а их сочетанием и взаимодействием аллелей.

## Не один признак — не один ген

Для сложных признаков обычно важны сразу несколько генов, а также их доминантные и рецессивные варианты. Поэтому одинаковый фенотип может возникать у разных генотипов.

## Отклонение от классики

Именно взаимодействие неаллельных генов объясняет появление необычных соотношений потомства, которые не совпадают с классическими менделевскими расщеплениями 3:1 и 9:3:3:1.



# Молекулярная основа взаимодействия генов

1

## Ген и продукт

Каждый ген обычно кодирует белок, чаще всего фермент или регуляторный белок. Этот продукт запускает определённый этап превращений, необходимых для формирования признака.

2

## Общий биохимический путь

Если несколько генов участвуют в одной цепочке реакций, то результат зависит от работы каждого звена. Сбой на любом этапе меняет конечное проявление признака.

3

## Последовательность событий

Схему удобно представить как цепь: ген — белок — биохимическая реакция — признак. Такая логика помогает понять, почему изменение одного звена влияет на весь результат.

4


## Почему проявление меняется

Когда один из ферментов не синтезируется или работает слабее, вещество либо не образуется, либо накапливается в другом виде. Тогда фенотип становится иным, хотя сам ген присутствует.



# Основные типы взаимодействия неаллельных генов

Схема показывает, как совместная работа генов меняет проявление одного признака.



# 9:7

показывает, что признак возникает только при одновременном наличии двух необходимых доминантных генов.

Учебные примеры по генетике; классический пример комплементарности у душистого горошка


Такое расщепление особенно хорошо видно у душистого горошка: отсутствие хотя бы одного доминантного аллеля в нужной паре блокирует формирование окраски.

# Расщепление при комплементарности в F2

Даже небольшое изменение генотипа в одной из пар может полностью убрать признак. Это показывает, что для результата нужны оба доминантных аллеля.



Соотношение 9:7 подтверждает совместную необходимость двух генов: без любого из них фенотип не формируется.



Классический пример комплементарности в F2

# Эпистаз: подавление действия другого гена



## Эпистатический ген

Это ген, который подавляет или маскирует проявление другого гена. Он определяет, будет ли вообще заметен результат работы гипостатического гена.



## Гипостатический ген

Так называют ген, действие которого перекрывается другим. Он может присутствовать в генотипе, но не проявляться в фенотипе из-за влияния эпистатического аллеля.



## Два варианта эпистаза

Доминантный эпистаз проявляется уже одной доминантной аллелью, а рецессивный — только в гомозиготном состоянии. Оба типа нарушают обычные менделевские пропорции.

# Типы эпистаза и характерные расщепления

| Тип              | Расщепление | Смысл                   |
|------------------|-------------|-------------------------|
| Доминантный      | 12:3:1      | Одна аллель подавляет   |
| Рецессивный      | 9:3:4       | Подавление в гомозиготе |
| Генерализованный | отклонение  | Меняет фенотип          |



Сравнение показывает, как тип подавления влияет на фенотипическое расщепление и позволяет различать варианты эпистаза в генетических задачах.

Характер расщепления — главный признак эпистаза: он позволяет отличать доминантное подавление от рецессивного и интерпретировать генотипы потомства.

# Полимерия: накопительный эффект нескольких генов

1

## Один признак — много генов

При полимерии несколько неаллельных генов действуют в одном направлении. Каждый доминантный аллель немного усиливает проявление признака, поэтому итог зависит от их общего числа.

2

## Накопление эффекта

Чем больше в генотипе доминантных аллелей, тем сильнее выражен признак. Такой механизм делает наследование постепенным, а не резко разделённым на два варианта.

3

## Количественные признаки

По полигенному типу наследуются рост, масса тела, окраска кожи, длина колоса, урожайность и другие признаки, у которых различия между особями выражены плавно.

4

## Почему это важно


Полимерия помогает объяснить, почему в популяции много промежуточных вариантов и почему на итоговый фенотип заметно влияет среда, а не только наследственность.

# Полигенное наследование и непрерывная изменчивость

Такой график отражает не резкие классы, а плавный переход значений. Для количественных признаков именно средние варианты встречаются чаще всего.



Распределение близко к нормальному: чем больше вовлечено генов и факторов среды, тем менее заметны крайние фенотипы.



Схематическая диаграмма по материалам школьного курса генетики

# Как модификаторы меняют проявление признака

## 1 Один ген — разная интенсивность

Иногда основной ген уже задаёт признак, но его «яркость» меняется под действием другого участка ДНК. Один и тот же фенотип становится заметно сильнее или слабее, хотя полностью не исчезает. Именно так объясняют различия в окраске, размере и выраженности признака.



## 2 Когда фон важнее детали

Модифицирующие гены особенно наглядны там, где важна степень проявления, а не просто наличие признака. Внешне это может выглядеть как более насыщенная окраска, меньший размер органа или иная устойчивость к стрессу. Сама основа признака остаётся прежней.




## 3 Тихая настройка наследственности

Такие гены редко действуют как главный переключатель. Скорее, они работают как тонкая настройка: усиливают, ослабляют или сглаживают эффект основного гена. Поэтому одинаковый генотип не всегда даёт абсолютно одинаковый внешний результат у разных организмов.



# Как распознать тип взаимодействия по расщеплению



1

## Шаг 1. Смотрим на F2

Сначала сопоставляют фенотипы потомков во втором поколении. Именно соотношение классов чаще всего подсказывает, есть ли комплементарность, эпистаз, полимерия или другой тип взаимодействия.

2

## Шаг 2. Ищем характерное число

Соотношения 9:7, 12:3:1, 9:3:4 и 15:1 служат ориентиром. Если расщепление совпадает с одним из них, можно предположить конкретный механизм взаимодействия неаллельных генов.

3

## Шаг 3. Проверяем родителей и F1

Далее анализируют генотипы родителей, фенотип гибридов первого поколения и типы гамет. Эти данные помогают понять, какие аллели должны сочетаться, чтобы возник именно такой результат.


4

## Шаг 4. Сверяем гипотезу

Последний этап — проверка схемы скрещивания. Если теоретическое расщепление совпадает с наблюдаемым, выбранный тип взаимодействия можно считать верно определённым.

# Пошаговое решение генетической задачи

Алгоритм построен на анализе фенотипического расщепления в F2 и последовательной проверке генетической гипотезы.



# Классические расщепления при разных типах взаимодействия

Сопоставление помогает быстро узнавать механизм наследования по фенотипическому соотношению в потомстве.



Характер расщепления позволяет отличить один тип взаимодействия от другого без сложных молекулярных данных.

| Тип                 | Расщепление | Смысл              |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Комплементарность   | 9:7         | нужны 2 гена       |
| Доминантный эпистаз | 12:3:1      | один ген маскирует |

# Где это знание особенно полезно



## Селекция растений

Знание взаимодействия генов помогает отбирать растения по урожайности, размеру плодов, окраске и устойчивости к болезням, не ограничиваясь одним признаком.



## Разведение животных

В животноводстве это важно при подборе особей по окраске шерсти, форме гребня, жизнеспособности и другим признакам, зависящим от нескольких генов.



## Медицина

В медицине полигенные и взаимодействующие гены помогают объяснять наследственную предрасположенность к заболеваниям, а не только редкие моногенные нарушения.



## Человек и среда

Для человека особенно значимы рост, масса тела и ряд физиологических признаков: их проявление зависит и от генотипа, и от образа жизни.

# Примеры из природы и хозяйства

## Душистый горошек

Классический учебный пример комплементарности: окраска цветков появляется только при совместном действии двух доминантных генов. Поэтому в потомстве возникают неожиданные для Менделя соотношения.

## Куры

Форма гребня у кур зависит от взаимодействия неаллельных генов. Разные комбинации аллелей дают различные варианты гребня, что удобно использовать в генетических задачах.

## Кукуруза и горох

У этих культур хорошо изучены признаки, связанные с окраской, формой и развитием семян. Такие примеры показывают, как полигенные и эпистатические эффекты проявляются в сельском хозяйстве.

## Человек и животные

У человека, собак и других животных неаллельное взаимодействие связано с окраской, ростом и особенностями развития. Это подчёркивает, что подобные механизмы универсальны для живой природы.




# Роль среды в проявлении полигенных признаков

Генотип задаёт пределы изменчивости, но внутри этих границ условия жизни могут заметно смещать итоговый показатель признака.



Чем сложнее признак, тем сильнее заметно совместное действие наследственности и среды; поэтому одинаковый генотип не гарантирует одинаковый фенотип.



Схематическая диаграмма по материалам школьного курса биологии

# Главное, что нужно запомнить

## Признак формируют несколько генов

Неаллельные гены работают совместно, поэтому один и тот же фенотип может быть результатом разных генотипических сочетаний, а не действия одного единственного гена.

## Есть несколько механизмов

Комплементарность, эпистаз, полимерия и модифицирующее действие объясняют разные варианты наследования. Каждый механизм по-своему изменяет итоговое проявление признака.

## Расщепление не всегда менделевское

Если в задаче появляются соотношения 9:7, 12:3:1, 9:3:4 или 15:1, это сигнал искать взаимодействие генов, а не обычное доминирование.

## Среда тоже важна

Для многих признаков генотип лишь задаёт диапазон возможных значений. Конкретный результат формируется под влиянием питания, условий жизни, здоровья и других факторов.



# Взаимодействие генов: основа сложной наследственности

Неаллельные гены показывают, что наследственность — это система взаимосвязей, а не набор отдельных правил. Именно поэтому признаки живых организмов часто наследуются сложнее, чем в простых менделевских схемах.

