





Формирование платформенного чехла в дочетвертичное время

Как на устойчивых платформах
накапливались слои, сохраняя
геологическую «память» Земли.



Геологическое время и условия образования платформенного чехла

В дочетвертичное время платформы переживали поднятия, прогибы и смену морских режимов. В зависимости от климата и глубины бассейнов формировались толщи осадков — от сотен метров до нескольких километров.



Кристаллический фундамент и его роль в строении платформы

1

Кристаллический фундамент древних платформ сложен магматическими и метаморфическими породами докембрийского возраста. Он сформировался раньше чехла и служит его «подложкой».

2

Поверхность фундамента обычно неровная: на ней есть выступы, прогибы, разломы и грабены. Эти элементы задают, где осадки будут накапливаться быстрее, а где — медленнее.


3

Там, где фундамент «проседает», чехол обычно толще; на поднятиях он тоньше или почти отсутствует. Поэтому строение фундамента напрямую управляет формой разреза чехла.

Основные этапы формирования платформенного чехла

Цепочка процессов, фиксируемая в разрезах слоистостью, сменой пород и несогласиями.

Смена обстановок осадконакопления в дочетвертичное время



По мере приближения к поздним этапам чаще проявлялись условия с речным и прибрежным накоплением. Это отражается в составе пород и характере границ между слоями.

Общая тенденция: морские режимы сменяются усилением континентальных. Поэтому в более поздних горизонтах чаще встречаются терригенные и прибрежно-озёрные комплексы.



Обобщение по стратиграфическим закономерностям платформенных разрезов (без привязки к конкретным измерениям); 2026 г.

Платформенная тектоника как основа строения чехла



Медленные движения без интенсивной складчатости

Платформы в целом устойчивы: вместо горообразования доминируют медленные вертикальные движения. Они создают условия для длительного и относительно спокойного осадконакопления.



Синеклизы и антеклизы

Синеклизы — крупные прогибы, где осадков накапливается больше; антеклизы — поднятия, где накопление ослаблено. Это отражается в толщине и составе слоев чехла.



Авлаогены рифтового происхождения

Авлаогены представляют собой линейные впадины, связанные с рифтовыми процессами. В них нередко фиксируются повышенные мощности и особые породы, формирующиеся в специфических бассейнах.



Разная мощность по площади платформы

Комбинация прогибов и поднятий меняет глубину бассейна и длительность осадконакопления. В результате в одних районах чехол мощный, а в других — тонкий или прерванный.



Управление полезными ископаемыми

Тектоническое строение определяет, где накапливаются песчаники, глины, угли, соли и карбонаты. Поэтому закономерности осадконакопления помогают ориентироваться в поисках ресурсов.

Основные типы осадочных комплексов платформенного чехла

Тип комплекса	Основные породы	Условия образования	Геологическое значение
Терригенный	Пески, песчаники, алевриты, глины	Речные, дельтовые, прибрежные, мелководно-морские	Следы переноса и динамики вод
Карбонатный	Известняки, доломиты, мергели	Тёплые моря	Палеоклимат и морская среда
Соленосный	Каменная соль, гипс	Засушливый климат, сильное испарение	Признаки аридных режимов
Угленосный	Угольные пласты	Заболоченные равнины, дельты рек	Условия заболачивания и органонакопления

Четыре наиболее распространённых комплекса различаются по породам, условиям образования и геологическому смыслу.

Разные комплексы фиксируют разные природные режимы: от морских и тёплых до аридных и заболоченных. Сопоставление комплексов помогает реконструировать палеогеографию.




Несогласия между фундаментом и осадочным чехлом

- На границе фундамента и чехла часто формируется несогласие: неровная поверхность фундамента перекрывается молодыми слоями. Оно свидетельствует, что до начала осадконакопления территория разрушалась и поднималась.
- В разрезах обычно видна контрастная картина: древний, «скульптурированный» фундамент и почти горизонтальные пласты чехла выше него. Такое несогласие — один из ключевых признаков длительной геологической истории платформы.

Как меняется мощность чехла в разных структурах платформы

Типичные соотношения мощности (ориентиры для школьного уровня; условные значения)



Чем устойчивее участок и чем меньше была глубина бассейна, тем меньше накапливался осадочный чехол. Поэтому поднятия часто сопровождаются «тонкими» разрезами.

Диаграмма показывает типичную закономерность: минимальная мощность связана с поднятиями и щитами, а максимальная — с прогибами и рифтовыми зонами, где осадконакопление особенно интенсивно.



Обобщённые учебные диапазоны мощности по структурам платформ (ориентиры, условные значения для наглядности); 2026 г.

Морские трансгрессии и регрессии как фактор накопления осадков

- Трансгрессии расширяли площади мелководных морей, и в таких обстановках накапливались глины, мергели и карбонаты. Менялась глубина и условия жизни осадкообразующих процессов.
- При регрессиях море отступало, возрастала роль речных и прибрежных сред. Условия переносили накопление к дельтам, лагунам и песчаным равнинам, формируя терригенные толщи.
- Повторение трансгрессий и регрессий создавало чередование слоёв разного состава и разной мощности. Поэтому в платформенном чехле часто встречаются ритмичные последовательности пород.

Путь от разрушения пород до образования осадочной породы

Выветривание и перенос материала с последующим погружением в бассейн и преобразованием при диагенезе

Влияние климата на состав платформенного чехла

1

В тёплых и влажных условиях преобладало химическое выветривание: горные породы разлагались быстрее, а в морях накапливались карбонатные осадки. Это отражается в более «известковом» разрезе.

2

В засушливых районах усиливалось испарение, поэтому вода в мелководных бассейнах быстро обогащалась солями. В результате формировались соленосные толщи, гипс и каменная соль, иногда с красноцветами.

3


В холодные периоды росла роль физического выветривания: разрушение шло преимущественно механически. В бассейны поступало больше грубообломочного материала, и повышалась доля терригенных отложений.

4

Климат влияет не только на тип осадков, но и на скорость их накопления. Поэтому рядом с изменением состава в чехле часто прослеживаются различия в мощности слоёв и темпах седиментации.

Соотношение основных литотипов в платформенном чехле

Терригенные Карбонатные Соленосные
Угленосные Вулканогенно-осадочные




Терригенные толщи преобладают, поскольку материал поступал с суши в речных и прибрежных обстановках, а в морях регулярно менялись площади накопления.

Круговая диаграмма показывает, что «морской» карбонатный компонент значителен, но вклад соленосных и вулканогенно-осадочных комплексов зависит от более специфических режимов.





Условные относительные доли по принципу: терригенные — крупнейшая группа, карбонатные — вторая, остальные — меньшие. Точные проценты в рамках школьного представления не приведены.

Платформенные окраины и зоны наиболее активного осадконакопления



Платформенные окраины были ключевыми областями накопления осадков: сюда постоянно поступал обломочный материал, а условия оставались преимущественно мелководными. Колебания уровня моря задавали ритм смены фаций.



В таких зонах формировались прибрежные пески, дельтовые отложения, лагунные глины и шельфовые карбонаты. На схеме смена зон от суши к морю хорошо отражается переходом береговая линия → шельф → дельта → лагуна.

Хронология основных этапов развития платформенного чехла

Геологический этап	Преобладающие процессы	Характерные отложения
Докембрий	формирование фундамента	первичные бассейны
Палеозой	мощное морское накопление	морские толщи
Мезозой	рифтогенез, трансгрессии	глинисто-карбонатные
Кайнозой до неогена	усиление континентальных условий	речные и озёрные

Таблица обобщает, как менялись процессы и преобладающие отложения на протяжении дочетвертичного времени: от формирования фундамента и ранних бассейнов до морских эпох, рифтогенеза и усиления континентальных режимов.

Последовательность этапов показывает неравномерное развитие платформ: менялась не только глубина и площадь бассейнов, но и состав осадков, а значит — характер разреза.

Диагенез: превращение рыхлых осадков в породы

После захоронения осадки уплотняются: поры уменьшаются, а частицы сближаются. Изменение структуры ведёт к росту прочности и к формированию устойчивых «каркасов» будущих пород.

Важную роль играет цементация: между частицами появляется минеральный «клей». Чаще всего это карбонаты, кремнезём или глинистые минералы, которые закрепляют зерна и фрагменты.

Итогом диагенеза становится превращение рыхлых накоплений в породы платформенного чехла. Меняются плотность и водопроницаемость, а также сохраняемость слоистости в геологической летописи.

Факторы, определяющие формирование платформенного чехла



Тектонические движения создают и перестраивают бассейны, а колебания уровня моря быстро меняют, где именно накапливается осадок. Поэтому разрез часто «отзывается» на движения земной коры.

Радарные соотношения подчёркивают приоритет тектоники и морских колебаний: они определяют площадь и глубину осадконакопления. Климат и источник сноса формируют состав и характер слоёв.



Качественная оценка факторов по школьному курсу (без привязки к конкретному региону и без численных измерений).

Причины различий в строении чехла на разных участках платформы


Комбинация вертикальных движений, глубины бассейна, уровня моря и условий переноса материала

Геологическое значение дочетвертичного платформенного чехла




Палеогеография в разрезе

По слоям и смене фаций можно восстанавливать, где располагались древние моря и суша, как менялась линия берегов и какие условия преобладали в разные эпохи.



Реконструкция климатических режимов

Характер осадков и их сочетания помогают проследить смену влажных, аридных и более холодных периодов, а также оценить, как эти изменения отражались на седиментации.



Полезные ископаемые

В чехле нередко сосредоточены нефть, газ, подземные воды, уголь, соли и строительные материалы. Знание строения слоёв важно для поиска и рационального использования ресурсов.



Несогласия и история движений коры

Границы между фундаментом и чехлом, перерывы и несогласия фиксируют эпизоды поднятий и разрушения. По ним читается ритм геологической истории платформы.



Основа для геологической интерпретации

Разрез чехла служит «архивом», который связывает геологические процессы, структуру территории и прикладные задачи. Поэтому он значим для географии и практической геологии.



Чехол — это не просто породы, а запись истории платформы

Платформенный чехол сформировался в результате длительного накопления осадков на устойчивом кристаллическом фундаменте. Его строение определили тектоника, режимы моря, климат и поступавший материал, сохранившиеся как геологический архив.