


Многочлен и его стандартный вид

Разберём, как записывать многочлены понятно и без лишних слагаемых.



Почему стандартный вид упрощает работу с многочленами



Стандартная запись помогает быстро сравнивать многочлены, находить их степень и замечать одинаковые слагаемые. Это основа для упрощения выражений, действий с многочленами и дальнейшей алгебры.

Что такое многочлен

Сложная запись из одночленов



Многочлен составляют несколько одночленов, соединённых знаками сложения и вычитания. Каждый член сохраняет свою числовую часть, буквы и степень переменной.

Примеры записи



К многочленам относятся выражения $5x^2 - 3x + 1$, $2a^3 + b$ и $7m - 4$. Они показывают, что многочлен может содержать разные степени и даже свободный член.

Одна переменная



В 7 классе чаще всего рассматривают многочлены с одной переменной. Это удобно для освоения правил приведения подобных членов, вычислений и преобразования выражений.

Из чего состоит член



Каждый одночлен в составе многочлена включает коэффициент, буквенную часть и степень. По этим признакам легко определить роль каждого слагаемого в записи.



Одночлен, двучлен, трёхчлен

01

Один член

Если в записи только одно слагаемое, это одночлен. Пример: $8x^3$. Название зависит не от степени и не от коэффициента, а только от количества членов.

02

Два члена

Если многочлен состоит из двух частей, он называется двучленом. Например, $3x-5$ — это двучлен, хотя его члены могут иметь разную степень и разные знаки.

03

Три члена

Запись из трёх слагаемых называют трёхчленом. Например, x^2+2x+1 . Такое деление помогает быстрее понимать структуру выражения и его состав.

Признаки стандартного вида

Порядок по степеням

Слагаемые располагают по убыванию степеней: от старших к младшим. Так легче увидеть главный член и быстро определить степень всего многочлена.

Понятная структура

Стандартный вид делает выражение аккуратным и удобным для вычислений. По нему проще проверить правильность записи и сравнить разные многочлены.


Нет одинаковых членов

В стандартном виде сначала убирают подобные члены, чтобы одно и то же слагаемое не повторялось. Тогда запись становится короче и понятнее.

Свободный член в конце

Число без буквы обычно ставят последним. Если какой-то степени в записи нет, это не ошибка, но её нужно учитывать при чтении многочлена.

Приведение подобных членов



01

Найти похожие слагаемые

Сначала определяют члены с одинаковой буквенной частью и одинаковой степенью. Только такие слагаемые можно объединять в одно.

02

Сложить коэффициенты

Затем складывают или вычитают числовые коэффициенты, а буквенная часть остаётся прежней. Например, $3x+5x=8x$, потому что меняется только число перед буквой.

03

Записать короче

После объединения подобных членов выражение становится компактнее. Это помогает быстрее выполнять дальнейшие действия и не запутаться в длинной записи.

Коэффициент и свободный член



Коэффициент

Коэффициент показывает, какое число стоит перед буквой. В $7x^2$ это 7, а в $-x$ коэффициент равен -1 , хотя цифра не написана явно.



Свободный член

Свободный член не содержит буквы и записывается как обычное число. Он часто стоит в конце многочлена и завершает стандартную запись.

Части многочлена на примере


На примере видно, как у каждого члена определяются степень, коэффициент и роль в записи многочлена.

Порядок по степеням помогает быстро выделять главные члены и читать многочлен без лишних трудностей.


Член	Степень	Коэффициент	Вид
$6x^4$	4	6	старший
$-3x^2$	2	-3	буквенный
x	1	1	буквенный
8	0	8	свободный

Как привести выражение к стандартному виду

Алгоритм преобразования многочлена по школьному курсу алгебры, 7 класс



После приведения подобных членов степень определяется по самому старшему одночлену. Для школьника это быстрый способ оценить сложность выражения.



3

— это наибольшая степень в многочлене $4x^3 - 2x + 7$.

Нулевые и пропущенные коэффициенты

01

Пропущенный член

Если в многочлене нет члена с какой-то степенью, значит его коэффициент равен нулю. Такой член не записывают, но при чтении выражения его всё равно учитывают.

02

Пример записи

В многочлене $5x^3 - x + 2$ при степени 2 отсутствует член x^2 , поэтому коэффициент при нём равен 0. Это помогает видеть структуру записи без лишних символов.

03


Зачем это нужно

Умение замечать нулевые коэффициенты важно при сравнении многочленов, определении их степени и проверке, все ли степени учтены в записи. Это делает работу точнее и быстрее.

Коэффициенты в одном многочлене

Диаграмма показывает, как коэффициенты распределяются по степеням многочлена и где находится пропущенный член с x^2 .

По графику сразу видно отсутствие члена при x^2 и отрицательный свободный член, что упрощает проверку записи.



Где встречаются многочлены

Формулы в геометрии



Многочлены часто используют в формулах площади и периметра, когда величина зависит от нескольких параметров. Такая запись позволяет удобно подставлять значения и выполнять вычисления без длинных повторов.

Задачи на движение




В задачах про путь, скорость и время многочлены помогают описывать изменение величин. Они особенно полезны, когда зависимость не постоянна, а меняется по условию задачи или модели.


Описание зависимостей



В алгебре и физике многочлены применяют для записи связи между величинами. Например, выражение вида $S=at^2+bt+c$ показывает, как одна величина изменяется в зависимости от времени.



Сложение и вычитание многочленов



01

Сначала скобки

При сложении или вычитании многочленов сначала раскрывают скобки. Это помогает увидеть все слагаемые отдельно и не потерять ни один член при дальнейших преобразованиях.

02

Найти подобные

Затем находят подобные члены: у них одинаковая буквенная часть и одинаковая степень. Только такие слагаемые можно складывать или вычитать, оставляя буквы без изменений.

03

Изменить знаки

Если из одного многочлена вычитают другой, то во второй скобке каждый знак меняется на противоположный. Эта операция особенно важна, чтобы не допустить ошибки при раскрытии.

04

Записать результат

После приведения подобных членов ответ записывают в стандартном виде. Так сразу видно, правильно ли упорядочены степени и нет ли одинаковых членов в итоговой записи.

Умножение одночлена на многочлен

1. Берём одночлен

01

Сначала определяют множитель перед скобкой. Он будет умножаться на каждый член многочлена, поэтому важно внимательно сохранить его знак и числовой коэффициент.

2. Умножаем каждый член

02

Одночлен умножают поочерёдно на все слагаемые в скобках. Это означает, что коэффициент и буквенная часть распределяются на каждый член без пропусков.

3. Следим за знаками

03

Если перед скобкой стоит минус, знаки всех членов внутри меняются на противоположные. Это самый частый момент, где школьники допускают ошибку.

4. Приводим к стандартному виду

04

После умножения результат упорядочивают по степеням и при необходимости приводят подобные члены. Так окончательная запись становится короткой, понятной и правильной.

Частые ошибки при работе с многочленами

Путают порядок степеней

Иногда многочлен записывают в случайном порядке, хотя в стандартном виде члены должны идти от большей степени к меньшей. Это мешает быстро проверить результат.

Ошибаются в коэффициентах

Нередко забывают, что у x коэффициент равен 1, а у свободного члена нет буквы. Также могут потерять число в конце или неверно записать x^0 .

Складывают разные члены

Нельзя объединять x^2 и x , потому что у них разная степень и разная буквенная часть. Складывают только подобные члены, иначе ответ будет неверным.

Забывают изменить знаки

При раскрытии скобок после знака минус часто забывают поменять знаки у всех членов. Из-за этого выражение становится неправильным уже на первом шаге.

Проверка записи многочлена

01

Сравнить степени

Сначала нужно посмотреть, нет ли одинаковых степеней у разных членов. Если такие члены есть, запись ещё не приведена к стандартному виду и требует упрощения.

02

Проверить порядок

Далее убеждаются, что члены расположены по убыванию степеней. Это помогает быстро читать многочлен и сразу видеть его старшие и младшие части.

03

Посмотреть на коэффициенты


После этого проверяют числовые коэффициенты и убеждаются, что ни один знак не потерян. Особенно внимательно стоит смотреть на коэффициенты при x и при свободном члене.

04

Оценить итог

Если подобных членов нет, порядок соблюден и все степени учтены, многочлен записан правильно. Такой способ проверки экономит время и помогает избежать ошибок в ответе.

Мини-примеры преобразования



01

Первый пример

В выражении $2x+7-3x^2+x^2-4$ сначала объединяют подобные члены: $-3x^2+x^2$ дают $-2x^2$, а $7-4$ дают 3. Затем запись упорядочивают.

02

Второй пример

В выражении $5a-2a+3a^3-1$ складывают подобные члены $5a-2a$, получая $3a$. После этого многочлен записывают как $3a^3+3a-1$ по убыванию степеней.

03

Общий приём

Оба примера показывают один и тот же алгоритм: сначала сокращение, потом порядок. Так выражение становится короче, аккуратнее и удобнее для дальнейших действий.

Как распознать стандартный вид



Порядок степеней

Члены должны идти от большей степени к меньшей. Если запись начинается со старшего члена и дальше последовательно убывает, это первый важный признак стандартного вида.



Нет подобных членов

Нужно убедиться, что одинаковые степени не повторяются. Подобные члены должны быть уже объединены, иначе многочлен ещё не приведён к удобной записи.



Точные коэффициенты

Каждый коэффициент должен быть записан без ошибок, включая коэффициент 1 или -1 . Это особенно важно для членов с одной буквой и для проверки вычислений.



Свободный член в конце

Если свободный член есть, его обычно ставят последним. Когда все условия выполнены одновременно, можно уверенно сказать, что многочлен записан в стандартном виде.

Многочлены: кратко о главном

Многочлен удобно читать и преобразовывать, когда он записан в стандартном виде. Умение приводить подобные члены, проверять степени и следить за знаками помогает уверенно решать алгебраические задачи.