



ДНК и РНК хранят и реализуют наследственную информацию клетки.



Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки

Почему нуклеиновые кислоты — основа наследственно сти



Именно нуклеиновые кислоты связывают поколение с поколением: они сохраняют информацию, передают её при делении клеток и направляют синтез белков, от которых зависят признаки организма и работа всех клеточных систем.

Нуклеотид как структурная единица нуклеиновых кислот

Три компонента

Каждый нуклеотид включает азотистое основание, пентозу и остаток фосфорной кислоты. Именно такое строение позволяет нуклеиновым кислотам образовывать длинные упорядоченные цепи.

Разные сахара

В ДНК содержится дезоксирибоза, а в РНК — рибоза. Незначительное на первый взгляд различие влияет на устойчивость молекул и особенности их биологической роли.

Азотистые основания

Аденин и гуанин относят к пуринам, а тимин, цитозин и урацил — к пиримидинам. Их набор определяет, с какими основаниями возможны пары.

Полимерная цепь

Нуклеотиды соединяются в последовательность, которая становится носителем информации. Порядок звеньев в цепи фактически задаёт «текст» наследственной программы клетки.

Генетический смысл

Именно последовательность нуклеотидов определяет состав РНК и белков, а через них — признаки организма, особенности обмена веществ и развитие клеток.

Сравнение ДНК и РНК

Признак	ДНК	РНК
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	Т, А, Г, Ц	У, А, Г, Ц
Строение	двухцепочечная	одноцепочечная

Сравнение показывает, как различия в строении определяют устойчивость молекул, их локализацию и функции в клетке.

ДНК более стабильна и подходит для хранения информации, а РНК приспособлена к её переносу, использованию и регуляции.

Школьный курс биологии;
молекулярная биология клетки

Двойная спираль ДНК и принцип комплементарности

Форма молекулы

ДНК представляет собой правозакрученную двойную спираль, состоящую из двух цепей, ориентированных навстречу друг другу. Такая организация делает молекулу компактной и функционально устойчивой.

Сцепление цепей

Цепи удерживаются водородными связями между основаниями, которые соединяются только в строго определённых парах. Это обеспечивает упорядоченность строения и точность взаимодействий.

Комплементарные пары

Аденин образует пару с тиминном, а гуанин — с цитозином. Благодаря этому каждая цепь может служить матрицей для построения второй, дополняющей её цепи.

Значение для наследственности

Комплементарность лежит в основе точного копирования ДНК при делении клетки. Именно она помогает сохранить последовательность нуклеотидов и передать её дочерним клеткам без искажений.



Комплементарные пары азотистых оснований



Различие в числе водородных связей помогает объяснить, почему участки молекулы с большим содержанием G и C обычно более устойчивы.

Чем больше связей между основаниями, тем выше устойчивость пары и надёжнее сохранение информации в молекуле.

Школьный курс биологии,
молекулярная биология

Такой объём информации
показывает, насколько сложна
организация наследственного
материала и почему в нём
выделяют отдельные гены
и хромосомы.


Современные данные о геноме человека

3,2
млрд
пар

содержит геном человека

Реализация наследственной информации в клетке

Схема отражает путь от ДНК к белку через транскрипцию и трансляцию.



Основные виды РНК и их функции



мРНК

Переносит информацию от ДНК к рибосоме в форме последовательности кодонов. Она служит матрицей, по которой клетка собирает нужный белок.




тРНК

Доставляет аминокислоты к рибосоме и распознаёт кодоны мРНК с помощью антикодона. Благодаря ей собирается правильная последовательность аминокислот.



рРНК

Входит в состав рибосом и участвует в образовании пептидных связей. Это не просто структурный компонент, а важный участник синтеза белка.



Регуляторные РНК

Малые РНК помогают управлять активностью генов, усиливая или ослабляя их работу. Они позволяют клетке тонко настраивать синтез белков в разных условиях.



Репликация ДНК перед делением клетки

01. Подготовка к делению

Перед делением клетки ДНК должна быть удвоена, чтобы каждая дочерняя клетка получила полный набор наследственной информации и смогла нормально функционировать.

02. Полуконсервативный механизм

При репликации каждая новая молекула сохраняет одну исходную и одну вновь синтезированную цепь. Такой способ обеспечивает преемственность и точность наследования.


03. Роль ДНК-полимеразы

Фермент ДНК-полимераза присоединяет нуклеотиды только в соответствии с принципом комплементарности. Это делает процесс направленным и значительно снижает число ошибок.

04. Ошибки и мутации

Несмотря на высокую точность, редкие сбои всё же возможны. Именно они становятся источником мутаций, которые могут не проявляться, вредить или иногда давать преимущество.

Уровни организации наследственного материала



Переход к каждому следующему уровню связан с усложнением упаковки и надёжной защитой информации.

Чем выше уровень организации, тем компактнее хранение наследственного материала и тем лучше он защищён.

Схема по материалам школьного курса биологии; упорядочение уровней носит учебный, обобщающий характер.

Функции нуклеиновых кислот в клетке

Сравнение основных функций ДНК
и РНК в клетке.

Молекула	Главная функция	Дополнительно
ДНК	Хранение информации	Репликация
РНК	Реализация информации	Регуляция

ДНК обеспечивает наследственность,
а РНК связывает генетическую
программу с синтезом белка
и регуляцией процессов.

Школьный курс биологии, молекулярная биология.

Мутации как источник наследственной изменчивости

Изменения в ДНК

Мутация затрагивает последовательность нуклеотидов и может менять работу гена. Иногда это влияет лишь на один белок, но в других случаях отражается на целых клеточных процессах.

Причины возникновения

Изменения возникают спонтанно при копировании ДНК или под действием мутагенов. К ним относят ионизирующее излучение, некоторые химические вещества и вирусы.

Разные последствия

Большинство мутаций нейтральны или вредны, потому что нарушают точность наследственной программы. Редко возникают полезные изменения, которые могут дать организму преимущество.

Роль в эволюции

Именно мутации создают наследственное разнообразие в популяциях. Без этого материала для отбора не было бы ни адаптации, ни эволюционных изменений.

Значение для человека

Изучение мутаций помогает понимать причины наследственных болезней и оценивать воздействие факторов среды. Это важно для профилактики, диагностики и медицинской генетики.




Путь наследственной информации к признаку

Схема отражает последовательность молекулярных процессов, описанных в школьной биологии.



Где в клетке работают нуклеиновые кислоты




Ядро как хранилище

В ядре эукариот сосредоточена основная масса ДНК, упакованная в хромосомы. Здесь же идёт синтез многих видов РНК, поэтому ядро можно рассматривать как центр хранения и первичной обработки наследственной информации.



Цитоплазма и рибосомы


После выхода из ядра РНК направляется в цитоплазму, где взаимодействует с рибосомами. Именно здесь информация гена превращается в последовательность аминокислот, поэтому цитоплазма является местом активного синтеза белка.



Особенности у прокариот

У прокариот нет оформленного ядра: ДНК расположена в нуклеоиде, а РНК функционирует прямо в цитоплазме. Такая организация делает процессы считывания информации и синтеза белка особенно тесно связанными.

Нуклеиновые кислоты и интенсивность клеточных процессов



В активно работающих клетках возрастает содержание РНК, а перед делением особенно заметно увеличивается количество ДНК.

Рост синтеза белка связан с накоплением РНК, тогда как репликация ДНК предшествует делению клетки.


Схематические данные по школьному курсу биологии; значения отражают относительную зависимость, а не точные измерения.

Практическое значение изучения нуклеиновых кислот



Диагностика наследственных болезней

Анализ ДНК позволяет выявлять мутации, связанные с наследственными нарушениями, уточнять риск их передачи и подбирать более точные подходы к наблюдению и лечению.



Судебная экспертиза и родство

ДНК-идентификация используется в судебной практике и при установлении родственных связей. Она помогает сравнивать генетические профили с высокой степенью надёжности.



ПЦР и молекулярная диагностика

Полимеразная цепная реакция позволяет быстро увеличить нужный участок ДНК. Этот метод применяют, когда требуется обнаружить даже очень малое количество генетического материала.



Изучение активности генов

Исследование РНК показывает, какие гены работают в конкретной клетке или ткани. Это важно для понимания развития организма, работы органов и механизмов болезни.

Связь ДНК, РНК и белков в клетке

Молекула	Роль	Итог
ДНК	Хранение	Наследственность
РНК	Передача	Синтез белка
Белки	Работа клетки	Признак

Три уровня молекулярной организации обеспечивают передачу информации и формирование признаков.

ДНК задаёт программу, РНК её считывает и переносит, а белки реализуют результат в строении и функциях клетки.

Школьный курс биологии, раздел о молекулярных основах жизни.

Как клетка защищает ДНК

01

Источник повреждений

ДНК может повреждаться при ошибках копирования, действии излучения, химических веществ и вирусов. Такие изменения опасны, потому что затрагивают программу работы клетки и могут передаваться дальше.

02

Системы репарации

Клетка располагает механизмами исправления ошибок, которые узнают дефектный участок и восстанавливают его. Благодаря репарации большинство повреждений устраняется ещё до деления клетки.

03

Последствия нарушений

Если исправление не произошло, могут возникнуть наследственные болезни, сбои развития или опухолевое перерождение. Поэтому точность репликации и восстановления особенно важна для организма.

04

Связь с вирусами

Вирусы используют собственные нуклеиновые кислоты для размножения внутри клетки хозяина. Это делает изучение ДНК и РНК важным не только для генетики, но и для медицины.



ДНК и РНК: молекулярная основа жизни

ДНК хранит наследственную программу, а РНК превращает её в работу белков и клеточных систем. Именно поэтому нуклеиновые кислоты лежат в основе развития, адаптации и здоровья организма.