

Особенности строения и жизнедеятельност и насекомых

Изучаем строение, жизненный цикл и
значение насекомых в природе и человеке.



Происхождение и значение насекомых

Насекомые появились более 400 миллионов лет назад и считаются самой многочисленной группой животных на Земле. Они населяют разнообразные среды – от воды до тропиков и Арктики, играя ключевую роль в экосистемах и сельском хозяйстве.



Строение тела насекомого: отделы и функции



Голова – центр восприятия и питания

Голова насекомого несёт сложные глаза и усики, отвечающие за восприятие мира и обоняние. Здесь же расположен ротовой аппарат, который изменяется в зависимости от способа питания.



Грудь – основа движений

Грудь состоит из трёх сегментов и служит опорой для трёх пар ног и чаще всего двух пар крыльев, обеспечивая передвижение и полёт.



Брюшко – жизненно важные процессы

В брюшке расположены органы пищеварения, дыхания и размножения. Оно гибкое и разделено на сегменты, что помогает при движении и выполнении функций.

Покровы тела и внешний скелет насекомых

- Экзоскелет состоит из хитина, надёжно защищает тело от повреждений и предотвращает потерю влаги в окружающей среде.
- Он разделён на подвижные сегменты, благодаря чему насекомые сохраняют гибкость и ловкость движений.
- Рост сопровождается линькой: насекомое сбрасывает старый покров и формирует новый, позволяя телу увеличиваться в размере.

Типы конечностей и их адаптации



Бегательные ноги — для быстрого перемещения

У тараканов ноги приспособлены к быстрому бегу по различным поверхностям. Их удлинённые и сильные ноги обеспечивают внезапные рывки и манёвры.



Прыгательные ноги — для разгонов и прыжков

У кузнечиков задние ноги мощные и длинные, снабжённые развитыми мышцами, что позволяет им прыгать на значительные расстояния, избегая опасностей.



Плавательные ноги — для жизни на воде

Водомерки имеют ноги с перепонками, которые увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью воды, помогая им легко скользить и охотиться на ней.

Строение и функции крыльев насекомых



Защитные надкрылья жуков

Жуки имеют твёрдые надкрылья, которые закрывают и защищают тонкие задние крылья, используемые для полёта, оберегая их от повреждений.



Яркие крылья бабочек

Крылья бабочек покрыты мельчайшими чешуйками, создающими яркие узоры и помогающими маскироваться или отпугивать хищников благодаря цвету и отражению света.



Особенности мух и комаров

У этих насекомых задние крылья видоизменены в жужжальца, помогающие стабилизировать полёт, а основная пара крыльев отвечает за движение в воздухе.


Пищеварительная и выделительная системы насекомых

Пищеварительный тракт насекомого состоит из ротового аппарата, пищевода, желудка и кишечника, где усваиваются питательные вещества.

Средняя кишка выполняет основную функцию всасывания питательных веществ в организм.

Органы выделения — мальпигиевы сосуды — удаляют продукты обмена и регулируют водно-солевой баланс.

Строение систем меняется в зависимости от рациона и среды обитания различных видов насекомых.




Особенности кровеносной системы насекомых

Кровеносная система незамкнутая, гемолимфа свободно омывает внутренние органы в полости тела насекомого.

Сердце — трубчатый орган вдоль спинной стороны брюшка, прокачивает гемолимфу в направлении головы.

Гемолимфа переносит питательные вещества и гормоны, но не транспортирует кислород, функцию которого выполняет дыхательная система.





Нервная система: строение и функции у насекомых

Головной мозг управляет поведением, воспринимает раздражители и координирует движения насекомого.

Окологлоточное кольцо объединяет нервы, связывая мозг с нижней частью тела и обеспечивая связь между отделами.

Некоторые виды способны к обучению, решению задач и сложной социальной организации внутри колонии.

Типы ротовых аппаратов и питание насекомых



Грызущий ротовой аппарат

Характерен для жуков и кузнечиков, включает жёсткие челюсти, предназначенные для пережёвывания твёрдой пищи – листьев, древесины и других твердых материалов.



Сосущий ротовой аппарат

Присущ бабочкам и комарам, состоит из хоботка, с помощью которого насекомые высасывают нектар или кровь, адаптируясь к жидкому рациону.



Лизущий и колюще-сосущий типы

Лизущий аппарат у мух позволяет слизывать жидкости, а колюще-сосущий у комаров и клопов предназначен для прокола тканей и высасывания соков животных или растений.

Органы чувств у насекомых: взгляд изнутри



Фасеточные глаза обеспечивают широкий обзор

Фасеточные глаза состоят из множества отдельных линз-омматидий, что позволяет насекомым видеть почти во все стороны одновременно. Такой тип зрения особенно эффективен для обнаружения движения и быстрого реагирования на опасность.



Простые глаза — дополнительная система восприятия

Простые глаза находятся на некоторых насекомых и отвечают за различение света и тени. Они помогают регулировать суточные ритмы и поддерживать ориентацию в пространстве при изменении освещённости.



Усики — многофункциональные сенсорные органы

Усики выполняют функции осязания, обоняния и даже слуха. Они позволяют обнаруживать запахи, вибрации и прикосновения, что важно для поиска пищи, партнёров и навигации в окружающей среде.

Дыхательная система насекомых

- Трахейная система состоит из тонких трубочек, проникающих в ткани, обеспечивая прямой доступ кислорода к клеткам без посредника крови.
- Дыхальца (спиракулы) расположены по бокам тела и регулируют поступление воздуха, предотвращая потерю влаги в засушливых условиях.
- Такая уникальная система позволяет насекомым вести активный образ жизни, сохраняя энергию и эффективно поддерживая обмен газов даже при интенсивной нагрузке.

Жизненный цикл и развитие насекомых

Откладка яиц

Самки насекомых откладывают яйца в защищённых местах, обеспечивая выживание будущего поколения.

Личиночная стадия

Личинки активно питаются и растут, постепенно накапливая энергию для трансформации.

Куколка (при полном метаморфозе)

В этот период происходит перестройка тела, формируются взрослые органы и структуры.

Взрослая особь

Насекомое достигает полного развития, способно к размножению и выполнению социальных или экологических функций.

Социальная жизнь насекомых



Муравьи: организованные строители колоний

Муравьи создают сложные общества с чётким разделением труда между рабочими, солдатами и матками. Коммуникация происходит с помощью феромонов, позволяя слаженно защищать колонию и обеспечивать питание.



Пчёлы: хранительницы улья и опылители

Пчёлы работают совместно, делая мед и ухаживая за потомством. Они используют танцы и химические сигналы для передачи информации о наличии пищи и опасностях.



Термиты: архитекторы подземных городов

Термиты строят сложные гнёзда с вентиляционными шахтами. Их общество состоит из каст с различными функциями, обеспечивая поддержку и защиту всей колонии.

Приёмы защиты и выживания насекомых



Маскировка с помощью формы и окраски

Палочник идеально имитирует веточку, а бабочка-адмирал — опавший лист, что делает их невидимыми для хищников. Такая адаптация помогает избегать поедания.



Прочный панцирь жуков

Жуки-носороги и бронзовки обладают толстым, жёстким экзоскелетом, защищающим от механических повреждений и нападений хищников.



Химическая защита и предупреждающая окраска


Божьи коровки выделяют ядовитую жидкость, отпугивающую врагов. Яркая окраска многих насекомых служит сигналом о несъедобности и опасности.

Экологическая роль насекомых

Пчёлы опыляют большинство тепличных и полевых культур, что обеспечивает урожай и биологическое разнообразие в сельскохозяйственных экосистемах.

Бабочки и жуки способствуют размножению дикорастущих растений, поддерживая устойчивость природных сообществ и ландшафтов.

Навозники и мухи участвуют в разложении органики, ускоряя формирование плодородного слоя почвы и поддерживая круговорот веществ.



Продолжительность жизни и развитие насекомых

Таблица демонстрирует разнообразие продолжительности жизни и стадий развития у разных видов насекомых.

Жизненный цикл и продолжительность жизни сильно варьируются, отражая адаптацию к окружающей среде и образу жизни.

Данные из энтомологических исследований и наблюдений

Вид	Продолжительность жизни
Муха-дрозофила	около 30 дней
Пчёла (рабочая)	1–2 месяца
Кузнечик	до 1 года
Майский жук (включая личинку)	до 5 лет



Вредители сельского хозяйства и способы борьбы



Саранча: массовый разрушитель урожая

Саранча способна уничтожать большие посевы злаков за короткое время. Для борьбы используются биологические методы, такие как выпуска естественных врагов, и химические инсектициды при необходимости.



Колорадский жук и картофельные культуры

Колорадский жук поедает листья картофеля, снижая урожайность. Сельхозпроизводители применяют мониторинг популяций и использование биологических препаратов для контроля численности.



Использование биологических методов защиты

Внедрение бактерий и паразитов вредителей снижает их численность без вреда для окружающей среды, что важно для устойчивого развития сельского хозяйства.

Польза насекомых для человека и технологий



Пчёлы и продукты пчеловодства

Мёд, воск и прополис, получаемые от пчёл, применяются в пищевой, косметической и медицинской отраслях благодаря своим полезным свойствам.



Шёлкопряд — источник натурального шёлка

Шёлковый червь обеспечивает производство высококачественного шёлка, широко используемого в текстильной промышленности и моде.



Инновации с насекомыми в медицине и питании

Личинки мух применяются для биотерапии ран, а белок насекомых изучается как перспективный источник питания и корм для животных, способствуя развитию биотехнологий.

Значение изучения насекомых для науки и человека

Насекомые играют ключевую роль в природе благодаря своим уникальным особенностям и разнообразию. Их изучение важно для сохранения экосистем, развития биологии и практических приложений в сельском хозяйстве и медицине.

