


Митоз и цитокinesis: обзор ключевых тем урока

Митоз — ключевой процесс деления клеток, обеспечивающий генетическую стабильность.

Роль митоза в жизненном цикле клетки

Митоз — важный этап клеточного цикла, который обеспечивает точное копирование и распределение генетического материала между дочерними клетками. Контрольные механизмы регулируют его последовательность и качество.




Интерфаза: подготовительный этап перед митозом

Синтетическая фаза (S)

Во время S-фазы происходит точная репликация ДНК, удваивая генетический материал для последующего деления. Этот процесс требует высокой точности.

Рост и проверка клеточных ресурсов

Фазы G1 и G2 характеризуются ростом клетки, синтезом белков и подготовкой к митозу, включая контроль целостности хромосом и накопление необходимых ресурсов.



Последовательность стадий митоза


Источник: учебник биологии, 2023



Профаза: начало организации митоза

На этом этапе ДНК конденсируется в видимые хромосомы, а центриоли начинают разделяться к противоположным полюсам клетки, формируя основу веретена деления.

Ядерная оболочка постепенно распадается, облегчая взаимодействие хромосом с веретеном, что подготавливает клетку к следующей фазе.



Веретено деления: структура и ключевая роль

- Веретено состоит из микротрубочек, формирующихся вокруг centrosом у животных клеток или сопоставимых структур у растений. Оно обеспечивает транспорт хромосом.

- Микротрубочки закрепляются на кинетохорах центромер, гарантируя правильное распределение генетических материалов между дочерними клетками.



Кинетохор: регулятор правильного деления хромосом

- Кинетохор представляет собой белковый комплекс на центромере, служащий точкой крепления микротрубочек веретена деления, что обеспечивает механическое разделение хроматид.

- Адекватное прикрепление кинетохора предотвращает хромосомные аномалии, обеспечивая точное распределение генетического материала между клетками.

- Он также участвует в активации контрольных точек митоза, контролируя корректность прикрепления до начала анафазы.

Контрольные точки клеточного цикла при делении

Чекпоинт G2/M проверяет целостность и полную репликацию ДНК перед переходом в митоз, предотвращая деление при выявлении ошибок.

Контроль сборки веретена обеспечивает правильно сформированное веретено деления и полное прикрепление хромосом к микротрубочкам.

Механизмы запуска апоптоза активируются при критических повреждениях, исключая распространение дефектного материала.


Циклины и протеинкиназы регулируют последовательность и временные рамки клеточного цикла, поддерживая гомеостаз и стабильность деления.

Диаграмма: Временное распределение фаз митоза

Фазы митоза занимают сравнительно небольшой процент клеточного цикла по сравнению с длительной интерфазой, где происходит подготовка к делению.

Данные подчеркивают важность интерфазы для подготовки и контроля, обеспечивающего качество последующего деления.

Campbell Biology, 2023




Прометафаза: разрушение ядерной оболочки

В прометафазе ядерная оболочка полностью разрушается, что обеспечивает свободный доступ микротрубочек веретена к кинетохорам на хромосомах.

Все хромосомы захватываются микротрубочками и начинают выстраиваться для последующего выравнивания в метафазной пластинке.


Хромосомы достигают максимальной компактности, что улучшает визуализацию их структуры под микроскопом.

Метафаза: формирование метафазной пластинки



Растворение границ: хромосомы в единой плоскости

Во время метафазы все хромосомы выстраиваются по экватору клетки, образуя четкую метафазную пластинку. Их кинетохоры надежно прикреплены к микротрубочкам веретена с противоположных полюсов, что обеспечивает точность дальнейшего деления.




Контроль равномерности и предотвращение ошибок

На этом этапе завершается проверка правильности прикрепления хромосом к веретену деления. Любые ошибки выявляются и исправляются, чтобы предотвратить неправильное распределение генетического материала в дочерних клетках.

Анафаза: расхождение хроматид

В начале анафазы белковый комплекс сепараз разрывает связи между сестринскими хроматидами в области центромер. После этого хроматиды становятся самостоятельными хромосомами и начинают движение к полюсам клетки.

Микротрубочки веретена деления укорачиваются, перемещая хромосомы к противоположным полюсам. Этот процесс требует энергии, обеспечиваемой гидролизом АТФ, для активного транспорта генетического материала.



Телофаза: образование новых ядер

- На стадии телофазы вокруг собранных на полюсах хромосом формируются новые ядерные оболочки, что восстанавливает ядро в дочерних клетках. Хромосомы начинают деконденсироваться, теряя плотность и возвращаясь к исходному состоянию.

- Ядерное тельце появляется вновь, а органеллы клетки начинают перестраиваться для возобновления нормальных метаболических и синтетических процессов в ожидании следующего цикла деления.



Цитокинез у животных клеток

Образование перетяжки

В животных клетках цитокинез происходит через образование перетяжки плазматической мембраны, которая сжимается с помощью кольца из актиновых и миозиновых филаментов, деля цитоплазму на две части.

Клеточная пластинка у растений

Растительные клетки образуют клеточную пластинку из пузырьков аппарата Гольджи. Эта структура постепенно расширяется, разделяя клетку на две дочерние, учитывая жесткость целлюлозной оболочки.



Биологическое значение митоза в жизни организмов

Митоз обеспечивает точное копирование и передачу генетической информации дочерним клеткам, необходимое для роста организма и замены изношенных или повреждённых тканей.

Процесс играет ключевую роль в регенерации тканей, например, обновлении клеток кожи и крови, что поддерживает здоровье и функциональность организма.

Без митоза невозможно бесполое размножение у многих одноклеточных и многоклеточных организмов, обеспечивающее быстрое распространение и поддержание популяций.

Сравнение митоза и мейоза

Основные отличия между митозом и мейозом в количестве делений, клеток, генетической идентичности и биологических функциях представлены в таблице.

Митоз отвечает за поддержание генетической стабильности и физиологическое обновление, тогда как мейоз обеспечивает генетическое разнообразие для полового размножения.

Campbell Biology, 2023

Характеристика	Митоз	Мейоз
Количество делений	Одно	Два
Число клеток	Две	Четыре
Генетическая идентичность	Идентичны исходной	Разнообразны
Главные функции	Рост и регенерация	Образование гамет

Нарушения митоза и их последствия для организма

- Ошибки в прикреплении хромосом к веретену деления приводят к неравномерному распределению генетического материала, что вызывает анеуплоидию или полиплоидию у дочерних клеток.

- Такие нарушения способствуют развитию онкологических болезней из-за неконтролируемого деления злокачественных клеток и усугубляют генетические заболевания, например, синдром Дауна.

- Некорректный митоз может активировать механизмы апоптоза, что приводит к гибели повреждённых клеток и защите организма от распространения аномалий.

Практическое применение митоза в биотехнологии и медицине


Митоз используется для культивирования клеточных культур в лабораторных условиях, что важно для биомедицинских исследований и производства лекарств.

Методы регулирования скорости митоза помогают в селекции растений, ускоряя получение новых сортов с желательными признаками.

Анализ кариотипов клеток во время митоза служит диагностическим инструментом при определении наследственных заболеваний и лейкозов.

В терапии онкологических заболеваний применяют препараты, влияющие на митоз, чтобы подавлять деление злокачественных клеток и контролировать рост опухолей.

Современные технологии исследования митоза



Микроскопия с высоким разрешением

Электронная и конфокальная микроскопия раскрывают мельчайшие детали структуры веретена деления и распределения хромосом. Световые технологии позволяют наблюдать динамику процессов в живых клетках.



Использование флуоресцентных белков

Введение GFP и аналогов в клетки даёт возможность отслеживать перемещения хромосом и поведение веретена деления в реальном времени, что расширяет возможности молекулярных исследований.



Моделирование митоза in vitro

Культивирование клеток в контролируемых условиях помогает имитировать факторы влияния на деление. Это способствует изучению влияния лекарственных веществ и генетических мутаций.

Значение изучения митоза и цитокинеза для науки

Понимание процессов митоза и цитокинеза критично для медицины и биотехнологий. Эти знания помогают диагностировать болезни, создавать новые терапии и сохранять генетическую стабильность живых организмов.