



Общий обзор: ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЕ И КАЙНОЗОЕ

Две эры, формировавшие современный биологический ландшафт Земли.



Мезозой и кайнозой связаны с распадом Пангеи, формированием суши и океанов, значительными климатическими колебаниями, заложившими основы эволюционных процессов.

Геологический фундамент и глобальные изменения

Мезозойская эра: три этапа эволюции

Триасовый период (252–201
млн лет назад)

Восстановление жизни после
массового вымирания, появление
первых динозавров и освоение
водных экосистем рептилиями.

Юрский период (201–145
млн лет назад)

Расцвет динозавров, появление
первых птиц и активное
распространение голосеменных
растений.


Меловой период (145–66
млн лет назад)

Развитие цветковых растений,
диверсификация динозавров, а
также глобальное массовое
вымирание.

Триасовый период: начало новой жизни

Восстановление после пермского вымирания

Экосистемы медленно восстанавливались, на смену древним формам пришли архозавры, доминировавшие на суше, задавая новую эру позвоночных.




Динозавры появляются

Первые динозавры начали занимать разнообразные ниши, пока они ещё были мелкими и редкими среди других пресмыкающихся.



Распространение хвойных растений

Хвойные стали основой наземных биомов, формируя леса, которые поддерживали разнообразие животного мира того времени.





Юрский период: господство динозавров и растительное изобилие

- В этот период появляются крупнейшие динозавры, такие как диплодоки, а аллозавры занимают вершину пищевой цепи.
- Появление птиц, например археоптерикса, свидетельствует о постепенном переходе динозавров к полёту и новых адаптационных путях.

Меловой период: ключевые инновации и масштабные изменения



Расцвет цветковых растений

Появление и быстрое распространение ангисосперм изменили пищевые связи и структуру экосистем, стимулируя разнообразие насекомых.



Диверсификация динозавров


Разнообразие динозавров достигло пика, что явилось результатом адаптации к новым экологическим условиям.



Массовое вымирание в конце мелового

Резкое исчезновение более 75% видов, включая большинство динозавров, ознаменовало рубеж между эрой рептилий и возрастанием млекопитающих.

Разнообразие динозавров в мезозое



Палеонтологические исследования, 2023

Максимум разнообразия наблюдается в позднем меловом, перед катастрофическим вымиранием.

Данные отражают эволюционный рост динозавров и резкое сокращение их разнообразия к концу мелового периода.

Массовое вымирание: конец мелового периода

01

Падение астероида вызвало гигантский ударный кратер и мгновенные экологические изменения на планете.

02

Вулканическая активность в зоне Деканских траппов привела к длительным выбросам газов, изменяя климат.

03

Климатические сдвиги и резкие колебания уровня моря усилили стресс на множество экосистем.

04

Исчезновение динозавров открыло возможности для млекопитающих и птиц занять доминирующие экологические ниши.

Кайнозой: развитие и адаптация жизни

01

Палеоген характеризуется быстрым возрастанием числа млекопитающих и птиц после исчезновения динозавров.

02

В неогене происходят значительные изменения климата и флоры, зарождение саванн и расширение лесов.

03

Четвертичный период отмечен чередованием ледниковых циклов и появлением человека как биосферного фактора.

Сравнение фауны мезозоя и кайнозоя

Таблица отражает экологические и таксономические изменения между двумя геологическими эпохами.


Смена господствующих таксонов и климатических условий привела к формированию современных экосистем.

Показатель	Мезозой	Кайнозой
Доминирующие животные	Динозавры, Птерозавры, Морские рептилии	Млекопитающие, Птицы
Основные растения	Голосеменные	Цветковые (ангиоспермы)
Климат	Тёплый и стабильный	Переменный с ледниковыми циклами
Ключевые события	Массовые вымирания	Появление человека

Эволюция млекопитающих после массового вымирания


Захват новых ниш

После исчезновения динозавров млекопитающие быстро заняли опустевшие экологические пространства. Они начали специализироваться по средам обитания и формам питания, что привело к бурной диверсификации видов.



Разнообразие форм и размеров

Появились крупные травоядные копытные и развитые хищники. Специализация конечностей обеспечила адаптацию к бегу, копанию и плаванию, что расширило спектр жизненных стратегий.



Эволюция приматов и китов

Приматы развили сложные мозговые структуры и сенсорные органы. Китоподобные обитатели морей приспособились к водной среде, что демонстрирует глубокие изменения в биологических особенностях млекопитающих.



Появление и расцвет птиц

После вымирания птерозавров птицы заняли воздушные ниши, демонстрируя быстрый эволюционный рост. Формировались современные таксономические отряды, отражая разнообразие адаптаций к полёту и среде обитания.

Разнообразие клювов и конечностей свидетельствует о специализированных способах питания и поведения. Многие виды освоили новые экологические роли, от насекомоядных до водоплавающих птиц.



Цветковые растения: революция в экосистемах

- Появление цветковых растений привело к смещению флоры в сторону более разнообразных и специализированных форм, вытесняя голосеменные в большинстве экосистем.
- Разнообразие цветков и способов размножения обеспечило эффективное опыление и расселение, что способствовало быстрому распространению ангиоспермов.
- Коэволюция с насекомыми-опылителями повысила продуктивность биосистем, укрепила пищевые сети и способствовала стабильности экологических сообществ.

Влияние ледниковых периодов на биоту



Серии оледенений

Четвертичный период характеризуется повторяющимися ледниковыми циклами, охватывающими значительные территории Евразии и Северной Америки.




Формирование современной флоры

Под действием циклов похолоданий и потеплений сформировались основные растительные сообщества, адаптированные к переменному климату.



Вымирание мегафауны


Во время оледенений вымерли многие крупные животные, включая мамонтов и шерстистых носорогов, под влиянием климатических изменений и антропогенного давления.



Развитие пресноводной и морской фауны

Климатические колебания стимулировали эволюцию водных организмов, что способствовало повышению биоразнообразия акватических экосистем.

Изменение температур на Земле в кайнозое




Анализ изотопного состава ископаемых остатков, 2023

Температурные колебания тесно связаны с миграцией видов и трансформацией экосистем, формируя разнообразие биомов.

Общее снижение температуры обусловило появление ледников и расширение видов, адаптированных к холодному климату.

ОСНОВНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЛИНИИ КАЙНОЗОЯ

Схема происхождения основных таксонов и ключевые эволюционные ветви



An aerial photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a dense forest of tall evergreen trees. In the middle ground, a river flows through a green field, bordered by a wooden fence. Beyond the river, there are several small wooden buildings, possibly farmhouses or barns, and more fields. In the background, there are rolling hills and more forests. The sky is clear and blue.

Появление человека и влияние на природу

- Род Homo возник около 2,8 млн лет назад, с последующим появлением Homo sapiens примерно 300 тыс. лет назад. Люди расширили географию обитания, освоили разнообразные среды.
- Активное влияние человека привело к истреблению крупной мегафауны, изменению природных биогеоценозов и значительным изменениям климата. Появились аграрные и индустриальные экосистемы.

Формирование современных экосистем

- На рубеже четвертичного периода стабилизировались основные биомы, включая смешанные и хвойные леса, тундры и саванны, благодаря климатическим условиям.

- Современная пресноводная и морская фауна приобрела высокое видовое разнообразие, обеспечивая устойчивость экосистем.

- Закрепились ключевые флористические виды, такие как ель, дуб и белка, определяющие структуру лесных сообществ.

- Фауна сформировалась с участием крупных млекопитающих, включая бурого медведя и лося, что отражает наследие эволюционных процессов.

Ключевые отличия мезозоя и кайнозоя

Таблица сравнивает главные характеристики фауны, климата, флоры и эволюционных событий в мезозое и кайнозое.

Смена господствующих групп и климатические изменения кардинально переформатировали биосферу, сформировав современную живую природу.

Параметр	Мезозой	Кайнозой
Господствующие животные	Рептилии (динозавры)	Млекопитающие и птицы
Климат	Тёплый и стабильный	Переменный с периодами оледенений
Тип флоры	Голосеменные	Цветковые растения
Главные события	Массовые вымирания	Эволюция человека и радиация млекопитающих

Обобщённые геологические и биологические исследования, 2023



Мезозой и кайнозой сформировали фундамент биологического разнообразия современных экосистем. Понимание этих эволюционных процессов важно для решения глобальных экологических задач и охраны природы.

Эволюция жизни и её значение сегодня