


Цитоплазма и одномембранные органоиды клетки


Внутренняя среда клетки, где всё связано в единую систему.



Цитоплазма — рабочее пространство клетки

Именно в цитоплазме клетка не просто хранит структуры, а живёт: здесь идут реакции обмена, перемещение органоидов и передача веществ между её частями.





70–80%

массы клетки приходится на воду, поэтому цитоплазма остаётся средой для осмоса, диффузии и ферментативных реакций.

Водная основа обеспечивает растворение веществ и быстрый обмен между органоидами, а вязкость и кислотность помогают поддерживать точность клеточных процессов.

Гиалоплазма, органоиды и включения

Гиалоплазма

Это полужидкая основа цитоплазмы, в которой располагаются органоиды и проходят основные реакции обмена веществ, связанные с движением молекул и внутриклеточным транспортом.

Органоиды

Постоянные структуры клетки выполняют специализированные функции: синтез, модификацию, накопление, переваривание и обезвреживание веществ, обеспечивая согласованную работу клетки.



Клеточные включения

Это временные запасы и продукты обмена: гранулы гликогена, жировые капли, пигменты и кристаллы; их состав зависит от типа и состояния клетки.

Схема строения

На рисунке удобно показать клетку как систему, где гиалоплазма заполняет пространство между мембраной и ядром, а включения и органоиды находятся внутри неё.

Функции одномембранных органоидов клетки

ЭПС Комплекс Гольджи Лизосомы
Вакуоли Пероксисомы



Диаграмма показывает не количество органоидов, а равную значимость разных направлений работы клетки: синтеза, переработки, накопления, расщепления и обезвреживания веществ.

Каждый органоид выполняет собственную задачу, но вместе они образуют единый внутриклеточный конвейер.

Эндоплазматическая сеть: строение и разновидности

01

Единая мембранная сеть

ЭПС представляет собой разветвлённую систему каналов и цистерн, связанную с ядерной оболочкой. Благодаря этому она объединяет ядро с остальной цитоплазмой и служит путём переноса веществ.

02


Шероховатая и гладкая ЭПС

Шероховатая ЭПС несёт рибосомы и синтезирует белки для секреции, мембран и лизосом. Гладкая ЭПС лишена рибосом и образует липиды, запасает кальций, участвует в детоксикации.

03


Транспорт и согласование процессов

Обе разновидности ЭПС работают как единая система: они не только создают вещества, но и направляют их дальше, связывая синтез с последующей обработкой в клетке.



Путь белка от синтеза до секреции

последовательность отражает движение белка через мембранные структуры клетки.



Комплекс Гольджи как центр обработки и сортировки веществ



Стопки цистерн

Комплекс Гольджи построен из уплощённых мембранных мешочков, расположенных стопками. Такая организация позволяет последовательно изменять молекулы и направлять их дальше по клетке.



Упаковка молекул

Здесь вещества, поступившие из эндоплазматической сети, подвергаются модификации и собираются в пузырьки, удобные для переноса к нужным участкам клетки или к мембране.



Сортировка и адресация

Органоид распределяет молекулы по назначению: одни направляет на выделение, другие — к лизосомам, третьи — для дальнейшего использования внутри клетки.



Активность в секреторных клетках

Особенно хорошо комплекс Гольджи развит там, где идёт интенсивное выделение веществ: в железистых и других секретирующих клетках он работает наиболее активно.

Основные одномембранные органоиды и их признаки

Сравнение показывает, что у каждого органоида есть собственная специализация, но все они включены в общий обмен веществ клетки.

Органоид	Строение	Функция	Где развит
ЭПС	Сеть цистерн	Синтез и транспорт	Секреторные клетки
Гольджи	Стопки цистерн	Модификация и сортировка	Железистые клетки
Лизосомы	Пузырьки с ферментами	Внутриклеточное переваривание	Лейкоциты
Вакуоли	Мембранные полости	Запас и тургор	Растения
Пероксисомы	Мелкие пузырьки	Окисление и детоксикация	Печень, почки

Одномембранные органоиды различаются строением и задачами, но вместе обеспечивают синтез, переработку, накопление и разрушение веществ.

Лизосомы: внутриклеточное переваривание

Ферменты и среда

Лизосомы содержат гидролитические ферменты, которые работают в кислой среде. Это позволяет им эффективно расщеплять крупные молекулы и утилизировать клеточный «мусор».

Что они расщепляют

Лизосомы разрушают белки, липиды, углеводы, старые органоиды, бактерии и чужеродные частицы, помогая клетке очищать внутреннее пространство и поддерживать порядок.



Связь с защитой

Особенно много лизосом в клетках, которые активно захватывают и перерабатывают частицы, например в лейкоцитах, выполняющих защитную функцию организма.

Зачем это клетке

Переваривание в лизосомах не только удаляет ненужное, но и возвращает полезные вещества в общий обмен, поэтому этот процесс экономит ресурсы клетки.

Автофагия и обновление клеточных структур

Повреждение структуры

При старении, стрессе или нехватке питательных веществ клетка распознаёт повреждённые мембраны, белковые комплексы и изношенные органоиды как элементы, подлежащие удалению.

Доставка в лизосому

Ненужные компоненты заключаются в пузырьёк и сливаются с лизосомой, где гидролитические ферменты начинают их последовательное расщепление.

Повторное использование

Образовавшиеся аминокислоты, сахара и жирные кислоты возвращаются в общий обмен клетки и идут на синтез новых молекул и структур.

Вакуоли у растений, грибов и простейших

Центральная вакуоль

У растительных клеток крупная вакуоль занимает значительную часть объёма, содержит клеточный сок и поддерживает тургор, благодаря чему клетка сохраняет форму и устойчивость.

Запас и регуляция

У грибов вакуоли накапливают питательные вещества, ионы и продукты обмена, помогая клетке поддерживать внутреннее равновесие и приспосабливаться к изменениям среды.



Осморегуляция

У простейших сократительные вакуоли периодически удаляют избыток воды, предотвращая разрыв клетки и обеспечивая точную регуляцию водного баланса.

Зависимость от функции

Строение и объём вакуолей меняются в зависимости от типа организма, возраста клетки и её физиологической активности, поэтому одна структура выполняет разные задачи.

Сравнение функций вакуолей в разных группах организмов




Диаграмма показывает, что вакуоли не имеют единой «универсальной» роли: их значение определяется типом клетки и условиями её существования.

Во всех группах вакуоли поддерживают гомеостаз, но у растений преобладает опорная функция, а у простейших — осморегуляторная.

Пероксисомы: ключевые функции



Окисление жирных кислот

Пероксисомы участвуют в расщеплении некоторых жирных кислот, помогая клетке получать энергию и перерабатывать липидные соединения без накопления вредных промежуточных продуктов.



Защита от токсинов

Внутри пероксисом работают ферменты, которые обезвреживают вещества, образующиеся при обмене, снижая их повреждающее действие на клеточные структуры и мембраны.



Каталаза и перекись водорода

Каталаза разлагает перекись водорода на воду и кислород, поэтому пероксисомы особенно важны для защиты клетки от окислительного стресса.



Активные клетки органов

Наибольшую роль пероксисомы играют в клетках печени и почек, где постоянно идёт интенсивная переработка и обезвреживание различных соединений.

Лизосомы и пероксисомы: сходство и различия

Признак	Лизосомы	Пероксисомы
Мембрана	одна	одна
Ферменты	гидролазы	оксидазы, каталаза
Реакции	расщепление	окисление
Главная роль	переваривание	детоксикация

Сравнение помогает увидеть, что оба органоида связаны с переработкой веществ, но работают по разным биохимическим механизмам и в разных задачах.

Лизосомы разрушают сложные молекулы, а пероксисомы обезвреживают продукты окисления; их функции дополняют друг друга.

Внутриклеточный транспорт в цитоплазме



Везикулы-переносчики

Мембранные пузырьки доставляют вещества между ЭПС, комплексом Гольджи, лизосомами и плазматической мембраной, обеспечивая точность перемещения молекул внутри клетки.



Направление по микротрубочкам

Микротрубочки создают внутриклеточные «рельсы», по которым везикулы движутся в нужном направлении, не теряя время и не смешивая содержимое хаотично.



Белки-моторы

Специальные белки используют энергию АТФ, чтобы перемещать пузырьки и органоиды к нужным участкам клетки, особенно в крупных и активно работающих клетках.




Согласованная работа

Благодаря транспорту в цитоплазме ферменты, мембранные компоненты и сигнальные молекулы поступают туда, где они нужны в данный момент.

Мембранный конвейер клетки

Последовательность перемещения веществ между одномембранными органоидами и клеточной мембраной



Специализация органоидов в разных типах клеток

01

Железистые клетки

В клетках, которые синтезируют и выделяют белки, особенно развиты шероховатая ЭПС и комплекс Гольджи. Это обеспечивает быстрый сбор, модификацию и выведение секрета.

02

Фагоцитирующие клетки

В лейкоцитах и сходных клетках много лизосом, потому что им необходимо разрушать захваченные частицы, бактерии и собственные изношенные структуры после работы.

03

Растительные клетки

Крупная вакуоль помогает поддерживать тургор, запасать вещества и сохранять форму клетки. Поэтому она особенно важна в тканях, где требуется прочность и упругость.

04


Клетки детоксикации

В печени, почках и других тканях с интенсивной переработкой веществ заметны пероксисомы. Их набор органоидов отражает специализированную функцию клетки в организме.

Как цитоплазма удерживает клетку как целое


Где встречаются все пути

Цитоплазма напоминает внутреннее пространство, в котором соединяются ядро, мембраны и органоиды. Здесь происходят реакции обмена, а везикулы и белковые комплексы перемещаются без остановки, связывая отдельные процессы в единую систему.



Если нарушается одна деталь

Сбой в работе ЭПС, комплекса Гольджи или лизосом быстро отражается на всей клетке: нарушаются синтез, сортировка и удаление отходов. Поэтому целостность цитоплазмы важна не меньше, чем строение самих органоидов.




Внутренний порядок жизни

Именно в цитоплазме клетка сохраняет согласованность своих функций: получает вещества, преобразует их и распределяет по нужным направлениям. Без этой среды движение и обмен внутри клетки стали бы хаотичными.



Клетка как согласованная система

The background features a blue-to-purple gradient. In the upper half, there are several light blue geometric shapes: circles, triangles, and squares. A white wavy line separates the title from the text below. In the lower half, there are more geometric shapes, including circles, squares, and triangles, in a lighter purple shade. On the left side, there are large, stylized, wavy blue shapes that resemble liquid or flowing forms.

Цитоплазма объединяет все внутриклеточные процессы, а одномембранные органоиды превращают их в точный конвейер синтеза, транспорта и обновления. Именно эта согласованность делает эукариотическую клетку жизнеспособной.