




Обзор темы: Многообразие земноводных

Земноводные — важная группа животных с богатым видовым разнообразием и уникальными чертами.

Возникновение и значение земноводных

Земноводные появились в девонском периоде более 360 миллионов лет назад, став первыми позвоночными, освоившими сушу. Они представляют переход между рыбами и наземными животными и отличаются особенностями развития и дыхания.



Основные группы земноводных

Бесхвостые земноводные


Бесхвостые, включая лягушек и жаб, взрослые теряют хвост и хорошо приспособлены к прыжкам. Эти животные разнообразны и широко распространены.

Хвостатые и безногие земноводные

Хвостатые сохраняют хвост всю жизнь и обладают удлинённым телом. Безногие — червяги, напоминающие червей, ведут подземный образ жизни.



Численность видов по отрядам



Международный союз охраны природы (МСОП), 2023

Бесхвостые составляют подавляющее большинство видов земноводных — около 90%, что говорит о их широком экологическом успехе.

Данные показывают явное преобладание бесхвостых, что отражает их лучшие адаптации и разнообразие в сравнении с другими отрядами.

Бесхвостые: характеристика

Имеют короткое тело с мощными задними ногами, что обеспечивает высокие прыжки и быстрые передвижения на суше.

Взрослые теряют хвост, а их развитие включает метаморфоз из головастика в лягушку или жабу.

Обладают разнообразной окраской и громким голосом, который используется для общения и привлечения партнёров.

Значимые представители бесхвостых

Озёрная лягушка: мастер водного прыжка

Озёрная лягушка широко распространена в Европе и России. Она прекрасно плавает и делает длинные прыжки, что помогает ей избегать хищников и добывать пищу.



Обыкновенная жаба: защитник садов

Обитая в огородах, обыкновенная жаба уничтожает насекомых-вредителей, способствуя сохранению урожая. Внешне неприметна, но очень полезна для экосистемы.



Древесная квакша: искусный альпинист

Эта маленькая лягушка живёт на деревьях, имея приспособления для лазания — липкие подушечки на пальцах, что позволяет ей эффективно передвигаться среди листвы.



Хвостатые: особенности строения

Удлиненное тело с развитыми четырьмя конечностями одинаковой длины и мощным хвостом, полезным для плавания и баланса.

Включают тритонов, саламандр и протеев, которые варьируются по размеру от нескольких сантиметров до более метра.

Обладают уникальной способностью к регенерации, восстанавливая утраченные конечности и части тела.

Приспособлены к жизни в влажных и водных местообитаниях с разнообразными экологическими стратегиями.

Хвостатые: среды обитания и география



Распространение в северном полушарии

Большинство хвостатых обитает в лесах и горах Европы, Азии и Северной Америки, предпочитая влажные и тенистые места.

Разнообразие экологических ниш

Некоторые виды ведут полуводный или полностью водный образ жизни, адаптируясь к различным условиям размножения и зимовки.

Безногие земноводные — червяги

Встречаются в тропиках Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии с длинным цилиндрическим телом, лишённым конечностей.

Ведут подземный образ жизни, роют почву, редко выходя на поверхность, что обеспечивает защиту и влажность.

Питаются мелкими беспозвоночными, играя важную роль в почвенных экосистемах.

Особенности жизненного цикла

Жизненный цикл включает яйца, личинку с жаберным дыханием, метаморфоз и взрослое состояние с лёгочным дыханием.


Оплодотворение чаще всего внешнее, а яйца откладываются в воду или влажные места для развития головастиков.

Личинки постепенно меняются, развивая конечности и легкие, адаптируясь к наземной жизни.

Некоторые виды проявляют заботу о потомстве, защищая кладку или перенося яйца на теле.

Этапы метаморфоза у бесхвостых земноводных

Последовательность превращений от яйца до взрослой особи.



Дыхательная система и кожа земноводных

Земноводные используют для дыхания лёгкие, кожу и в некоторых случаях наружные жабры, что позволяет им эффективно обмениваться газами в различных средах.

Их кожа влажная и тонкая, покрыта слизистыми железами, которые поддерживают водно-солевой баланс и защищают от высыхания и инфекции.

Через кожу земноводные могут поглощать до половины необходимого кислорода и воды, что обеспечивает дополнительное дыхание и гидратацию.

Функции и разнообразие окраски земноводных

Окраска земноводных варьируется от незаметных оттенков, маскирующих их в окружающей среде, до ярких цветов, предупреждающих о ядовитости.

Апосематическая окраска сигнализирует хищникам о токсичности, обеспечивая защиту, в то время как защитный камуфляж помогает скрываться от врагов.

Некоторые виды способны менять цвет в зависимости от условий, таких как температура или влажность, что помогает адаптироваться к окружающей среде.

Звуковое общение и поведенческие особенности земноводных

Лягушки активно используют разнообразные звуковые сигналы для привлечения партнёров и отпугивания соперников весной в брачный период.

Каждый вид имеет уникальные голосовые характеристики, что помогает идентифицировать представителей своего вида в окружающей среде.

Помимо звуков, некоторые земноводные способны воспринимать вибрации почвы, что важно для обнаружения хищников и потенциальной добычи.

Такое многообразие коммуникаций обеспечивает успешное взаимодействие в популяциях и адаптацию к условиям местообитания.

Сравнительная таблица основных признаков земноводных

Параметр	Бесхвостые	Хвостатые	Безногие
Средний размер тела	5-15 см	7-30 см	5-40 см
Способ передвижения	Прыжки и плавание	Хожение и плавание	Ползание и рытьё
Среда обитания	Вода и суша	Вода и влажные леса	Почва и подземные ниши
Численность видов	~7000	~700	~200

Таблица показывает уникальные характеристики и распространение трёх отрядов земноводных.

Разнообразие адаптаций позволяет земноводным успешно занимать разные экологические ниши.

Данные на основе научных исследований и энциклопедий земноводных

Рекордсмены мира земноводных



Голиаф — крупнейшая лягушка

Conraua goliath достигает до 32 см длины и весит до 3,3 кг. Обитает в Камеруне и Экваториальной Гвинее, выделяется своей мощью и размерами.



Карликовая лягушка — самая маленькая

Paedophryne amauensis с размером всего около 7,7 мм считается самой маленькой земноводной в мире, обитает в Папуа — Новой Гвинее.



Самая ядовитая — колумбийская флейта

Phyllobates terribilis обладает токсином, смертельным для человека, её яркая окраска служит предупреждением о ядовитости.

Уникальные виды и эндемики земноводных

Гремучая саламандра США

Ambystoma — редкий вид саламандры, встречающийся только в некоторых регионах США. Обитает во влажных лесах и характеризуется яркой rozpoznательной окраской.



Голубая стрелолистная лягушка Южной Америки

Dendrobates tinctorius azureus известна своей ядовитой кожей и насыщенным голубым цветом. Обитает в тропических лесах и предупреждает хищников своей токсичностью.



Австралийская водяная жаба

Rhinella marina — крупная жаба, широко распространённая в Австралии. Имеет высокую адаптивность, успешно внедряется в различные экосистемы и влияет на биоценозы.



Экологическая роль земноводных

Земноводные активно контролируют популяции насекомых — вредителей сельского хозяйства, способствуя естественному регулированию численности.

Они служат пищей для птиц, млекопитающих и рыб, становясь важным звеном пищевых цепей в экосистемах.

Участвуют в переносе энергии между водными и наземными средами, поддерживая биологическое разнообразие и экологическую устойчивость.

Основные угрозы и меры охраны земноводных

Утрата и загрязнение местообитаний из-за урбанизации и осушения водоёмов серьёзно сокращают популяции земноводных.

Распространение заболеваний, например, хитридиомикоза, вызывает массовую гибель многих видов во всём мире.

Воздействие пестицидов и других ядохимикатов негативно влияет на здоровье и репродуктивные способности животных.

Для сохранения видов разработаны программы мониторинга, создания заповедников и международного сотрудничества в области охраны.

Значение сохранения многообразия земноводных

Многообразие земноводных — залог экологического баланса.
Сохранение их среды обитания необходимо для устойчивости природы
и будущих поколений на планете.

