


Ген и геном: структура , функции и регуляци я

Как ДНК управляет
наследственностью, работой клеток
и здоровьем?





Почему генетика стала ключом к биологии

Проект «Геном человека» открыл точное изучение ДНК, а современные данные показали: важны не только гены, но и их регуляция. Это помогает объяснять наследственные болезни, клеточную специализацию и возможности биотехнологий.

Понятие гена и его роль в наследственности

1

Единица информации

Ген — это участок ДНК, несущий сведения о синтезе полипептида или функциональной РНК. Он является минимальной наследственной единицей, связанной с определённым признаком или клеточной функцией.

2

Структура гена

У гена есть границы, кодирующая область и регуляторные последовательности. Именно они определяют, где начинается считывание информации и насколько активно ген будет работать в конкретной клетке.

3

Один ген — несколько продуктов

Один и тот же ген может давать разные варианты продукта. Это происходит благодаря альтернативному сплайсингу и использованию разных участков начала транскрипции, что увеличивает разнообразие белков и РНК.

4

Связь с наследственностью

Через гены передаются признаки от родителей к потомкам. Изменения в их последовательности или регуляции могут менять свойства организма, а иногда приводить к нарушениям развития и заболеваниям.

Строение гена у эукариот

Промотор

Промотор располагается перед участком, который считывается РНК-полимеразой. Он задаёт точку старта транскрипции и во многом определяет, будет ли ген активен в данной клетке.

Экзоны и интроны

Кодирующие участки называются экзонами, а не кодирующие вставки внутри гена — интронами. Оба типа последовательностей сначала попадают в первичную мРНК, но далее обрабатываются по-разному.

Сплайсинг

Во время сплайсинга интроны вырезаются, а экзоны соединяются в зрелую мРНК. Благодаря этому одна и та же ДНК может использоваться для получения нескольких вариантов молекулы.

Дополнительная регуляция

Помимо основных элементов, у эукариот есть энхансеры и другие удалённые регуляторные участки. Они могут усиливать или направлять работу гена, влияя на его активность на значительном расстоянии.

Направление транскрипции

Схема гена обязательно показывает направление считывания ДНК. Это важно, потому что РНК синтезируется только в одном направлении и строго по комплементарной матрице.

Ген, хромосома и геном: уровни организации наследственной информации

Понятие	Смысл	Особенность
Ген	Единица информации	Кодирует признак
Хромосома	Упакованная ДНК	Содержит много генов
Геном	Весь набор ДНК	Включает ядерную и митохондриальную ДНК

Таблица показывает, как наследственная информация организована на трёх уровнях — от отдельного гена до полного генома организма.

По мере перехода от гена к геному увеличиваются масштаб и сложность организации, а регулирование наследственной информации становится многослойным.

Учебная биология; сведения о кариотипе человека: 23 пары хромосом в соматических клетках

Экспрессия гена: от ДНК к белку

1. Транскрипция

На матрице ДНК РНК-полимераза синтезирует молекулу РНК, копируя информацию гена. Так начинается реализация наследственной программы.

У эукариот первичная РНК проходит обработку: к ней присоединяется кэп, удаляются интроны, а к 3'-концу добавляется поли-А-хвост.


2. Созревание РНК

3. Трансляция

Зрелая мРНК считывается рибосомой по три нуклеотида — кодонами. На их основе собирается белок, который затем участвует в проявлении признака.

Путь реализации генетической информации

Последовательность этапов от ДНК до проявления признака; показаны основные ветвления судьбы РНК.



Геном как система наследственной информации



Ядерная ДНК

Основная часть генома у эукариот находится в ядре и содержит большинство генов, необходимых для развития, функционирования и наследования признаков организма.



Органелльная ДНК

У животных в геном также входит митохондриальная ДНК, а у растений — ещё и хлоропластная. Эти молекулы несут часть собственных генов



Разные типы последовательностей

В геноме есть белок-кодирующие гены, гены некодирующих РНК, повторяющиеся участки и мобильные элементы. Вместе они формируют сложную и динамичную систему.



Эволюционное разнообразие

Размер генома и его организация сильно различаются у разных видов. Эти различия отражают историю эволюции и не сводятся напрямую к уровню сложности организма.

Кодирующая и некодирующая ДНК у человека

Даже небольшие по размеру функциональные участки ДНК могут иметь ключевое значение для работы клеток и развития организма.

Белок-кодирующая часть генома мала; основная масса ДНК участвует в регуляции, упаковке и организации наследственной информации.



Учебные данные по геному человека; оценка доли белок-кодирующей ДНК около 1,5%

Регуляция на уровне транскрипции

1

Промотор и старт

Промотор определяет место начала транскрипции и помогает собрать комплекс белков, необходимых для запуска считывания. Без этого участка РНК-полимераза не начнёт работу точно и вовремя.

2

Транскрипционные факторы

Специальные белки связываются с ДНК и либо усиливают, либо ослабляют работу гена. Они обеспечивают тонкую настройку экспрессии в зависимости от типа клетки и внешних сигналов.

3

Энхансеры и сайленсеры

Энхансеры повышают активность гена, а сайленсеры снижают её. Эти участки могут находиться далеко от самого гена, но всё равно влиять на уровень транскрипции.

4

Сигналы организма

Гормоны и другие сигнальные молекулы передают клетке информацию о состоянии организма. В ответ меняется активность транскрипционных факторов, а значит, и интенсивность работы конкретных генов.

Эпигенетическая регуляция работы генов



Без смены последовательности

Эпигенетические механизмы не меняют порядок нуклеотидов в ДНК, но влияют на то, насколько доступен ген для считывания. Поэтому один и тот же ген может быть активным или почти молчать.

Роль гистонов

Химические модификации гистонов изменяют плотность упаковки хроматина. При более рыхлой упаковке ферментам проще добраться до ДНК, а при плотной — работа гена затрудняется.

Метилирование ДНК

Присоединение метильных групп к ДНК часто связано с подавлением транскрипции. Такой сигнал помогает клетке «выключать» ненужные участки генома и поддерживать устойчивость программы развития.

Эухроматин и гетерохроматин

Эухроматин обычно содержит активно работающие гены, тогда как гетерохроматин связан с низкой активностью. Такое различие особенно важно для дифференцировки клеток и сохранения их специализированных функций.

Уровни регуляции экспрессии генов

Уровень	Пример
Транскрипционный	Промотор, энхансер
Посттранскрипционный	Сплайсинг, мРНК

Таблица показывает, что активность гена контролируется последовательно и многослойно — от запуска транскрипции до судьбы готового белка.

Регуляция происходит на нескольких этапах одновременно, поэтому клетка может быстро менять синтез белка без изменения самой ДНК.

Учебная схема уровней регуляции экспрессии генов

Почему одинаковые гены работают по-разному в разных клетках

Общий геном

Почти все соматические клетки содержат один и тот же набор генов, но используют лишь часть из них. Именно выбор активных генов определяет, каким будет белковый профиль клетки.

Специализация клеток

Нейрон, мышечная клетка и гепатоцит включают разные программы экспрессии. Благодаря этому каждая клетка выполняет свои функции: передаёт сигнал, сокращается или участвует в обмене веществ.

Сигналы развития

В ходе эмбрионального развития и роста организма клетки получают сигналы, которые включают одни гены и подавляют другие. Это лежит в основе формирования тканей и органов.


Гомеостаз организма

Избирательная работа генов позволяет сохранять устойчивость внутренней среды. Если программа экспрессии нарушается, страдают функции тканей, а иногда и работа всего органа.

Влияние мутаций на функцию гена

Последствия мутации зависят от того, затронуты ли кодирующая последовательность, границы сплайсинга или регуляторные участки, управляющие уровнем экспрессии гена.

Большинство изменений не дают заметного эффекта, но именно вредные мутации чаще всего связаны с наследственными заболеваниями и онкологическими процессами.



Схематическая учебная диаграмма на основе общих представлений о последствиях мутаций

Мутации и наследственные болезни человека

HBV и кровь

Изменения в гене HBV нарушают строение β -цепи гемоглобина и могут приводить к серповидноклеточной анемии. Болезнь влияет на форму эритроцитов и перенос кислорода.

BRCA1 и BRCA2

Наследственные варианты генов BRCA1 и BRCA2 повышают вероятность развития рака молочной железы и яичников. Важны раннее выявление риска и наблюдение у специалистов.

CFTR и муковисцидоз


Мутации в гене CFTR нарушают транспорт ионов хлора через мембраны клеток. Из-за этого меняется состав слизи, страдают дыхательная система и пищеварение.

Значение диагностики


Генетическое тестирование помогает обнаружить носительство мутаций до появления симптомов. Это позволяет выбрать наблюдение, профилактику и более точную тактику лечения для конкретного человека.

Как среда влияет на активность генов

Схема показывает, как внешние факторы через сигнальные пути изменяют экспрессию генов без изменения последовательности ДНК.



Геномика и секвенирование ДНК



Считывание генома за часы

Современный секвенатор работает с множеством коротких фрагментов ДНК одновременно и превращает их в цифровую последовательность. На экране появляются строки нуклеотидов, по которым можно увидеть мутации, сравнить образцы и уточнить происхождение фрагментов.



Диагностика в медицине

Геномный анализ помогает находить изменения, связанные с наследственными заболеваниями и опухолями. Врач получает не только название гена, но и точное описание варианта, что делает диагностику более персонализированной и обоснованной.



Сравнение видов

В биологии секвенирование используют для сопоставления геномов разных организмов и поиска родственных связей. Такие исследования показывают, какие участки ДНК сохраняются эволюционно и какие изменения связаны с адаптацией к среде.

Сравнение геномов разных организмов

У разных групп организмов соотношение между размером генома и числом генов может заметно расходиться, поэтому один показатель не отражает всю биологическую сложность.

Большой геном не означает более сложный организм: значительную долю могут составлять повторы, некодирующие участки и мобильные элементы.



Учебная сравнительная схема; относительные значения для наглядности

Практическое значение генетики для человека и общества



Селекция

Генетические знания помогают отбирать признаки, полезные в растениеводстве и животноводстве.

Это ускоряет выведение сортов и пород с нужной урожайностью, устойчивостью и качеством продукции.



Медицина

В клинической практике генетика нужна для диагностики наследственных болезней, оценки рисков и выбора терапии. Такой подход делает лечение более точным и позволяет учитывать особенности конкретного пациента.



Редактирование ДНК

Метод CRISPR-Cas9 дал возможность целенаправленно изменять участки ДНК. Он широко обсуждается как инструмент исследований и как основа будущих лечебных технологий.



Биоэтика

Работа с геномом требует строгих этических норм: важно защищать персональные данные, оценивать безопасность вмешательств и не выходить за пределы допустимого в отношении человека.



Ген и геном: ключ к наследственности и здоровью

Ген и геном объясняют, как наследуется информация, как клетки приобретают специализацию и почему возникают болезни. Их изучение соединяет биологию, медицину и технологии будущего.