



Синтез РНК по матрице ДНК и генетический код

Как ДНК превращается в белок: транскрипция
и генетический код

Зачем биологии нужны транскрипция и генетический код

Это первый этап реализации наследственной информации: без транскрипции клетка не получит РНК, а без генетического кода не сможет перевести её в белок. Именно поэтому эти процессы лежат в основе строения, работы и наследования признаков.



Что такое транскрипция

1

Определение процесса

Транскрипция — это синтез молекулы РНК на участке ДНК. При этом клетка «переписывает» генетическую информацию в более подвижную форму, пригодную для дальнейшего использования в синтезе белка.

2

Направление синтеза

Новая цепь РНК всегда удлиняется только в направлении $5' \rightarrow 3'$. Чтобы это было возможно, матричная цепь ДНК считывается ферментом в противоположном направлении — $3' \rightarrow 5'$.

3

Комплементарные пары

В РНК вместо тимина содержится урацил, поэтому при синтезе образуются пары А–У и Г–Ц. Это обеспечивает точное соответствие между информацией ДНК и последовательностью РНК.

4

Связь с ДНК

Последовательность РНК обычно совпадает с кодирующей цепью ДНК, но с одним важным отличием: там, где в ДНК стоит тимин, в РНК появляется урацил.

5

Значение для клетки

В результате транскрипции создаётся молекула, которая переносит информацию от гена к месту синтеза белка. Без этого шага реализация наследственной программы была бы невозможна.

РНК-полимераза и участок ДНК, с которого начинается синтез

Распознавание промотора

РНК-полимераза связывается с промотором — специальным участком ДНК, который указывает, где именно должен начаться синтез РНК. Это обеспечивает точность старта транскрипции.

Разворачивание спирали


После связывания фермент локально расплетает двойную спираль ДНК. В результате образуется транскрипционный пузырь, где матричная цепь становится доступной для считывания.

Сборка цепи РНК

РНК-полимераза последовательно присоединяет рибонуклеотиды по принципу комплементарности и формирует растущую цепь РНК, не требуя праймера для начала реакции.


Направление движения

Фермент продвигается вдоль матричной цепи ДНК, а новая РНК синтезируется в строго заданном направлении. Это обеспечивает согласованность между чтением матрицы и ростом цепи.



Этапы транскрипции

Последовательность событий от узнавания промотора до образования зрелой мРНК у эукариот



Сравнение ДНК и РНК

Признак	ДНК	РНК
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц
Цепи	обычно две	обычно одна
Функция	хранение	реализация
Локализация	ядро, митохондрии, хлоропласты	ядро, цитоплазма, рибосомы

Таблица показывает, чем ДНК и РНК отличаются по строению, функциям и локализации в клетке.

ДНК более стабильна и долговечна, а РНК более короткоживущая и приспособлена к передаче информации к месту синтеза белка.

Основные виды РНК и их функции



мРНК

мРНК переносит информацию о последовательности аминокислот от ДНК к рибосоме. Она служит матрицей для сборки белка и обычно существует недолго, выполняя свою информационную задачу.




тРНК

тРНК доставляет к рибосоме нужные аминокислоты и распознаёт кодоны мРНК с помощью антикодона. Благодаря этому она связывает нуклеотидный текст с аминокислотным языком белка.



рРНК

рРНК образует структурную основу рибосом и участвует в катализе образования пептидной связи. Именно поэтому рибосома — не просто «площадка», а активный участник синтеза белка.



Малые РНК

У эукариот есть и другие малые РНК, которые регулируют активность генов и помогают в созревании РНК. Они важны для тонкой настройки клеточных процессов.



Единая система

Все типы РНК работают согласованно: одни переносят информацию, другие доставляют аминокислоты, третьи создают рибосомы. Вместе они обеспечивают точный и управляемый синтез белка.

Соотношение основных типов РНК в клетке





Диаграмма отражает относительную распространённость основных типов РНК и подчёркивает их разные функции в клетке.

Преобладание рРНК связано с массовым образованием рибосом; мРНК меньше, потому что она работает как временная копия гена.

Схематическое соотношение по функциональной роли РНК; значения условные для наглядности сравнения

Принцип комплементарности при синтезе РНК



Одна цепь как матрица

При транскрипции используется только одна цепь ДНК — матричная. Вторая цепь не считывается в данный момент и называется кодирующей, поскольку её последовательность почти повторяется в РНК.

Точное спаривание оснований

На матрице ДНК формируются пары А–У и Г–Ц. Такое соответствие обеспечивает точное копирование информации, хотя в РНК вместо тимина используется урацил.

Похожесть на кодирующую цепь

Последовательность мРНК почти совпадает с кодирующей цепью ДНК, если не учитывать замену Т на У. Поэтому по мРНК можно восстановить смысл исходного гена.

Роль принципа комплементарности

Именно комплементарность делает передачу наследственной информации надёжной. Она обеспечивает точность транскрипции и создаёт основу для последующего чтения информации в ходе синтеза белка.

Свойства генетического кода

Таблица показывает основные свойства генетического кода и объясняет, почему он обеспечивает точное считывание наследственной информации.

Сочетание этих свойств делает код одновременно устойчивым к ошибкам и достаточно точным для синтеза белка.

Свойство	Содержание	Значение
Триплетность	3 нуклеотида	1 кодон
Вырожденность	несколько кодонов	1 аминокислота
Однозначность	1 кодон	1 смысл
Универсальность	одинаков у многих	общий принцип
Неперекрываемость	каждый нуклеотид в одном кодоне	точное чтение
Без «знаков»	чтение подряд	непрерывность

Кодоны, старт и стоп-сигналы

1.

Триплетный смысл

Генетический код читается не по одному нуклеотиду, а триплетами. Каждый кодон из трёх оснований задаёт одну аминокислоту или служит сигналом начала и окончания синтеза белка.

2.

Стартовый сигнал

Кодон АУГ обычно запускает трансляцию и чаще всего кодирует метионин. С него рибосома начинает сборку полипептидной цепи, выбирая правильную рамку считывания.

3.

Стоп-кодоны


УАА, УАГ и УГА не задают аминокислот. Они подают рибосоме сигнал завершить трансляцию, после чего готовый белок освобождается, а синтез прекращается.

4.

Почему кодонов больше

Из 64 возможных кодонов только 20 соответствуют аминокислотам, а остальные связаны с остановкой процесса. Такое избыточное число вариантов объясняется вырожденностью генетического кода и повышает его надёжность.

Распределение 64 кодонов генетического кода




Большинство кодонов участвует в синтезе белка, а небольшая группа выполняет регуляторную функцию, завершая перевод информации с мРНК.

Преобладание смысловых кодонов показывает, что система ориентирована на точную и гибкую запись аминокислотной последовательности при сохранении надёжных сигналов остановки.

Как тРНК узнаёт нужный кодон

Антикодон находит свою пару

Транспортная РНК подходит к рибосоме как точный «ключ» к кодону мРНК. Её антикодон комплементарно связывается с тройкой нуклеотидов, а затем тРНК передаёт рибосоме нужную аминокислоту для растущей цепи.




Фермент проверяет соответствие

Аминоацил-тРНК-синтетаза работает как строгий контролёр. Она узнаёт конкретную тРНК и присоединяет к ней только подходящую аминокислоту, чтобы ошибка не попала в белок уже на раннем этапе синтеза.



Путь от гена к белку

Последовательность этапов показывает переход наследственной информации от ДНК к функциональному белку в клетке.



Нарушения транскрипции и их последствия

Нарушение	Причина	Последствие
Мутация промотора	Плохое связывание РНК-полимеразы	Меньше РНК
Ошибка сплайсинга	Неправильное удаление интронов	Изменённая мРНК
Повреждение РНК-полимеразы	Нарушение работы фермента	Блок транскрипции
Мутация терминатора	Сбой завершения синтеза	Аномальная РНК

Обобщение по механизму транскрипции

Таблица показывает, как сбой на каждом этапе транскрипции отражается на количестве и качестве синтезируемой РНК и, следовательно, белка.

Любое нарушение в запуске, ходе или завершении транскрипции искажает итоговую информацию и может изменить структуру белка.

Генетический код и мутации

Синонимическая замена

Изменение в ДНК не всегда заметно для белка. Благодаря вырожденности кода новый кодон может по-прежнему обозначать ту же аминокислоту, и цепь сохраняется без изменений.

Миссенс-эффект

При миссенс-мутации один кодон начинает обозначать другую аминокислоту. Это может слегка изменить свойства белка или существенно нарушить его работу, если замена затрагивает важный участок.

Нонсенс-мутация

Если точечная замена превращает смысловой кодон в стоп-сигнал, синтез прерывается раньше времени. В результате образуется укороченный белок, часто не способный выполнять свою функцию.


Сдвиг рамки

Вставки и делеции нуклеотидов особенно опасны, если их число не кратно трём. Тогда меняется рамка считывания, и вся последующая аминокислотная последовательность становится иной.

Биологический итог

Одна и та же мутация может иметь разный эффект в зависимости от положения и типа замены. Поэтому анализ генетических изменений всегда связывают с возможным влиянием на белок.

Сила влияния разных мутаций на белок



Оценка отражает типичную, а не абсолютную опасность изменений: конкретный эффект зависит от того, где именно произошла мутация и какой белок затронут.

Чем сильнее меняется последовательность кодонов, тем выше риск потери функции белка; наиболее разрушителен сдвиг рамки считывания.

Где нужны знания о транскрипции

Диагностика в медицине



При анализе наследственных заболеваний исследуют изменения в генах и их влияние на РНК и белок. Это помогает понять, почему клетка начинает работать иначе и какой этап синтеза нарушен.

Антибиотики и мишени

Некоторые антибиотики действуют именно на процессы, связанные с РНК-синтезом у бактерий. Поэтому понимание транскрипции позволяет объяснить, почему лекарство подавляет рост микроорганизмов, не затрагивая клетки человека одинаково.

Биотехнологии и РНК-вакцины

В современных разработках знание молекулярных механизмов используют для создания лекарств, изучения работы генов и конструирования РНК-платформ. Эти подходы опираются на точное считывание и передачу генетической информации.



Ключевые понятия темы



Промотор и терминатор

Промотор задаёт место начала транскрипции, а терминатор завершает её. Эти участки ДНК определяют границы считываемого фрагмента и направляют работу РНК-полимеразы.



Кодон и антикодон

Кодон — это три нуклеотида мРНК, а антикодон — комплементарная тройка тРНК. Их взаимодействие обеспечивает точный выбор аминокислоты в рибосоме.



Старт и стоп

Старт-кодон запускает трансляцию и задаёт рамку считывания, а стоп-кодоны останавливают сборку полипептида. Благодаря этому белок синтезируется в нужных границах.



Комплементарность

Комплементарное спаривание оснований делает копирование информации точным: А соединяется с У в РНК, а Г — с Ц. Этот принцип лежит в основе транскрипции и распознавания кодонов.



Типы РНК

мРНК переносит информацию, тРНК доставляет аминокислоты, а рРНК формирует основу рибосомы. Вместе они обеспечивают переход от гена к готовому белку.

**ДНК задаёт, РНК
реализует, белок
выполняет**

Транскрипция превращает информацию гена в РНК, а генетический код переводит её в последовательность аминокислот. Именно так наследственная программа становится реальной работой клетки.